

Friedrich Ritter

Tagebuch 40



Ritters Bezeichnung:	40
Seiten:	2401–2484 (+ 17 nicht nummerierte Seiten persönliche Notizen)
Land:	Bolivien
Zeitraum:	16. Dezember 1958 – 6. Januar 1959
Bemerkungen:	Vorderer Einband fehlt.

[illegible]

Blüte 2404

Röhre insgesamt 9-10 mm lang,
oben 11-13 mm weit, brechendg.

innen weißlich.

Haar weiß, die äußeren ca 4 mm
stark gegen den Ht. abwärts gebogen, die
inneren ab 6 mm aufrecht, ohne
Beregnung bei Berührung was sich
allgemein bei Opuntien und Cylindropuntien
gibt. Röhre sehr dick, Beutel über
2 mm lang, inner ca 1/3 mm dick, weiß
vollständig.

Krone stark ausgedehnt, vermont-
lich unten unten etwas aufwärts,
so daß es Schwefelform 1 3/4 - 2 cm
lang, 10-12 mm breit, inneren auf
etw 1/3 verjüngt, oben sehr stumpf,
nahe oben am breiten Rand
gekerbt. Farbe orangefarbenlichrot
Basis weiß, Krone stark glänzend
oben mit 2 Blüthen.
Übergang in die kleinen Randschuppen.

2) Parodia acampoi ohne Krone Bl. Fr.

2405

3) Parodia hyattii var. cf. Körper
lang, spindelförmig, 9-12 Rippen, 1 1/2-1 3/4
cm hoch, flach, in der Mitte etwas
breiter, lang, Rippen nur an der Spitze
offen, Blüte.

Blüte 16-24 cm lang, Offen 10-14 cm, charakter-
istische Luft, blüht in den Morgenstunden
früher, 1-1 1/2 cm lang, 8-12 mm dick,
mit 4-5 mm langen roten Schuppen in weißen
Blöcken.

H-K füllend 1 1/2-3/4 cm lang, weiß, nach
Mitte sehr lang, Beutel klein, inner
weiß.

Röhre rundlich, mit Beutel auf ca
2-3 cm abgewinkelt, bräunlich, innerlich
(ohne H-K) 7-12 cm lang, oben 1 1/4-2 1/2
cm, weiß, unten außen 5-8 mm dick, inner
Beutel des Beutels Teil, geringen
bis starkförmig, mit kleinen
weißen, den Schuppen + weißen Blüthen
nach Röhrenspitze ca 3-10 mm langen
schmalen Spinnen Schuppen.

Haar nach unten unten, nach oben weiß,
oben. Haar weiß, 6-8 cm lang, Haare
oberen Ringe ca 2 1/2 cm, Farnstrahlen
außer den Blüthen 3 1/2-5 cm, Beutel
oval, creme bis citron.

Sp meist überaus spindlich 14-20 cm
davon 1-1 1/2 cm, die sehr gerippten
Rippen bis zur Spitze, stark gerippten
etw. länger, 8-11, verästelt.
Sp 1-2 mm dick.

Krone sehr dünn, inner ca 1/2-5 1/2 x 1/2-3/8
cm, oben grundlos, weiß, mit Spitzen.

2412
Blüte 3-4 mm lang u. breit, hellgrün, mit
 verstreuten rötlichen Punkten, fadenförmig
 verflochten. Schuppen ohne Spikes, aber
 fadenförmig abgerundet.

Blüte 1-1,5 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte 1-1,5 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte goldgelb, die unteren 5-7 mm breiten
 2-3 mm lange, fadenförmig abgerundet,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte hell oder gelbe überlagend grünlich,
 1,2-1,5 mm lang, 2-13/4 mm auf der breiten
 fadenförmig abgerundet, fadenförmig abgerundet,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte hell oder gelbe überlagend grünlich,
 1,2-1,5 mm lang, 2-13/4 mm auf der breiten
 fadenförmig abgerundet, fadenförmig abgerundet,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte gelblich rötlich braungrün in 6 mm
 lang, fadenförmig, fadenförmig abgerundet,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

2413
Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

1) Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

2) Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

3) Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

4) Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

5) Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

6) Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

Blüte 2-4 mm lang, fadenförmig, hellgrün,
 fadenförmig abgerundet, aber nicht
 fadenförmig abgerundet.

²⁴²³
Höhen über Humo (Hauptort) 3000 m

22. XII

1) *Stachys sulphurea*

2) *Uryzocact. sulcatiflorus* ^{aciflorus} ~~Reich~~
3-4 cm hoch & 2 Rippen selten 12 Rippen.
Im Knt Bl. Breite 6-6 1/2 cm lang.
Fleisch grün, wachsende braune, Bl. braune
bis schwarze Aehren 1-2 mm Ø. Jung
grüne Schuppen, Aehren 1-2 mm lang.
1 1/2-2 cm lang u. breit.

3) K. füllt Lp auf ca 2 mm und die ver-
wachsen darüber Lp eng an R. Anbe-
geht diese Furchen nach oben ohne Nektar
& dann folgen die kleine Nektar
die an der Lp herangehen. Diese Haut
belegen die an die Furchen herangehen.
Die R. wandern. R. 15-18 mm lang, oben 1 1/4 cm weit.
innen rot bis fast weiß, außen grün.
Mit fleisch ca 5-6 mm lang, fleischig
spitz schmeckt bis graue Wölle
und viele schwarze bis dunkelbraune
mit der verbleibenden Rinde von 1-1 1/2 cm
Hautf. Kanten gelblich, blutrot ca 1 1/2 cm
die unteren ca 1 cm, füllig
glatte Rote Rinde groß, lang
grün. (Kopffüllig)
Grüne Rinde, die Narben ca 2 cm
lang ca 1 1/4 cm, auf der hellgelben
12-15 Narben f. ist rotlich

²⁴²⁴
Kronbl. die äußeren Bl. können
die inneren braunrot ca 3x1 1/4 mm
spaltförmig stehen.

3) *Trachocarpus acuminatus* Knt + Bl.

4) *Uryzocact. sulcatiflorus* ^{FR 1002}
2-3 cm hoch, 4-6 cm
hoch, innen weniger blühende
verbleibt. 15-20 Rippen (Haupt)
grünlich, reife Bl. gelben Knospe
braun 1 1/2-2 1/2 cm breit, 1 1/4-2 cm lang.
auf bis braunschwarzlichrot, platzt
oben auf, fleischig, sehr rötlich.
Gelblich bis braunlich 1-2 mm lang.
Nektar schmeckt bis braunlich, rötlich
braun, Kanten fleischig, rötlich, ca 6-7
cm lang, 1 cm breit, rötlich, rötlich.
ca 12 cm, rötlich, rötlich, rötlich.
Lange gelbe bis braungelbe Bl.

5) *Echinops kushiji* ca 10 cm hoch
Bl. rötlich, ca 10-30 cm hoch
ca 10-12 Rippen. Bl. weiß, braun
lang, stark fleischig. Knospe
grünlich, rötlich. Bl. rötlich, rötlich.
schmeckt rötlich.

6) *Echinops strepanda* ^{streptandus}
Bl. rötlich, rötlich, rötlich.
schmeckt rötlich, rötlich.
grünlich, rötlich. Bl. rötlich, rötlich.
ca 2 cm lang.

2426

Hügel über Betanura 3200-3300 m
23. XI. 58.

- 1) *Platyop. sulphurea* Glieder dick
in Blüte oder weisse
- 2) *Tephrosia* wie *schwarzam-galpina*
unreife Bl.
- 3) *Lobelia* sp. Woll-gentianoid, aber
grossbl. Bl. in Bl. Bl.
- 4) *Lobelia* sp. wie oberhalb Obunza
kn. + wenige unreife Bl.
- 5) *Parodia* *maasin* var. *et. rana*
Bl. (Blüten) nach *Culpinia*
Anzahl Bl. nicht bekannt, aber
13 kleiner bis 15 sehr gedrückte
Blätter, nicht spitz und Rand, fleisch,
dann behaart, selten Kloben

F. K. Bl. Perianth 2 1/2 x 1 cm, Kelch 1 cm
spitz, unten nur geröhrt, schmal
4 Blüte.

- 6.) von Vidauwe angeblich Behr. ^{lang} feinst
starkes auf den Bergen von ^{lang} *Tschinpassage*
(unterh. Betanura) aufwärts gefunden

2427

(unterh. Betanura) Hügel in die Teflnacht von San Diego
von Betanura am 23. XI. 58. ca 3300 m

- 1) *Platyop. sulph.*
- 2) *Tephrosia* wie vorig. Blüte
- 3) *Lobelia* wie var. M. F. *Flöcker* var.
dunkel schmal in langer als bei
Hugo. Kn. voll Bl. unreife Bl.
selten reife Bl.

San Diego 23. XI. 58. ca 3400 m

- 1) *Platyop. sulphurea*
- 2) *Cylindropuntia* ^{var. *maasin*} in Blüte
Bl. 3 1/2 cm lang. Kelch glänzend, Horn
ca 13 mm. Bl. schmal, spitz
ca 2 mm lange Schuppen, dunkel
freilegen mit kloben, weissen Blättern,
oberer Rand gelblich - 1 1/2 cm lange
bräunliche Glieder. ~~F. K.~~ schalenförmig,
1 mm lang, hornspitz, oben
spitzförmig, offen. Kelch nicht so sicher
kloben, aber 2-3 mm lang, bräunlich
gelb, oben blass, weisse Bl. ca 1 cm
lang, unten blasse, Blüte in 1. Blüte, gelblich
weisse, silberglänzend, 2 1/4 cm, fast Blüte
nicht fast vom unteren bis oben, Blüte
unvollständig, 2 1/4 cm auf 1 cm
5. *Leptoglossa* *karben* von 2 1/2 mm F

2430
11 km (vd. 9 km) über Tuna
hinas Rikku. Lamar go.
23. XII 58. ca 3400 m.

- 1) *Platyop. sulphurea*
- 2) *Tephroc. dactylifera*
- 3) *Tephroc. pinnatifida* (großfiedrig)
- 4) *Tephroc. wie schwarzsaumige*
von dactylifera
- 5) *Lobelia* **FR 473 a** Bekanntes
#5; Kleiner St. ferner, off. ohne
mittlere Blöckung, fächerförmig,
schmales, Ky. runde + rife Fr.
silber Blau, Risse 4 cm lang.
Staub alle blutrot nicht karmin.
Knoten können blutrot spure.
Karmin; nur die äußeren
ein wenig weißlich. Staub
entdecken alle Blüthenange-
benen auf 24/24/25, also
nur Form oder Var. fest.

6) *Parodia major* wie von Diego
offers in Blüte. Ohne Fr.

2431

F/Zone of Frucht ca 2 - 3 1/2 cm
lang, rundlich, sehr unregelmäßig
über sehr verschälert, stark
gekrümt. Fruchtstiel 3/4 - 1 cm lang
wobei das meiste der Frucht
Randschuppen sehr schmal 3 - 4
mm lang, span bis 10 cm.
gleich. Blätter 1/2 bis 1 cm lang, 1/2
Nallhäute 1/2 cm breit, fleischschleimig
in Wasser.

(10 km weiter nördl. Parodiaceae)
Loc. 3350 m 24. XII 58.

- 1) *Platyop. sulphurea* meist sehr
dick.
- 2) *Platyop. ochroleuca* oft 1/2 cm lang
rot.
- 3) *Cylindrop. stigmata* (Bl + meiste Bl.)
- 4) *Tephroc. dactylifera* oft dick, oft ge-
wollt, weiß, gelb, braun rot, rötlich
selten rötlich Bl.
- 5) *Trichoc. taceus* (Fumeil, Kugel)
- 6) " sp. wie *Trichoc. taceus* (Kugel)
- 7) *Dracopis* (Kugel) weißhaarig
- 8) *Lob. ferox* (Kugel) weißhaarig
- 9) *Parodia major* (Kugel) gelblich braun, offers Bl.

- 2436 Lecori
29 km über Chanchacani weiter
süd 3300 m. Juli 1958. 24.XII 58.
1) *Hylandrops weingartiana*
2) *Trichocereus wie lupinus*
3) *Weingartia* sp. wie Chanchacani.
4) *Lobivia sulphurea* FR 494
Mutter, ohne K. Bl. Fr.

5) *Rebutia* sp. fehr niedrig, Randst. weiß
Mittelst. Kormann, nach unten verfl.
K. Bl.
F. 5 mm hoch

2437 Lecori
F. 2437 (2438) sendes Pflanzeng.
Mittelst. Kormann ca 13 R. K. Bl. Bl.
grünlichgelb, breite Ränder
bräunlichgelb.

2438 Lecori
F. 2438 (2439) sendes Pflanzeng.
Mittelst. Kormann ca 13 R. K. Bl. Bl.
grünlichgelb, breite Ränder
bräunlichgelb.

2439 Lecori
F. 2439 (2440) sendes Pflanzeng.
Mittelst. Kormann ca 13 R. K. Bl. Bl.
grünlichgelb, breite Ränder
bräunlichgelb.

- ca 3100 m 2437 + 37 km nördlich
41 km über Lecori
3150 m 2437 + 37 km nördlich
1) *Hylandrops weingartiana*
2) *Trichocereus wie lupinus* [solitarius]
3) *Trichocereus wie lupinus* [solitarius]
4) *Trichocereus wie lupinus* [solitarius]
5) *Weingartia* sp. wie oben
6) *Lobivia* sp. wie L. 2436
7) *Rebutia* sp. fehr niedrig, Randst. weiß
8) *Rebutia* sp. wie L. 2436
9) *Rebutia* sp. wie L. 2436

10) *Rebutia* sp. wie L. 2436
11) *Rebutia* sp. wie L. 2436
12) *Rebutia* sp. wie L. 2436
13) *Rebutia* sp. wie L. 2436
14) *Rebutia* sp. wie L. 2436
15) *Rebutia* sp. wie L. 2436
16) *Rebutia* sp. wie L. 2436
17) *Rebutia* sp. wie L. 2436
18) *Rebutia* sp. wie L. 2436
19) *Rebutia* sp. wie L. 2436
20) *Rebutia* sp. wie L. 2436
21) *Rebutia* sp. wie L. 2436
22) *Rebutia* sp. wie L. 2436
23) *Rebutia* sp. wie L. 2436
24) *Rebutia* sp. wie L. 2436
25) *Rebutia* sp. wie L. 2436
26) *Rebutia* sp. wie L. 2436
27) *Rebutia* sp. wie L. 2436
28) *Rebutia* sp. wie L. 2436
29) *Rebutia* sp. wie L. 2436
30) *Rebutia* sp. wie L. 2436
31) *Rebutia* sp. wie L. 2436
32) *Rebutia* sp. wie L. 2436
33) *Rebutia* sp. wie L. 2436
34) *Rebutia* sp. wie L. 2436
35) *Rebutia* sp. wie L. 2436
36) *Rebutia* sp. wie L. 2436
37) *Rebutia* sp. wie L. 2436
38) *Rebutia* sp. wie L. 2436
39) *Rebutia* sp. wie L. 2436
40) *Rebutia* sp. wie L. 2436
41) *Rebutia* sp. wie L. 2436
42) *Rebutia* sp. wie L. 2436
43) *Rebutia* sp. wie L. 2436
44) *Rebutia* sp. wie L. 2436
45) *Rebutia* sp. wie L. 2436
46) *Rebutia* sp. wie L. 2436
47) *Rebutia* sp. wie L. 2436
48) *Rebutia* sp. wie L. 2436
49) *Rebutia* sp. wie L. 2436
50) *Rebutia* sp. wie L. 2436
51) *Rebutia* sp. wie L. 2436
52) *Rebutia* sp. wie L. 2436
53) *Rebutia* sp. wie L. 2436
54) *Rebutia* sp. wie L. 2436
55) *Rebutia* sp. wie L. 2436
56) *Rebutia* sp. wie L. 2436
57) *Rebutia* sp. wie L. 2436
58) *Rebutia* sp. wie L. 2436
59) *Rebutia* sp. wie L. 2436
60) *Rebutia* sp. wie L. 2436
61) *Rebutia* sp. wie L. 2436
62) *Rebutia* sp. wie L. 2436
63) *Rebutia* sp. wie L. 2436
64) *Rebutia* sp. wie L. 2436
65) *Rebutia* sp. wie L. 2436
66) *Rebutia* sp. wie L. 2436
67) *Rebutia* sp. wie L. 2436
68) *Rebutia* sp. wie L. 2436
69) *Rebutia* sp. wie L. 2436
70) *Rebutia* sp. wie L. 2436
71) *Rebutia* sp. wie L. 2436
72) *Rebutia* sp. wie L. 2436
73) *Rebutia* sp. wie L. 2436
74) *Rebutia* sp. wie L. 2436
75) *Rebutia* sp. wie L. 2436
76) *Rebutia* sp. wie L. 2436
77) *Rebutia* sp. wie L. 2436
78) *Rebutia* sp. wie L. 2436
79) *Rebutia* sp. wie L. 2436
80) *Rebutia* sp. wie L. 2436
81) *Rebutia* sp. wie L. 2436
82) *Rebutia* sp. wie L. 2436
83) *Rebutia* sp. wie L. 2436
84) *Rebutia* sp. wie L. 2436
85) *Rebutia* sp. wie L. 2436
86) *Rebutia* sp. wie L. 2436
87) *Rebutia* sp. wie L. 2436
88) *Rebutia* sp. wie L. 2436
89) *Rebutia* sp. wie L. 2436
90) *Rebutia* sp. wie L. 2436
91) *Rebutia* sp. wie L. 2436
92) *Rebutia* sp. wie L. 2436
93) *Rebutia* sp. wie L. 2436
94) *Rebutia* sp. wie L. 2436
95) *Rebutia* sp. wie L. 2436
96) *Rebutia* sp. wie L. 2436
97) *Rebutia* sp. wie L. 2436
98) *Rebutia* sp. wie L. 2436
99) *Rebutia* sp. wie L. 2436
100) *Rebutia* sp. wie L. 2436

37 km nördl. Camargo

10) Weingarten v. n. Camargo
Spärlich11) *Parodia magica* fr. Kucop
Hybrid mit 12. Bl. rötlich karmin12) *Parodia* sp. ~~hybrida~~ ^{officinalis} f. *Truncata*
v. n. Camargo, f. 1-20 cm P
selten, rötlich13-14 Ringer, f. 1-20 cm P
13) *Parodia* sp. f. *Truncata*
f. 1-20 cm P13) *Parodia* sp. f. *Truncata*
f. 1-20 cm PTischel, ca 1 mm lang, 1 1/2-2 mm breit
f. 1-20 cm PBlüte 3 1/4 cm lang, 1 1/2 cm breit
f. 1-20 cm Pmit dichter weißer Woll, u. w. rötlich
gelblich, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm P

Camargo 25. XII 58 2439

1) *Parodia* sp. f. *Truncata*
f. 1-20 cm P2) *Parodia* sp. f. *Truncata*
f. 1-20 cm PBlüte 3-3 1/2 cm lang, f. 1-20 cm P
f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm PH-K über 1 mm, f. 1-20 cm P
H-K über 1 mm, f. 1-20 cm P

2444

La Torre1) Torodra radicans K. Blt + nur reife Fr.

seltener reife Fr.

Blüten drücken wie viel Coptagren Blüten

2 1/2 - 3 mm lang, Blt. ca 2 1/2 mm

Blü selbst bis höchst 5-6 mm lang 5-8

rundlich, spitz, rot bis rötlich 1/4 - 1/2

mm lang, drückend, dicke Walle weiß

nach oben mit rotbraun rötlich

N-K 2-3 mm lang, hornig gelb, fast rubin

mit Pfeffer, oben halb gelblich, nach unten

schwebend, dünn

Blüte darüber 11-12 mm lang, oben 10-13 mm

weiß, hornig weiß, drückend, spitz

blau, mit drückend, spitz, spitz

Blü, oben, oben, oben, oben, oben

rotbraun, oben, oben, oben, oben, oben

mit Horn, oben, oben, oben, oben, oben

lang, drückend, spitz, spitz, spitz

Blüte drückend, spitz, spitz, spitz

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

2445

breiten, drückend, spitz, spitz, spitz

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

oben, oben, oben, oben, oben

La Torre

2446

Haute nach unten gelblich oben
bräunlich bis rötlichbraunlich, rötliche
4-5 mm, oben 10-12 mm, Funktion
dort bis Rötlichbraun, nach 10-12
Winkel eckig bis rötlich, nach innen
oval, gelblich weiß.
Bl. die Kerben nicht, ad. kaum abweichend,
19-23 mm hellgelb od. hell grünlich, ad.
davon 2-4 mm auf die 3-4 so sehr hoch
als die gepresste Kumpf bis zur Spitze
gelber Rötlichbraun.

Kraut 12-20 x 3-4 mm, unten rein
1/3 H. so breit, unten gerundet, ob. kurz
kugelförmig, stark mit kleiner Kerbe am
Ende, das mit spitzen von ca 1/2 mm
Höhe breite bei 1/2-3/4 Länge, Nippelkopf
von ca 1/2 Breite, unten oft ganz
Breite, am ober. Ende rötlich, karmin
Ränder! Braungelb zeigt sich an der
blutrote Färbung.

Daten von 4 Blüthen

3. Platycodon miniatus R.
2. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe,
1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe,

Blüte ca 5 cm lang, gerundet
Stem (mit Rinde) 2 1/2 cm lang, grün, nur
oben Rinde mit kleinen von 2 mm L.
u. mit kleinen, grünlichen Schuppen
von 2 mm L. u. Schuppen am Kopf
etwa 1/2 cm lang, 1/2 cm lang, 1/2 cm lang,
mit Rinde, aber rötlichen, rötlichen

2447

Glocken von ca 1 1/2 cm
Frucht bis zu mehreren, gerundet,
bräunlich 1-1 1/2 cm, langen St.,
die auch feilen kann.
Blasen 12 mm lang, oben
13 mm breit, unten verflacht.
Bl. 4 mm vorhanden, nach oben
fast bis zum Rötlichbraun, oben
bis zum darüber; stark rötlich
Teil der 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe,
1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe,
1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe,

Stängel ca 1 1/2 cm lang, rötlich
wie oben, Rinde weiß,
1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe,
1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe,
1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe,
1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe,
1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe, 1. Blüthe,

Blüte bläulich, fast weiß, 3 cm x 1 1/2-2 cm
Blasse auf ca der Hälfte vermindert,
oben rötlich, unten rötlich, oben rötlich,
unten am besten, Rötlichbraun, 1. Blüthe,
Daten von 1 Blüthe



Macht von
Längssehen

2450
F. 2477 Lobelia (Antonia)
Haupt goldgelb od. heller gelb, unkornte er-
höbste (der Krone) ca 1 mm, gestülpte,
ca 3/2 cm lang, füsiform, flach auf
ca 1 1/2 cm, Beutel hellgelb, fädig
Folien gelb, Haupt aufrecht, den Blüten-
knospe die oben aufsteht (Spitz)
In der Mitte der Krone stehen 2 d. Beutel
Haupt bläulich 2 mm dick, 2 1/2 cm lang
der oben d. Blume auf die weiche gewachse-
10 hellgelben Stempel gut belichtet, Narbe
Knospe innere 2 1/2-3 mm 10-12 mm
Basis ca 1/3 so breit, unten zugespitzt auf
oben leicht breiter. Größte Breite der ca 1/2 Länge
unten 3-3 1/2 cm x 7-10 mm Basis
wenig verwachsen, fadenförmig, fadenförmig
grün, Größte Breite ungefähr in der Mitte
nach oben ausgebreitet. Abgang zu
die Schuppe kleiner, von Basis an
zugespitzt, mit grünlich Farbton nur Farbe
an der Spitze, Knospe letztere bläulich
braunlich, Narben rötlich.
Stamen von 1 Blüte.



2451 Lobelia ferge.
nach 2487 Beutel bläulich, unkornt
Haupt bläulich, 2 mm dick, 2 1/2 cm lang
der oben d. Blume auf die weiche gewachse-
10 hellgelben Stempel gut belichtet, Narbe
Knospe innere 2 1/2-3 mm 10-12 mm
Basis ca 1/3 so breit, unten zugespitzt auf
oben leicht breiter. Größte Breite der ca 1/2 Länge
unten 3-3 1/2 cm x 7-10 mm Basis
wenig verwachsen, fadenförmig, fadenförmig
grün, Größte Breite ungefähr in der Mitte
nach oben ausgebreitet. Abgang zu
die Schuppe kleiner, von Basis an
zugespitzt, mit grünlich Farbton nur Farbe
an der Spitze, Knospe letztere bläulich
braunlich, Narben rötlich.
Stamen von 1 Blüte.

2452 Lobelia ferge.
nach 2487 Beutel bläulich, unkornt
Haupt bläulich, 2 mm dick, 2 1/2 cm lang
der oben d. Blume auf die weiche gewachse-
10 hellgelben Stempel gut belichtet, Narbe
Knospe innere 2 1/2-3 mm 10-12 mm
Basis ca 1/3 so breit, unten zugespitzt auf
oben leicht breiter. Größte Breite der ca 1/2 Länge
unten 3-3 1/2 cm x 7-10 mm Basis
wenig verwachsen, fadenförmig, fadenförmig
grün, Größte Breite ungefähr in der Mitte
nach oben ausgebreitet. Abgang zu
die Schuppe kleiner, von Basis an
zugespitzt, mit grünlich Farbton nur Farbe
an der Spitze, Knospe letztere bläulich
braunlich, Narben rötlich.
Stamen von 1 Blüte.

Sau Antiois 2462 Succ. nodosa
 1-2 mm lang unterh. des Rands und
 grün u. etw. größer mit Übergängen in
 Krimm oberhalb des Rands
N.-K. fruchtig eug. und lgr. korrigelt,
 ca 1 1/2 mm lang sehr stark Melcher
 flamm zwischenraum
Röhre im ganzen fruchtig, aber am Ende
 regel auf den gerundeten 8-9 mm lang
 oben 12-15 mm weit. Außen siehe Erken.
Haubt gelb bis weiß unten, nach oben
 rotbraun. ca 8 mm die unteren
 ca 9-12 mm die oberen. Inset ganz R.
 oberh. N.-K. Punkt rotgelb. Pollen hellgelb.
lt überlegend, weiß, unten 1 1/2-2 mm
 dick in Höhe von 1/2 cm 2-3 mm oben
 1-2 mm, 21-23 mm davon ca 3 mm
 auf der etw. gemast. bläugeller Finger
 spitzen befestigten 6 Narbenlappen, matt.
Kronbl. sehr weit ausgebreitet, 2-2 1/2 cm x
 1 1/4-1 1/2 cm, unten 1/4-1/2 cm breit,
 größte Breite bei ca 3/4 Länge oben
 sehr stumpf, mit Kerbe oder mit
 Spitze, oberer Rand etw. gefaltet, nach der
 Basis goldgelb nach den Enden über-
 gehend in Braunblau bis braun
 orange die äußersten Kanten, nach
 Karmin mit braunem Mittelstreif
 & weißliche Gloriden am Nagelende
 keine Hachefur (auch nicht bei
 anderen Blüten)



Stacya ~~corrugata~~ 2463 Sau Antiois
 F (zu Nr 6) Beste 33/4 cm lang, ca
 1 cm weite Öffn. geruchlos.
Erken grün 12 mm lang, oben 12 mm
 breit, Blüten von ca 1 mm Ø bis unterh.
 die Hälfte, Form etw. konisch, Schuppen
 von ca 1 1/2 mm, rauh, rotbraun und
 rotbraun gerade 1/2-1 cm lange Gloriden
N.-K. fruchtig, ca 2 mm lang, nur ca 1/2 mm
 weitem d. lgr. fruchtig, offen
R. darüber schiffelförmig, 6 mm lang
 oben 12 mm weit, innen weiß
Haubt bläugell, untere 8-10 mm, oben
 12-15 mm. Punkt fast weiß, bläugell
 aufrecht, beweglich, nicht
 Bewegung. Inset ganz R. oberh. N.-K.
lt überlegend, Basis 1 mm, 1/2 cm höher
 ca 2 1/2 mm, oben 1 1/2 mm, weiß, 22 mm
 davon 2 mm auf die dunkelfarbenen etw.
 gemast. zugespitzt, nach unten gebogen
 Narbenlappen
Kronbl. 23-25 mm x 13-15 mm, Basis
 ca 5 mm, in 2/3 Höhe am breitesten,
 oben abgerundet stumpf mit weitem
 Kerb. hellgelb, der obere Rand
 am d. Kerbe Maximalbraun, viele
 Übergänge in d. Schuppen



Samenanlage, etw. höher liegend.
9 Parodia supra nach Sau Antiois an d. Klappe nach
 unregelmäßig, freier flach ca 19 Rippen
 (= 2448)

2464

Encayachi 3400 m 29. XII 58

- 1) *Platycodon sulphureus*
- 2) *Tephroc. boliviensis*
- 3) *Tephroc. boliviensis dactyliferus*
- 4) *Oreoc. prolus* Kunze & Fr.
- 5) *Tephroc. larigensis* reife u. unreife Fr., viele km. selten Bl. 2-3 m hoch 18-30 cm dick, jünger 16-18 Rippen später ca 20-30 Rippen, gelb früher oder später, bei 3/4 bis ca 2 cm Höhe in Aklaffform über. Blüten ringsym. d. Kelch 10 cm Durchmesser, aktinodisch. Fr. 14 mm lang 13 mm breit, glänzend mit viel grauer T. (2442)
- 6) *Tarodia massii* in Kn + Bl. Bl. weißer Blaurot, mehr orange rot, Fr. meist gelb, seltener braun.
- 7) *Lobivia* sp., Rippen dünner Lf. feiner als San Antonio. Chukla Bl. Fr.
- 7 (Zind. 2448 Rel.) Wellenfalten und weniger fast haarförmig, weiche weichen (Dorke...)


2465

8 1/2 km über Copacabana hinaus Richtung Tojo 3900 m.

Tephroc. boliviensis normal, gelb t., z. T. sehr wenige in fein, sonst nichts

2 1/2 km weiter abwärts. 3400 bis 3800 m. 30. XII 58.

- 1) *Tephroc. boliviensis* Blüte gelb... Bl. siehe unter 2463.



- 2) *Tephrocactus boliviensis* selten, groß
- 3) *Tephrocactus* zu Abt. *dactyliferus* aber Glieder kleiner Bl. 1 cm lang, Blüte gelblich, 2 1/4 cm lang (dactyl. 4 3/4 cm) Offen 3 cm Durchmesser von 1 Bl. sehr verschieden Fr. braun in dactyl. 1/4 cm (dactyl. 2 1/2 cm) lang nur oberer Teil (dactyl. oberer Teil) mit klein bräunl. Kanten. Bl. kappende Kanten auf fast horizontal (dactyl. mit einigen mm Kanten, von einander) Fr. oben 14 mm (dactyl. 22 mm) breit nur am kappenden Kanten, bräunl. Kanten schuppen, die Kanten übergehend, nur am kappenden Kanten ca 11 cm lange Glocke dactyl. Glocke

Caran. nördl. Copacabana 466 (einsige St.)
auch an d. anderen Grotten im Napfande (auch)
N-K gelb 1/2 mm lang (ab 2 mm) nur 1/2
münd. hinf. rüff. basis halb gelb durch
Staub. Nekt. nicht zu sehen.
Brinnewiese (mit N-K) 7 mm (ab 15 mm)
schiffsförmig, oben stark nach außen
umgebogen (ab 15 mm bis Ende)
Staub. unter rosa, obere hellbrun (dact.
alle weiß) unter 5-7 mm (ab 8-10)
obere 7-10 mm (ab 8-10 mm) Fächer
ganze R. ober N-K. Beutel creme, lang
dünne Rollen weiß.
Blaf. Liza (ab weiß) unten 2 mm, nach 3
ab 3 1/2 mm hoch, obere Ende 2 mm
(ab 1. abt. höher u. länger), 17 mm davon
2 mm auf die ca. 8 gelblichen St. genau (ungeschnitten)
Kraut ca 1 1/2 cm x 8-10 mm (ab 2-2 1/2 x
12-14) unten weiß, halbe Breite, sehr dünn,
nach oben am breiteren. Farbe gelbbraun
Einsparke kürzer karmin, nach oben
gelbbraun (ab goldgelb, supra carmin. Mith.)
4. Blöckchen Kollit in Reihen in
mehrfachen Fruchtbl. (Mutter Rippen)
Frucht meist sehr sp. 1/2 - gedrückt, ca.
2-3 1/2 cm lang 2 1/2 - 3 1/2 cm 2-2 1/2 cm hoch
5. Lobelia (ab) NOV. in der Grotte, halbhügelig FR 927
ca 2-3 cm Ø. Grün grün. 3-6 kurze d. u.
liegende Blätter. Inflores. 1/2 - 1 cm lange
Kätzchen (Häufchen) an Jugend & auch abtötend.
Rippen stark flach gedrückt, Breiten klein u.
abgehoben. 1. starke Rippe. Wird stark von d.
Schafen angefressen, daher selten. 1 Frucht
ca 1 cm lang u. breit, schwarzgrün, nach
unten hell grün, weit seitlich. 1. Hinweis

2467
graue Blöckchen viele graue, die braune,
dreieckige, unten lang, spitze Lehnen.
Frucht umgekehrt. Kaff. flach, 4-5 mm Ø.
Bruchfleisch weiß.
F. (nämlich, d. h. in. od. nach Buttrick): gelbgrün
Fächer sehr stark überausst. in
1/2 mm hoch, mit kleinen Fächer von wein-
ger, ab 1 mm hoch, 1/2 mm hoch, mit
hervorragen. weichen Blöckchen. Breiten ca 1 cm
abwärts. Frucht nach 1/2 - gedrückt 3 1/4 - 1 1/4 cm
lang, weisse, nach breit, 1/2 - 1/4 cm
hoch, 1/2 - 1/4 cm, 1/2 - 1/4 cm, 1/2 - 1/4 cm
mit 1/2 mm hoch, 1/2 - 1/4 cm, 1/2 - 1/4 cm
höf. der 1/2 mm hoch, 1/2 - 1/4 cm, 1/2 - 1/4 cm
weiter in. d. h. in. od. nach Buttrick, F.)
6. Parodia maera (ab) gelb, weissen
auch, grünlich. Blüte orange
bis blutrot. In Kn + Bl

7. Rebutia colocastita 2. FR 1106.
Frucht weit seitlich, 1/2 - 1/4 cm lang,
8 mm breit, rötlich, gedrückt, mit
1/2 - 1/4 cm langen, blauen, dreieckigen
Lehnen, 2-3 mm. Nach ca 2 mm Ø
Fruchtfleisch rosa, gelblich.
Rippen völlig in warmen aufgelöst, Köpfe
1- 1/2 cm sind ganz nicht gedrückt. 1/2
weiß, Rost, bräunlich, 1/2 - 1/4 cm, 1/2 - 1/4 cm
voll mehrere. Fruchtchen von 1/2 - 1/4 cm

F. Lehnen fächerförmig, 1/2 - 1/4 mm lang,
dreieckig, bräunlich, 1/2 - 1/4 cm

~~22468~~ 22468 11 km von Copacabana
 8) *Rebutia* sp. wie *Challagana*? Viel größer,
 rippig, zu Ertrinken. Frucht weiß
 seitlich 6-8 mm lang, 5-7 mm breit,
 unten rot, nach oben olivlich;
 Schüschen dreieckig 12-17 mm lang, oliv-
 grün, glatt, die anderen oft rot. Wollhaare
 brauner als Nr. 4, weiß dicker, öfters auch
 oben einige feine weiße, bis braune
 gebogene Borsten. Fruchtfleisch weiß bis rosa,
 wenige saftig, denen von mehrer Fr.
 Fruchtstiel ca. 1 mm d. Körper 2-3 1/2 cm dick.
 Rippen 10-12 stark gebogen. Stöcke weißlich,
 mit gelblich auslaufend.
 Nach Herbarmuster sehr weißlich, aber diese Nr. ist.

9) *Rebutia* ~~Laaga~~ alpinigautka Pitts FR 93%
 Nur 1 Exemplar mit
 1 unreifer Fr. von ca. 8 mm d. mit
 oben dreieckig, Wollhaare von 1-2 mm und
 starken weißen braunen Wollhaaren, oben
 viel runder, unten bis weiß 11-12 stark
 gebogene Rippen, Körper etw. gewölbt,
 Stöcke grün 2-3 cm dick, 14 Hart, sehr
 blattgelb, weißend, halb abtrocknend, ca 12
 von 1/2-3/4 cm Fr. weit mitlich, borkulos
 Stöcke weißliche Rinde

10) *Rebutia* ~~Laaga~~ alpinigautka Pitts FR 93%
 Nur 1 Exemplar mit
 1 unreifer Fr. von ca. 8 mm d. mit
 oben dreieckig, Wollhaare von 1-2 mm und
 starken weißen braunen Wollhaaren, oben
 viel runder, unten bis weiß 11-12 stark
 gebogene Rippen, Körper etw. gewölbt,
 Stöcke grün 2-3 cm dick, 14 Hart, sehr
 blattgelb, weißend, halb abtrocknend, ca 12
 von 1/2-3/4 cm Fr. weit mitlich, borkulos
 Stöcke weißliche Rinde

~~22469~~ 22469 *pygmaea* sp.
 10) *Rebutia* sp. nur 1 Exemplar. Ähnlich
pygmaea sp. sp. sp. Körper
 Wollhaare rot rotend in Form
 8-9 Rippen deutlich erkennbar, Stöcke
 unterhalb als *pygmaea* sp. sp. sp. sp. sp.
 grün, aber einige braune, mit rotlich-
 schwarzer Wollhaare, Stöcke, weigentlich
 abtrocknend. Frucht Bl. Fr.

Prov. Aviles Dep. Turiza
 29 km über Copacabana
 ca 2850 m, Aviles, 30. XII 58.
 1) *Isorodia* ~~fulvipes~~ alpinigautka Pitts FR 93%
 In den Gärten feiner, meist gelblich
 grünlich, blauer, seltener rötlich
 gelb, auch wie Stöcke 15-21 Rippen,
 nicht gerade, Gewebe, aufsteigend
 wie Stöcke, selten Blüte (Heute)
 Blüte aufst. nach Mandeln, mit Blüte, wie
 Stöcke, 3 cm lang, 23 mm weit,
 Fr. 5 mm lang, über 6 mm breit, blatt gelblich,
 mit dicker Wollhaare, n. sehr kleinen
 schmalen, spitzen, ca 1 mm langen Schuppen.
 2) *Blomfeldia* caespitiformis
 ohne Kn. Bl. Fr.
 3) *Lobivia* wie bei *Oroya* etc 3 km
 weiter südlich bei der Brücke
 2550 m hoch Toja

2440
 F 2 (P. 2463) Parodia ~~repens~~
 (Muster) In Blüten. Mittelst schwarz-
 braune Krallenst., Randl. stark weiß.
 Die dunkelste ab. der massiven
 Eienegnilles vermischt stark dornig
 Blüte 1 1/2 cm lang, Offen ca 3 1/2 cm gerollt.

Namen von 1 Blüte

Fil. fast 8 mm lang n. brist gelbblichrosa
 zu sehr dicke weisse, nach den Enden gelb-
 braune Welle gebildet; mit mittleren, oben
 ca 1 mm langen schmalen, unten fehlenden
 oder nur angedeuteten Schuppen, aber mit
 vollen, breiten Filen. 1-1 1/2 mm entfernt.
 über Filen ansonsten etwas zurückgezogen.

Fl.-K. groß, aber nicht war nicht zu sehen oder
 zu klein. Fl.-K. bräunlich 3 mm lang,
 oben 4 mm weit, davon fast 2 mm Griffeldicke.
Fl.-K. hellgelb, ganz offen

Blüte darüber bräunlich Ende eine Kleinigkeit
 eingezogen 12 mm lang oben 17 mm weit,
 innen hellgelb, außen bläulich karmin
 mit starken gelb ansonsten, an den Enden
 braunbraunen Wollbüscheln, durch bedeckt
 mit karminen spindelförmigen 1/2 mm
 langen Schuppen. am Ende mit weichen gebogen
 von schwarzen feinen Borsten von 1/2 cm
Haar nach unten hellgelb nach oben bräunlich
 nach unten gebogen, welche nach innen
 gebogen, unter ca 1 cm oben ca 3-15 mm
 In der Mitte glatte, stumpf. Fl.-K. klein,
 oval, schwach gelb, Ecken bräunlich
Fl. überlagert hellgelb, nach oben bräunlich

2447
 3 cm davon 2 1/2 mm auf die 12. citrongelbe
 ring, borstigen, etwas zugespitzten, 1/2 genügt
 Narbenklappen.
Kronbl. rufen etwas nach innen genügt,
 oben nach außen zurückgebogen ausgebreitet
 ca 25 x 4-5 mm Basis sehr verknüpfelt
 oben mittel konispitz, am breiten bei
 ca 43 Länge geht mittleres Teil, beinahe line-
 alisch; Farbe blutrot, manchmal Mittel während
 nach den Rändern etwas violettbraun;
 kein brauner Farbton.)



F (P. 2458) Par. maxima
Frucht lang ausgewachsen, auf ca
 2-3 cm Länge, 1-1 1/2 cm, dicke,
 flach, auf voller Karmin. Seiten ganz
 nicht hell etc. wie Obst, sondern wie
 stark, harter, fast ca 1 cm dick, ganz
 rundes, bräunlich, welches einem gelben
 Ausfallen läßt (wie durch Blühen wie
 die in der Mitte dunkelviolett, hell gelblich oder
 bräunlich, flach, nicht netzförmig von
 ca 1/2 cm Durchmesser, Schuppen meist fehl-
 end, da nicht feststellbar, aber sichtbar
 1/2 mm lange, bräunliche Schuppen bis zu
 1 mm von einander entfernt. Brüte 3-7

2474

17 km weiter in Richtig. Villavieja ca 3200 m

Aufstieg 31. XII 38

- 1) *Trichocereus* *terracensis* Kint Bl
- 2) " *peruensis* Villavieja & Subcayo
- 3) *Neocerebrum* ohne Knt Bl Fr
weiphaarig.
- 4) *Clusia* *superior* in Villavieja Fr.
- 5) *Parodia* *magari* gelbst. bis zu
20 Rippen, Rippen bedeutend höher
als bei *fulvospina* von Togo,
Knt Bl.

6) *Lobivia* *ferax* cf. *obtus* Bl Fr

7) *Trichocereus* *berlandianus*

8) *Bombylium* *liliputana* *liliputana*, *liliputana*
mit *liliputana* *liliputana* wie bei *Oryza*.

Frucht kugl. ohne Stiel, aber mit kurzen
Stiele bilden auf der Umgebung $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ cm
D. schwarz-schwarz nach der Basis rötlich
weiße Kugeln auf d. oberen Hälfte gehen
aber oft bis zu $\frac{1}{3}$ der Frucht hinein
Schüppchen der unteren Fiedeln vorwiegend
nach oben große dreieckige dunkelgrüne
Schuppen die den Fruchtstiel umhüllen
Obere Schuppen ca $\frac{1}{2}$ bis über 1 mm
lang, zahlreich, also verschieden
von *Oryza*. Wurzeln *peruensis* wie dort
Bl. flach bis tief beckenförmig.

2475

Zumeilen reife in reifer Fr.; Kint Knt + Bl.

Campanula *terracensis* *terracensis* *terracensis*

7 (Frucht 2469) *terracensis* *terracensis* *terracensis*
zu 1 mm weit um die alten Nektare *terracensis*
zu sehen aber die Schuppen *terracensis*
A. darüber 13 mm lang, oben 10 mm lang
trichterig, innen weiß außen nach unten
gelblich nach oben rötlich, nach rechts
weißer nach oben braunrot. Welle in 1 mm
1. Schuppe bis 10 mm lang, sehr abwärts
hängend, sehr schmal, sehr dünn, sehr
weich, fast goldgelb, untere 1 mm über
8-10 mm, breiter bis 10 mm, unter
Kohlungsaum, Beutel ohne Füllung weiß
Haar aufrecht.

zu 1 mm weit um die alten Nektare *terracensis*
zu sehen aber die Schuppen *terracensis*
A. darüber 13 mm lang, oben 10 mm lang
trichterig, innen weiß außen nach unten
gelblich nach oben rötlich, nach rechts
weißer nach oben braunrot. Welle in 1 mm
1. Schuppe bis 10 mm lang, sehr abwärts
hängend, sehr schmal, sehr dünn, sehr
weich, fast goldgelb, untere 1 mm über
8-10 mm, breiter bis 10 mm, unter
Kohlungsaum, Beutel ohne Füllung weiß
Haar aufrecht.

Teracanthus

2487.

- 1) Turkey ... grazing ...
- 2) Turkey ...
- 3) Turkey ...
- 4) Turkey ...

5) *Parotia massonii* half-galled by aphid, stuck with

b) *Lobelia* ^{ferose} *pendulobrya* *identif. V. 1900*
 etwa 1-2! *kleinst. gebr. Granum*
 langhülfig ca 180 Lappen
Leber Leber diese 9 1/2 cm lang gerundet
Leber ca 10 mm lang, 12 mm breit, spindelförmig
 mit 2-4 mm langen, sehr schmalen, rötlich
 gelben Schuppen mit schwarzen, lockigen
 N. K. Leber ca 8 mm lang, fast ganz sehr
 lang und d. 4/5 mm, rötlich
Leber darüber ca 4 1/4 cm lang, rötlich gelb
Leber auf 9-1 cm, dann allmählich
 immer stärker Leber über 2 cm, weiß
 innen weißlich außen gelblich
 (mit 3 mm (mit 2 mm) ganz oben)
Leber Leber Leber Leber Leber
Leber Leber Leber Leber Leber
 alle ca 2 cm lang, Leber auf Leber 1. 2. 3.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

