


Friedrich Ritter

Tagebuch 45



Ritters Bezeichnung:	Heft 45
Seiten:	2773–2843 (+ 81 nicht nummerierte Seiten persönliche Notizen)
Land:	Chile
Zeitraum:	2. September 1959 – 16. Oktober 1959
Bemerkungen:	Seite 2843 bezeichnet als Seite 2893.





534/72

Heft 45

Sierra Hornillos 2743 - Maiteucillo
 2775 - Copiapo 2778 - Quasco, Nord.
 2780 - Quasco südwest 2783 -
 El Tofo 2786 - Trapike 2788 -
 Unterhalb El Tofo 2789 - Quebrada
 Juan Soldado 2789 - 30 km östl.
 La Serena 2793 - 64 km östl. La
 Serena 2796 - 42 km östl. La Serena
 2799 - El Tambo, ca 60 km östl. La
 Serena 2802 - ca 15 km süd. Co-
 quimbo 2805 - ca 58 km süd.
 Coquimbo 2806 - Coquimbo 2809 -
 ca 45 km östl. La Serena 2811 - Ovalle
 2812 - Mine Dorado 2815 - Salaman-
 ca 2817 - Pichidanguin 2821 - Las
 Coimas 2827 - Chagres 2828 -
 Valparaíso 2829 - östl. Montenegro
 2830 - El Cobre 2833 - Oberb. Antuco
 2835 - Matancilla 2835 - Yumbel
 2837 - Villa Prat 2841 - Re-
 múncho bei Concepción 2843 -

2773

45

~~7.81 + 449, 453~~
 9. VII 59 (Donnerstag) Brief an Winkler #400
Sierra Hornillos süd. Copiapo
 2. IX 59

- 1) *Limnolophia berteri* offener Kn.
+ unreife Fr., selten Bl.
- 2) *Megacelia unguis* unreife Fr.
oder Knospenbeginn.
- 3) *Eulychnia acida* v. *latron* offener
Knospenbeginn.
- 4) *Pyrrhocactus kimmeri* Kn. Bl. östl.
Nahmensweise Kn + Bl.
- 5) *Copiapoa longissima* im Knos-
pen, unreife Blüte, selten
unreife Fr. F (Wende) 2775)
Blüte mit dem charakterist. Copiapoa-
Blütenduft, der aber oft fehlt.
Kap offenk. Länge 2 1/2 - 3 1/2 cm,
Offn. 2 1/2 - 4 cm, oft enger wegen
Nachtbinderbildung.
Laten von 4 Blüten
Fr. 4-6 mm, länglich breit, schuppenlos
weiß bis bräunlichgrünlich,
N-K taback, geschwollen durch

2774

Spaltfädenbasen; gelblich bis gelblich
 leicht rötlich; fädig, nadelig.
Röhre darüber röhrenförmig 8-10 mm
 lang, oben 10-13 mm weit, innen
 fast weiß, außen glänzendgrün oder
 mehr rötlich, mit 4-12 mm
 langen, 1/2-6 mm breiten, zuge-
 spitzten, längenröhrenförmigen, oft
 oft röhrenförmigen Schuppen ohne Haare,
Stängel bläulich, die unteren glänzen-
 de, gelblich, ca 1 cm die dichte-
 ste, der Wand ausgefüllt mit
 Basten nach unten dunkel
 etwa 1/2-1/3 cm. Basten gelblich
 Fäden goldgelb, nadelig, ober 1/2-1/3
Griffel gelblich, nadelig, 1/2-1/3 mm
 nadelig, meist überlagert, porphy-
 rellgelb, kurz, kurz beblättert, 7-9
Kronbl weiß, zugedrückt, feldförmig
 durch oft beblättert, bläulich bis
 fast weiß, in denen die Fäden rötlich,
 in denen die äußeren Kronbl
 rosa, 3/4-5 mm breit 12-14 mm
 lang, meist nur wenig überschau-
 len, oben kurz oder länger
 zugedrückt, gelberer Stängel
 mit 1/2-1/3 Länge,
Frucht kugelig, kalt, ohne Schuppen
 oder mit einem klein bräunlichen
 Schuppen am Nabelende.

2775

Fda. es einige vertrocknete Frucht-
 chen mit Samen gab, hat also
 ist vielleicht schon mal vor ca
 Monat einige Fr. gehabt. Dann
 würde ihre Blütezeit vielleicht
 zusammenfallen mit der
 von *Conocarpus*, die ich jetzt
 im Garten mit Blüthen antrief,
 während sie in diesem Jahre
 überhaupt nicht geblüht haben.
 dürfte außer einer einzigen
 Blüte, die ich ganz spät öffnete,
 Körper einzeln, dicke Kräfte mit
 röhrenförmigen Blüthen.

Station Martencillo
 22 km westlich Vallenar, 31.59

1) *Yucca elata* Berteri, selten Kn + Bl.

2) *Miconia unguiculata* Th.

3) *Calceolaria acida* Hook. Bl. Th.

4) *Yucca wrightii* Hook. Kn.

5) *Typhaea* ~~cinerea~~ Hook. Bl. Th.

2748

Wypiza 4. IX 59/ in Mass.

Wypiza megalota, nur
1 große Krone (wegen Dürre fruster-
hell Blausplatt, wo punctat), die
am 3. in Wypiza offnete u. am
4. in Huesco photoz. wurde.

Blüte ohne feststellbaren Duft
2 3/4 cm lang 3 cm weit. Stk.
von 1 Blüte.

Frk. Clathram, Basis weiß,
Haut lang etwa am Nasenfende
rotte d. bräunlich, mehrere mm
lange, schmale Schnippen. Frk.
6 mm lang u. breit.

N-K Auborn, ca 3 mm lang, wein-
ger als 1 mm weit am d. Ep.
Gefloren durch Anteln. Haut
sehr spärlich Nadeln.

Röhre darüber mit Nadeln, aber
ende nur gering Nadeln,
ca 7 mm lang, Riffen 14 mm weit,
innen weißlich, außen bläulich
bräunlich karmin mit ungen.
ca 1/2 cm lang, ca 2 mm breite
olivebreit, ca 3/4 cm
lang, ca 4 mm breite röt-
liche Augenspitzen Schnippen.

2749

Haut weißlich, die unteren
gelenk. Gelenken Kurve u. lange
Stacheln, 4-10 mm lang.
Die darüber stark an Wachstum
angelehnt ca 5-10 mm. Beinh.
gelblich, Pollen blaus gefärbt,
Inertbrun, nicht unten, dar-
über wenig bis Rotbrun.
Es weiß überzeugend 2 cm mit
10 hellgelben 3 mm langen.
Stacheln, die 10-12 mm-gehört
Kronstrahlen.
Krone weit ausgebreitet und
nach außen gebogen, ca 10 mm
x 5-7 mm breit, unten
verochmälert, bei ca 1/3 Länge
am breiten von gerundeter
Ingenität, nicht linear, mit
schliefen langsam verachmälert
seidengländer. Öffnet
mehrere Tage, schließt nach-
mittags, öffnet wiederum
der Sonne.

2780

Tharso 4. IX 59, nach Nord

- 1) Lammelp. berkeri. unripe Fr.
- 2) Mangelop. mangelii. unripe
weilen unripe od. reifend.
- 3) Trichoc. ~~Trichoc. mangelii~~
selten Kn + Bl. Blätter kleinste Kn
Blätter immer an der Spitze gerichtet
- 4) ~~Trichoc. mangelii~~ (2783)
ohne Kn Bl. Fr.
- 5) ~~Trichoc. mangelii~~ ohne
Kn Bl. Fr.

Bl. ca 5-12 cm Ø, meist
meist 13-14 Rippen
schwarzgrün bis rötlichgrün
(von Sonne) sehr stumpf, mit
scharfen Kanten bis fast
kinnlos über d. Areolen auf
ca 1/2 bis 1/3 der Höhe gehoben
Rippen 1-13/4 cm hoch, Areolen
graufibrig, 1/2-1 1/2 cm Ø meist
einfach, 1/2-1 1/2 cm entfernt.
Veräst. stark, meist 8-12, meist
1-2 1/2 cm, neu schwarz, ver-
gründet, kistelförmig, fingerförmig

2781

meist fehlend, später 1, -darm
mehrere gelegentlich bis ca 10
grade, aber 2-4 cm die Rand-
linien gerade bis gebogen.

Scheitel vertieft, kugelförmig
Bei Jungpfl. ist sehr hart, Rippen
nur im Stöcker aufgelöst, da-
durch an Jünglings. Stängel an-
symmetrisch. Sehr starke meiste
Rippe meist sehr verengtem Hals.
An Stängelenden, zerlegt,
einzelne, unten häufig, oben
selten. F. (S. 2785)

- 6) Neopark. villosa (S. 2785)
bis große Knochen, selten kleinste
Bl. 3-7 cm Ø, freiwüchsig
hohl nicht optisch, meist
stark Rippe meist, verengtem
Hals. Rippen 5-15 von 1/2-1 cm
hoch, sehr stumpf, schwarzgrün,
st. gerollt, unter d. Areolen
kinnlos, darüber auf ca 1/2 Rippenhöhe
oder bis auf 1/3 Höhe gehoben, Rippen
viel dicker an d. Areolen als bei
vorher. Areolen ca 3-7 mm ent-
fernt, ca 3-7 mm Ø, graufibrig
bzw. länglich, tiefste Randes
kärpformig gebogen, weiß bis
gelblich, ca 20 und mehr

2782

darm ferne, gerade, halb
abstehende ca 6-10 dunkle
Randst von ca 1-4 cm, die
in Jugend oder bei wieder
ausbrechenden Pfl. fehlen
können, oder durch die feinen
Randst ersetzt sind.
Darm meist mit harte, scharfe
gerade, abstehende Mittelst. schwarz
ca 2-4 cm, die in Jugend
fehlen oder sehr fein sind
hervor sind. Ist bis auf
den hohen Berg, hier spärlich

7) *Eulychnia acida* v. *decumbens*
nur in hohen Lagen, hier nicht

8) *Lophosiphon cognatula* cf.
Nur auf hohen Bergen;
ähnlich Bl. fr. jungfr.
wenig betrachtet.

2783

Hinter bei Chazet, südwest

1-4. wie S. 2780 Nr. 1-4.

5) *Neoport. villosa*. So scheint, daß es
nur eine Art Neop hier gibt: villosa,
in Jugend sehr fein wief. bel. v. h.
Nichtst, als kalte Pfl. wie willow
oder in höherem Alter wie abi-
optusa, die demnach kein
Wirtskarakter nachkome. Bl. m.
fr. gew. wie S. 2781.

6) *Lophosiphon fedleriana* oft
Krusten, selten Blütel

7) *Chilodactylus napina*, rippig. In
Kroppenbeginn.

8) *Polytrichum pubescens* nicht gesehen.

2784 grünlich. Kuano.
 F (zu Trichter) 2784 2,78 cm lang
 Öffn. 7 cm weit, Daten von 100
 Ekt. 13 mm lang, 14 mm breit, etc.
 glänzend, mit schärfster mit
 aufliegenden Längsring, 2 mm
 langer dreieckiger Schuppen
 und schwarze bis graue
 Wollflocken, darüber Verengung
 auf 1/2 mm Breite. Lerkel Ekt.
 3 mm dick.

M-K schmal trichterig ca 1 mm
 lang, oben 6 mm weit, blaß
 bündlich, Nektar spärlich,
 schmeckbar.

Röhre darüber 2 mm lang, oben
 2 cm weit, trichterig, aber nach der
 Öffn. geringer trichterig, 1 mm
 weit, außen wie Ekt. hinter
 Schuppen teil angewachsen. Dadurch
 länglicher, stiel Schuppen teil
 unter 2-3 mm, oben 10-15 mm
 breiter, schmal, schwarze Wollflocken.

Haar weiß, an Nektar angelagert mit
 aufrechten cremefarbenen Beulen
 von fast 1 1/2 mm Länge, Staub
 1 1/2 - 2 mm lang, die mit Nektar
 die längsten, die des Randes
 unter 2 cm lang. Kuano

2785
 außer oberstem fast 1 cm, dann
 trichterig.
 Gr. mit den Narben zwischen 10 und
 Beuteln. Gr. weiß 4 1/4 cm, davon
 13-14 und auf die 15. blaß gelben
 rings her umgeben, fast schneeweiß
 stark gerippt mit Narbenlappen
 Krenzl gut ausgebreitet, ca
 3 1/2 cm x 13-15 mm, guten
 halbe Breite abgerundet, nach
 aufgesetzt. Nektar bei ca 2/3
 Länge am breiten Ende, schneeweiß,
 die im Röhren oben in d. Mitte
 etc. vollständig.

F Eine Pfl. mit 2 reifen Früchten
 Frucht karmis, kornen-
 förmig, 2 1/4 - 2 3/4 cm lang
 1 1/4 - 1 1/2 cm breit, rundet ab.
 den hoch, harte, hohl-fest auf-
 sitzen der Beutenrest. Samen
 fallen gleich aus. Mit starken
 weißen Flecken und wenigen
 weichen hellen Borden. Schupp-
 chen 1/4 - 1 mm lang, blaß, 1 mm
 lang, damit schmal.
 Beutenrest von oben der
 Blütenreste von Cyrtocarpus

2786

Stark meißwollig, mit vielen
eiförmigen, steifen, nicht ste-
henden geraden Haaren auf
rechten Borsten. Blüthenstiel
2 cm lang. Fruchtschäfte
sinner anderen Pfl. etwa
ebenso, aber Frucht borstenlos.

El Tofa 7. IX 59

- 1) *Yucca alopecuroides* auch noch
auf der Hohe des Berges.
- 2) *Miquelina insignis* Fr.
- 3) *Trichocereus spinibaccis*,
Kun, selten Bl.
- 4) *Eulychnia longispina*
in Knospen.
- 5) *Eulychnia acida*, nur
auf der Höhe.
- 6) *Pyrethrum* ~~chrysanthemum~~ auf dem
Bergkamm nur abwärts
abgepresener Kolonien.

2787

Ohne Kn Bl. Lange stark meiß-
weisse Röhre mit verengt. Flase;
ist chorisam wie unten.

- 7) *Neoportia rapifera* in
reifen, späterer unreifen
Pfl. Nur große Knospe. Körper
vollständig bis zur Spitze, nicht
wie wagenförmig.
- 8) *Neoportia wagenförmig* cf.
(ohne Röhre) nur auf den
Felsen in Strandnähe. Zu-
weilen Frucht ohne Röhre oder
Röhre nur ca. 5 cm lang. Körper dunkel-
grün wie bei *Neoportia* oder f.
- 9) *Top. coccinellina*, Kun. m.
offene Blüte; unten
bis oben.
(Fetwas dunkler)

2788

Trapiche 8. IX 59

- 1) *Tephrosia berkei*
- 2) *Migueltuya miquelii*
- 3) *Trichocereus opuntiacolus*
spärlich.
- 4) *Trichocereus nigripilis* Phil.
(wie *L. teretica*) ohne Kn
Bl. Fr. häufiger als 273.
- 5) *Cylindropuntia coahuilana*
Knochen.
- 6) *Eulychnia acida*
- 7) *Pyrausta sinuata*
in Kn + Bl.
- 8) *Tephrosia trapiensis*
ohne Kn Bl. St.

27

2789

Mikardalle El Tofo 8. IX 59

- 1) *Tephrosia chorisensis*
Knochenbeizung.

Außerordentlich ähnelnd *trapiensis* ~~entgegenst.~~
eingesenkerter, Th. chr. außen
gedrückt, Rippen u. Blöcke
groß, Blöcke weniger rinnig.
Rippen zw. Blöcken starker
verschmälert. Same verschieden.

Quadrada *gna* Soldado 30 km N. La Terena
9. IX 59

- 1) Neoport. Wasserknabe, außerordentl.
hoch verholzte Stäbe von rund ca. 1 cm
lange, gewöhnlich auch dicke ohne
vergrünenden Blät. In Trümmern
liegen u. wenigen neuen.
Nest 1 Kopf mit verpackter Blüte
u. großer Kugelpfe.

Blüte geruchlos, 22 mm lang, Öffn. ca.
15 mm weit, Außen von 10 Blöcken
Blk. 5x5 mm, gegliedert, mit
schmalen ca 1 mm langen Blasen
besetzt u. Blöcken, welche in Blöcken
darüber, Rippen einschüßend.

2790
N.-K. mit Nektar mittlerer Teil
 schüsselförmig ca 1 mm lang
 1 1/2 mm weit stark oben oberhalb
 der Quernaht durch die vorgehenden
 Nektarien. darüber fast röhrliger
 Teil von ca 1 mm Länge und
 nur sehr geringe Fortschüben. In
 der Grille No. 12. bei Grünlich
 oberhalb abgerundet durch die
 Besen der Staubfäden. Röhre darüber



ca 4 mm lang oben ca 5 mm
 weit, spitz aufsteigend, oben
 schüsselförmig mit 1-2 mm
 Längen. oben von schmalen spitzen
 Schuppen m. klein weißen Flecken
 oben.
Staubf. weiß aufrecht die unteren
 5-6 mm, die oberen 7-8 mm.
 Beutel eierförmig. Insekten
 nur etwa auf dem unteren
 mm der Höhe auf dem 90°-
 nung, drehen. Die ca 3 mm
 kürzerer Teil der R. oben.

2791
Insekten,
 4/5 überragend ca 15 mm weiß
 nach oben rot, rest 4
 rotbraun, 2 mm langen
 fingerförmig, gepreßt. Nebenlage.
 Teller weiß.
Kraut, Karmin. Die jüngeren
 nur an den oberen Enden
 karmin, nach unten weiß.
 die mittleren 12 x 4 mm, die
 oberen ca 10 x 3 mm, die
 unteren ca 7-10 x 3-4 mm.
 ein wenig nach außen gebogen
 die anderen aufrecht, so daß
 sich eine Öffn. von ca 5 mm
 weit ergibt. Bei etwa 1/4 Länge
 am Ende nach oben
 zugespitzt, etwas ver-
 schmalert. Blätter nahe
 Scheitel bis halbseitig.
Bl. vergrün bis graugrün oder
 bräunlichgrün ca 15-30
 cm lang; wenn herabhängend
 bis ca 1 m lang werden.
 ca 6-10 cm dick, mit
 12-17 sehr stumpfen Rippen
 Höhe 1-1 1/2 cm hoch, über
 den Rippen durch Kerben
 auf 1/3 od. 1/2 Höhe erniedrigt,

2792
unter d. Areolen stark dicker
das stumpf oder auch scharf
pinnförmig. Areolen hellbraun-
lich länglich ca $\frac{1}{2}$ -1 cm lang,
jung 1-1 $\frac{1}{2}$ cm entfernt, im
Alter ca $\frac{1}{2}$ -1 cm entfernt.
Agerade, sehr graubraun
oder sehr graubraunlich
oder gelblich (heller).

2) Trichocereus peruvianus
in Knospen, offener Blüthen.
Blüte wie Trichocereus 9-10 cm
lang, Öffnung bis 11 cm weit.
Frucht 10 mm lang 7 mm
breit, schuppig, rötlichbraun
bis braun, ein wenig ab-
gerundet. Dagegen Veran-
gung 11 mm dick, oben 4 mm
dick. N-K 14 mm lang, N-K
röhrl. Röhre darüber 3 $\frac{1}{4}$ cm
lang, oben 2 $\frac{3}{4}$ cm weit, Schuppen
braunlich gelblich.
Büchel fast oval, oben
stumpf, untere 2 $\frac{1}{2}$, mittlere
3 mm, oberer Randes über 2 cm
lang Insertionen auch

2793
auf dem Stängel ein noch
vorhanden, aber spärlich
Gr $6\frac{3}{4}$ cm lang, davon 2 cm
auf die 14 st. zugespitzten
Narbenlappen.
Knospe 4-4 $\frac{1}{2}$ cm x 20-21 mm
mit 14-13 Breite, oben
gerundet zugespitzt mit
aufgesetzter Spitze, die
ca $\frac{1}{2}$ Länge am breitesten
Basis von 1 Blüte.
Blüten am Scheitel.

30. Jan. 1910. Trichocereus x 10. K 59

1) Trichocereus peruvianus spärlich und
gerichtet mit kleinen Knospen.
noch spärlicher und reife Knospen
selten Bl oder Kn.

1 Bl 3 cm lang, 1 $\frac{1}{4}$ cm oben weit.
N-K 11 cm, N-K im Querschnitt
hoch, aber Teil mit den Nektarien

mit einer Rinne von 1 mm
N-K 11 cm, N-K im Querschnitt
hoch, aber Teil mit den Nektarien
mit einer Rinne von 1 mm

2794

von ca 13 mm hoch, mit den
Nektarien 8. etwa 1 mm Höhe.
oberer Teil ca 3 mm hoch,
schmal trichterig, ca 1/3 mm
weit um denyl. abgeschlossen
durch die Haut, die aufrecht
steht auf dem Wandvorsprung
d. darüber 11 mm hoch, rund
den unteren Teil mit 1 mm
vertiefen. Junger Korb
nach unten st. gerichtet, so
daß offn. fast geschlossen
äußere Korb nach außen
gebogen, mittlere fast aufrecht,
bis 12 mm lang und ca 3 mm
breit, Form wie Waage
knechtig. Schuppenhörl.
eine weitere H. hat 2 Teil von
je 4 1/2 cm Länge u. 3 1/2 cm Offn.
Höhe



unter Teil N-K

4 mm weit

ober. Teil N-K

Nektarien

unter Teil N-K

ober. Teil N-K. nach

vergehend auf ca 3 mm.

d. d. gleich gelochte
Haut. Beiden Nektarien

2795

geschlossen P. darüber ca
15 mm lang mit Fruchtkorn
die unteren ca 10 mm.
(Hybrid mit clavata?)
reizlich Nektar offn. ca 6 mm
weit

N-K 5 mm lang, davon
der schalenförmige äußere
Teil ca 11/2 mm hoch.
Die Nektarien (gehörig ab)
machen ca 1 mm Höhe
aus. Korb ca 6 x 4 mm.

2796

64 km östl. La Serena, nahe westl.
Vicuña 10. IX 59.

1) Yucca senilis. sehr häufig in
Clüben, weniger in K., nur in
den Fr. von K. (E. auch
vergangene Frucht vorjährig.)

Blüte nahe Scheitel gerichtet,
4-5 3/4 cm lang, Öff. 3 1/2-5 cm.
Stiel von 6 Blüten.

Frucht 4-7 mm lang, 5-7 mm
breit, olivbräunlich, Schuppe
1/2-1 mm lang, rötlich, weiße
Flöckchen, oft auch sehr feine
haarförmige, verbogene weiße
Haare.

N-K unten weit, nach oben
fast brüchig verengt, fast
boden schalenförmig, 1/2 bis
ca 1 1/2 mm vertieft, N-K-Grün
nur wenig vortretend.



N-K 4-7 mm lang,
Nektarien unten 3 1/2-6 mm
weit, nur Ausgang
nur 1/2-1 mm weit und
den Fr. bei allen Bl. wie ein
glockenförmig, blapfeichlich

2797

Nektar. Blüte weiß, rötliche
1 3/4-2 1/2 cm, offene 1-1 1/2 cm
aufrecht, Rechtel sehr klein, blaf
unregelmäßig, Frucht rötlich
ganze Bl. oberh. N-K bis auf freie
Oberte 1/2-3/4 cm.

Frucht weiß, unten nach oben immer
mehr bis übertragend, Narben
untenhalb, immer in Bl. Spitzen
oder sie fast erreichend,
3 1/2-4 cm, davon 3-5 mm auf
die glatte Spitze der Schuppe
weisen, gelblich od. gering rosa
Narbenstrahlen.

Rechtel Röhre oberh. N-K 17-22
mm, Rechtel oberh. 7-11
mm, weit, unten weißlich
oben bräunlich od. rötlich,
bräunlich mit 1 bis ca 3 oder
4 (oben) zum Laugen sehr
großen braunen Schuppen
weißen Flöckchen u. sehr feinen
weißen haarförmigen, ge-
wundenen ca 1-1 1/2 cm langen
Haaren.

Krone äußere nach außen
gebogen, mittlere aufrecht
u. ist nach außen gebogen

2798

innere St. nach innen
gebogen, nicht gebogen klein
Öffnung mit dem inneren St.
oben verbleibend, die
mittleren $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{3}{4}$ cm lang
 $2\frac{1}{2}$ - 4 mm breit, circa $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{5}$
Höhe am breitesten vom de-
laye verzerrt. Basis
stark schalenförmig, karmin
die innere St. $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ cm
kurzer, die äußeren kür-
zer als mittlere, in die
Schuppen übergehend.

Am 2. Okt. 59 in reifen Früchten
sehr unreifen St. mit
reifen Lammern. Einmal
gleichlich Früchte einige
km unterhalb El Lumb.

2799

42 km östl. La Perouse 1. X 59

- 1) Neopt. clavata v. grandiflora
in Kn. Bl. u. unreifen St., am
häufigsten offene Blüten.
Blüte geruchlos, $4\frac{1}{2}$ - $6\frac{1}{2}$ cm lang,
Öffn. $3\frac{1}{2}$ - 5 cm weit. Daten von 6 Bl.
Frucht 5 - 8 mm lang, 1 - 1,3 mm breit
hellgrün mit sehr schmalen röt-
lichen Streifen, 1 - 2 mm langen
Schuppen u. weißen Döckchen.
N-K zweifellig, der reifere gelbe
Forts. Teil ist in den Fruchtknoten
versteckt 7 - 9 mm weit u. 3 - 5
mm hoch, bläul. Nektarien honig-
gelb, darüber geringelt.
oberer N.-K.-Teil, $2\frac{1}{2}$ - 6 (crest)
Nektarien
unterer N.-K.-Teil, 3 - 5 mm
gewölbt 1 - 2 mm lang, oberer Teil
einemalige Nektarien 3 - 5 mm lang
oben $2\frac{1}{2}$ - 6 mm weit, fast geschlossen
durch Stempel-Basis, die mit
einem dicken, weiß. bläul.
viel Nektar. Äußere Einsenkung
im Bereich der oberen N.-K.-Teile
Röhre darüber schmal fröhlich,



2800.

14-22 mm lang, öf. gering
verengt, 10-14 mm breit, öf.
durchmesser ca. 1 mm weiter.
R innen weißlich, außen braun-
schwarz, nach oben meist
mehr rötlich, nach unten ca 2 mm
lang oben ca 3-6 mm langen
braunen od. grünlichen, nach
unten schuppenförmig, mehr drüsig
gestrichelten, weißen Blocken
u. braunlichen weißen verbogenen
Böden.

Haar weiß, untere ca 2-2 3/4 cm,
obere ca 1 1/2 cm. Beutel creme.
Insekten u. 1/2 cm oberhalb 5-8 mm.
We meist etwas überlegend Kap-
pen, unten blauer bis weiß,
3-4 cm, davon 1-5 mm auf die
6-9 wenig gerichtet. Rötlich bis
braunlich, längere, rötlich, nach.
Krone 15-28 x 5-7 mm, kann
leicht aufsteht, nach unten sym-
metrisch, sehr lang zugespitzt
im unteren Teil oft unregelmäßig,
glatt, unten oft verknüpfelt.
Die inneren Krone, nach innen
gerichtet, die öf. rötlich, nach
unten mehr rötlich, nach unten
an Basis weiß, die äußeren

2801

nach außen ausgebreitet, sonst
wie mittlere, nach außen nach-
rückend u. in Falten
übergehend.

Blüten grün bis orangefarben
7-12 cm, erst rötlich,
dann sehr verlängert bis
auf ca 1 cm und dann
meist halb liegend 10-15
gerade Rippen öf. 1 cm
hoch mit geringen
Kerben, doch über d. Proten
od. Proten öf. in d.
Grund d. Kerben hier abgehend.
Hinter d. Proten stumpfe
Höcker. Proten länglich,
grün, ca 1/2-1 cm lang ca
1/2 cm breit, ca 1 cm aufsteht.
Kürze, schnell verjüngt
geringer, weiße Blüte, oft
mehrere. Wurzeln
einzeln.

Im Jahr 59 reife Fr. und unge-
reife mit kleinen Samen, selten
unreife Fr.

2802
El Trunco, ca 60 km östl. Landerena.

14. IX. 59
(*colimbalana* var.)

1) Cochimbalana var.

Blüthenblätter typisch
In Kn. Bl. in verblühten Bl. in
jungen unreifen St.
Bl. weit geöffnet stets mit
ganzem Kn.-Bl.-Stück.
Schuppen nachmittags nur
in den warmen Tagen
geöffnet; 4-5 1/2 cm lang
Stf. 3-6 cm weit. Bl. von 5 Bl.
Ordn. umgekehrt konisch, ca 7-10
mm lang, 8-10 mm oben breit
Schuppen wenige in d. Mitte, rot-
braun, schmel. ca 5-7 mm lang,
an Randrande dünne, größere,
rotbraune, reichlich schmel., ohne
Nolle.
N.-K. mit spärlich Nektar, 3-5 mm
lang, oben 3-7 mm weit. Blaf.,
subisch. od. sp. Nektar,
geschlossen durch die Schale
abgen. u. gereizten Nektar
Nektar Nektar Nektar
Nektar darüber bräunlich 10-12
mm lang, oben 1 1/2-2 1/2 cm
weit, innen blaf., außen



2803

Blaf. spiralisch.
Nektar
mit Nektar
ca 1-2 cm lang
1/2-3/4 cm breit
Nektar Schuppen

Staubf. Blaf. gelb, über der N.-K.
sehr dicht auf 2 mm Höhe
und 1 1/2-2 cm lang. Nektar geg.
den Kn. darüber Nektar von ca.
1/2-1 cm mehr aufwärts, weicher
nach oben längere von 1-1 1/2 cm
abgen. die Wand, Nektar nach
Nektar gebogen. Nektar
bis zum Nektar Nektar
Blaf. gelb
Bl. spiralisch oder konisch, Nektar
Nektar, 1 1/2-2 1/2 mm dick,
Blaf. gelb 2 1/2-3 cm, davon
3-4 mm auf die Nektar des
Nektar gelb. Nektar 9-14
Nektar Nektar Nektar
Krone Nektar des Nektar gelb
Nektar Nektar Nektar
Nektar und Nektar gelb Nektar
Nektar, die Nektar Nektar
rot oder Nektar Nektar 20-33 mm
lang, 8-12 mm breit, Nektar Nektar
an Nektar Nektar Nektar

2804

ca 1/4 verschärft, oben
gerundet oder gerbung
~~gerundet, mehr oder weniger~~
abgerundet, bilden zusammen
eine Schüsselform.

Vom 2. Det. 59 selten noch reife
oder unreife Fr., selten Blüte
oder Knospe.

Frucht 1 1/4 - 2 cm lang, 1 1/4 - 1 1/2
cm breit, rötlichbraungrün
mit ca 1 cm breitem Riefenboden
Schuppen oben gefärbt, lang und
schmal, meist ca 1/2 cm lang,
auch bis 1 cm lang, häufig
sächlich am Nagrande oder
bis etwa zur Mitte hin
mehrere.

2805

ca 15 km südl. Coquimbó
Onobrychis 12. IX 59

1) *Neoptera* ~~intermedia~~
~~intermedia~~ *intermedia*
des Vlt. *intermedia* Fr. An
Keten.

2) *Neoptera* *intermedia* var.
intermedia cf. *intermedia*
im Keten n. oben von Keten
in Pol, Kn zu unreifen, selten
reifen Fr.

Bl 3 1/2 - 5 cm lang.
N-K. konisch, oben nur gering
weiter als der Fr. Bei den kleineren
Bl nur kleine Röhre mit Kn-
strukturen bei den größeren Be
ca 2/3 der Röhre. N. d. d. d. d. d.
haben flache Schale von 1/2 - 1 mm
Höhe.

2806

12.8.59

ca 58 km südlich Loguimbo

1) *Euphorbia setiformis* v. *submediata*
 Knospengediegen am 3. II häufiger
 unreife als reife Fr. sehr selten Blüht
 (geschloßen da war)

2) *Neoportia caryophylla* var. *intermedia*
 in Blüthen häufig auch Kn. II
 unreife Früchte am 3. II selten
 Blüht noch Früchte

gerundet 4-7 cm lang,
 3 1/2-7 cm weite Öffnung.
 Asen von 4 Blüthen.

Frühe 5-7 mm lang, 8-11 mm
 breit, grün, blüht weiß
 Flöckchen, wenige schmale rote
 1-2 mm lange Schuppen.

N-K reichlich Nektar, röhren
 Teil 1 1/2-4 mm hoch, 5-6 mm
 weit, schüsselförmig, darüber
 zylinderförmige Nektarzone, oberer
 Teil mit d. Nektar. 3-4 mm lang,
 sich nach oben verschmälernd bis
 nahe an d. Griffel. N-K. fast
 geschlossen durch anlehn. inhere
 Lippe

R. darüber höher, 1,8-2,3 cm
 lang, oben 8-12 mm weit, Öffn.
 oft etwas verengt, so daß etwas

2807

darunter meist zum weichen.
 innen weiß, außen grünlich
 bis grünlichbraunlich eben-
 solche Flöckchen. N. 2-6 (stark) mm
 lange schmale rote
 Schuppen mit sehr



Handf. weiß, 2-3 1/2 cm lang,
 die mitte die längsten
 Beutel röhren, sehr klein.
 zusammen bis auf die
 obersten ca. 8 mm
 ist überlegend weiß, nach
 oben meist kamieren, 3 1/4-4 3/4
 cm lang, davon 5-8 mm auf
 die 6-8 ringförmigen meist gelb
 geist. Nektar

Knochen, mittlere 16-30 mm lang
 6-8 mm breit, mehr aufrecht
 od. st. nach außen gebogen,
 nahe unten am breitesten, sehr
 lang, rings mit selten mehr gerundet,
 kamieren bis kamierenrosa,
 die meisten nach innen gerichtet

2808

nur geringe Öffnung sondern mit
den nachbarlichen Blättern meist
3/4 - 1 cm kürzer als die äußeren
in der Achse. Die äußeren
stärker zurückgeschlagen,
lang, nur die jüngeren kürzer,
u. schmaler, die inneren
nicht weiß.

- 3) *Trichocereus nigripilis* n.
reife Fr. am 3. XII 59.

Syntherisma n. *intermedium*

(zu S. 2806) 1 Blüte: 42 cm lang

Früh, 9 mm lang, 4 mm breit

grüne Flockchen, rote 2 mm

lange spitze Schuppen, dunkelrot

N-K 3 mm lang, kubisch sehr

eug, ohne Stempel u. Wand vorragend

aus der Mitte durch 2 mm

haken bläulich. Die Narbe

ausgestülpt 9 mm lang, 5 mm

weit, innen gelblich, außen

bläulich, sehr wenige

schmale Schuppen, die oberen

mit weißen roten Spitzen

grüne Flockchen, Staub gelblichweiß

nach oben wachsend 10-12 mm

parallel, Stempel runde 2,3 cm

Narben ca. 2 mm lang, 2 mm

breit, ca. 2,3 x 6 mm, die inneren

mit gelben roten Spitzen, die äußeren mehr rot

klein, nabelförmig, sehr breit u. stumpf

2809

Loganiboa 13. IX 59

(mit *intermedia* var.)

1) *Neogorteria* *Loganiboa*

mitte in Bl. kn. u. reifen

Früchten. Bl. am oder nahe dem

Scheitel 2 3/4 - 5 cm lang, der

typischen Pflanzen, 3-4 cm weite

Öffnung. Blüte ist wie die

von *Diarrhiza*, also jeden-

falls nur Varietäten einer

Art. N-K so wie dort bei

den kleineren Blüten ist aber

der Boden der mehr flach,

so daß die Höhe des mittleren

Teiles fast nur auf die Höhe

der Nektarien entfällt.

Fruchtscheitel oft nur

etwas mehr als halbe Höhe,

zuweilen aber fast wenige

mm unter Rohrand.

Kronbl. ganz wie bei *crassi-*

spina, nur relativ kleiner.

Bl. außen schwarz wie dort,

schmale rote Schuppen

u. feine weiße wliche Borsten

Untersucht 6 Bl 2810

- 2) Neoport. litoralis reif
Fr. selten unreife, keine Bl.
Fr. spärlich
- 3) Pyroca ~~litoralis~~ microphylla
Knospubegrenzt.
- 4) Trichoc. nigrispilis
Knospen; diese sehr klein
- 5) Eulychnia longispina
Knospen
- 6) Lumlop. berteri spärlich

F → Same ebenso wie von Nr 3
wird wohl als Var. zu microphylla
gelten müssen.)

ca 15 km östl. La Jarena
13. IX 54

- 1) Trichoc. nigrispilis im
Knospen; unreife Blüte von
13-15 cm Länge; seitlich.
- 2) Pyroca litoralis microphylla
im Knospubegrenzt.
- 3) Neoportia microphylla
im Knospen, selten unreife
Fr. Keine Kn + Bl. schon sehr
klein, bestäubig.
- 4) Neoport. litoralis cf. var. microphylla
ebenso im Knospen, ohne Kn + Bl.
dicker als Nr 3. Fr. weniger rund
derber; in der Jugend der Nr 3
angenähert; aber Nr 3 ist keine
persistierende Jugendform;
auch wenn sehr groß und
lang werdend, sind die Fr.
immer viel härter als bei
Nr 4. Übergänge zw. 3 und 4.
Nach den Blüten werden sind
die Früchte von beiden von gleicher
Größe in der Länge zieml. variabel,
höher als wagelkugelförmig. Früchte
von beiden etwa gleich, aber Fr. von
Nr 4 meist stärker. F2 aber Fr. von

Oralle, 14. IX 59, 2812
1. Neogontheria sevilis FR474a

~~sevilis~~ sevilis sevilis sevilis sevilis
 stark u. weig. dann wohl weiß,
 Gummien sehr fest u. weniger
 dann wohl mehr inigulirte.
 In unreiferen reifen Es. Gummien
 oder große Kropfe, die
 von 3. Gummien

Bl. gemacht, 4-5 cm lang, 1/2 cm
 3-4 fast 5 cm weit, Bl. sevilis sevilis
N-K anders als sevilis sevilis
 und etwa 20 wt. sevilis sevilis
 - u. sevilis sevilis sevilis sevilis

2- teilig; unterer Teil eine
 Schale, oberer Teil fest um-
 geklebt. sevilis sevilis sevilis sevilis
 Teil 2-4 mm lang, 4-6 mm
 breit, dann die Kelt, ca 1 mm
 hoch, oberer Teil (mit den Kelt)

2-4 mm hoch, sevilis sevilis sevilis sevilis
 1/2-1 mm, sevilis sevilis sevilis sevilis
sevilis sevilis sevilis sevilis
 sehr breit und kurz, vierfel-
 mindförmig. (J. 2814)

Es. 4-5 mm lang, 8-9 mm
 breit, grünlich weiß,
 Flöckchen sehr schmalen



1- 1 1/2 mm langen roten Schuppen
 darüber kann Verengung
Es. über N-K schmal, fast 1 mm
 1 1/2-2 cm lang, oben 9-9 mm
 weit, innen weißlich, außen
 blaugrün, nach oben bläulich
 bräunlich mit wintigen
 weißen Flöckchen, roten Schmalen.
 1-3 mm langen Schuppen
 u. weichen gefügten weißen
 Schuppen, die sehr nahe
 fallen können. Wenige über-
 hänge in Korb.
Bl. weiß 1 1/2-2 cm, die oberen
 1 1/4-1 1/2 cm, untere u. mittlere
 etwas gleichlang. sevilis sevilis
sevilis sevilis sevilis sevilis
Es. überdiegend, unten weiß, oben
 karmin 3 1/2-3 1/4 cm, davon
 4-6 mm auf die geradlinige
 geradlinige 5-8 mm geradlinig
 bis Schuppen, selbsten bis 10 mm
 nach. die in der off. sind
 oder etw. tiefer, fast bis

2814
 oder auch durch die inner. Kronbl.
 bedeckt.
Kronbl. mittlere etw. nach außen
 gerichtet, kaum gebogen
 Karmis. 12-15 cm x 4-6 mm,
 gering über Basis am breiten
 den lang nach oben zugespitzt,
 Seiten nur wenig unten nahe an
 parallel (linealrm.). äußere
 Kronbl. stark nach außen
 gebogen, kürzer, kaum schmalen.
 Peridre Kronbl. nach innen
 geneigt, geschlossen oder offen
 nur die Narben beiseite, schwa-
 ler n. ca 2-4 mm (Häutchen),
 untere Hälfte weiß.
Fruchtknoten ca 1/3 der Höhe.

F von 2 weifere Blüten hatte die
 eine line. N.-K. etwa wie hier an-
 gegeben, die andere etwa wie bei
Schubert von Vicuña.

2815
Mine Dorado 15. IX 59.

- 1.) *Curatella berteri*
- 2.) *Eulychnia acida* Kunze
- 3.) *Trichocereus rigipilis* in
 Übergängen zu *chilensis*
 var. *pentophyllus* Kunze
- 4.) *Eriozyce ichthyoceras*
 ohne Kn Bl.
- 5.) *Pyrausta fuscus* Kunze
 beginnend etwa wie *Vicuña*.
- 6.) *Pyrausta nigricans*, oft
 in Übergängen zu fuscus.
 kleine Kn.
- 7.) *Neoporteria nigritorrida*,
 bisweilen mit *canadensis*
 von *semitis* var. *nigra*
 Kn, Bl. unreife, selten reife Fr.
 (8. Neoporteria *semitis* v. *nigra*
 als mal nicht absehn.)
 F Blüten 5-6 1/2 cm lang, 3 1/2-6 cm
 weit. Blüte ist weiß
 die von Coquimbó n. 58 km
 süd von Coquimbó. N.-K. so

2816

wie dort Mutationen außer den
obersten 3-8 mm des 15-23
mm langen Rohrs oberh. der N-K.
Die von Löffelröschen als
Küsterblütige, die von 5 Plm.
sich Logarithmisch ab, meist
großblütige Varietäten mit
meist weniger Stacheln geführt
werden (Absterben).

2817

Abzucht

Salamanca, 16 IX 59. 50 cm hoch.

1.) Mesaspesia multicolor
großes, sehr unreife Fr.

Blüte geruchlos, röhrenförmig
6-8 cm lang, Öffn. 4-6 cm weit, 8 Stacheln

Frucht, grüner bis olivgrün, 7-11 mm
lang, 3-11 mm breit, kleine weiße
Flecken n. außen 1/2-1 mm lange
Röh. bis grüne Stacheln.



2 mm breit. 2 mm lang
Teil über den Nektarien brichter-
förmig, Blaf 2-4 mm lang, oben
bis nahesten an den Sp. verengt.
N-K. ringförmig 4-9 mm lang.

oberer Teil brichterförmig.
unterer Teil schüssel- bis röhrenförmig.

2818

Röhre darüber schmal trichterförmig, $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ cm lang, oben 10-13 mm weit, innen weißlich, außen grünlichbraunlich, nach oben dunkel braun mit oberflächlichen Fleckchen. Dreieckigen, nach unten auch runderen, Köstchen, nach unten auch grünlichen, ca 2-4 mm langen Schuppen u. mit wenigen kleinen unteren weissen verbogenen Dornen. Haute weiß, mittlere $2\frac{1}{2}$ - 4 cm, obere $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ cm lang, parallel, Dicke der Beutel fällt wenig variierend, etwa auf halber Höhe der Krone zu etwas tiefer als die Narben. Beute u. Tollen kreine. Insettkrone bis $\frac{1}{2}$ - 1 cm unterhalb abbrechende. Gr. gut überragend, mit dem Narbin in der Öffnung, weiß, oberes Ende meist rötlich, selten Narben herausragend; l. 5 - $6\frac{1}{2}$ cm lang; davon 4-8 mm auf die 7-9 zugespitzt gerichtet. Bl. gelben bis weissen gut behaarten Narbenstrahlen.

2819

Krone 14-30 mm x 5-7 mm

Basis der verbleibenden unteren Hälfte nach unten länglich oben lang zugespitzt karmen nach den Rändern oft schwach karmen, Basis oft weiß, oft nach außen umgebogen, äußere stark nach außen umgebogen, farbiger als die inneren, kürzer als in die Schuppen übergehend. Innere nach innen gerichtet, etwa eine Öffnung von mehreren mm lassend mit den gerichtet nach unten, wie an den Enden karmen, ca $\frac{1}{2}$ cm höher u. ca 2 mm dicker.

Gr. hatte immer sehr reiches Netz und werden so wenig wie bei anderen. Sehr viele kleine Insekten darin gefunden. Käferchen, die durch die Schanblüte angelockt werden, finden meist nicht zum Nest hin, bleiben in den äußeren inneren gefärbten Krone. Aber zuweilen fressen Käfer die Krone und es kommen dann zu

2820

sehen an die H.-K., was Ausnahme
bleibt. Der geruchlose Blüten
finden sich meist oberhalb
Ankeren ein, um den König
zu regieren. Den König der
versteckten H.-K. der unbekannten
Blüten finden sie aber nicht.
Bleibt unbekannt wie sich die
Befruchtung vollzieht.

multicolor hat die größte aller
Neoport.-Blüten, aber Neoport
von 2830 etwas anders.

Im 9. Oktober nochmals dort. In der
Lage noch Blüten zweier
großer Kuppen. Infolge dieser in
Lage nur sehr wenig Fruchtansatz.
Drückt Ankerment hervor, selten
mühsam mit reifen Samen aus
sich ausgereift, rot, bräunlich
gelb.

Mäßig große weiße Rinde wurzel
ohne Welken Hals. Höhe ca
400-500 mm über d. Meer (Hohmer) ^{ca 950 m}
(Lage ca 950 m).

Im 27. XI 59 Früchte reif und
nicht ausgereift sind. Keine
keine unreife Fr. Dreierknoten
Pflan. ohne Früchte.

2821

Pichidangui, 17. IX 59

1) Neoportia subglabra Ku Pol +
mühsam blüht.

Blüte geruchlos 4-5 1/2 cm lang,
Öffn. 3 1/2-5 cm weit. Blüten
von 4 Blüten. Nektar meist
reicht.

Frühe 7-10 mm breit, 5-8 mm lang
lividgrün bis bräunlichgrün,
kleine weiße Flecken, schmale
rote bis fast weiße 1/2-mm lange
Schuppen. N.-K. unterer Teil



fleischig, fadenförmig, ca 1 mm
hoch, Nektar in Längsgefäß,
oberer Teil weiß, ober-
nektarisch springend
unter. Teil oberer Teil

Früchte über den Nektar 2-3
mm hoch, nahezu geruchlos
an der Basis der Frucht
N.-K. im Ganzen 3-5 mm lang,
4-6 mm breit, bläß.

Röhre darüber Fruchtkörper 15-18
mm lang, oben 9-14 mm weit
weiß außen, bläß rot innen
grünlich mit roten 1-5 (oben)
mm langen, schmalen Schuppen
weiße Flecken & Wunden mit den Borsten

2822

Pichidargui

Staub weiß $1\frac{1}{4}$ - $2\frac{1}{2}$ cm, die
 Oberseite am kürzeren Ende, unterseits
 in oberer Dentel eine Höhen-
 differenz von $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{4}$ cm,
 Staub parallel. Dentel + Pollen creme,
 Insektenzug, bis ca. 3-7 mm
 unterhalb Röhrenmündung
 mit Harz sehr hervorragend,
 weiß, selten oben rötlich, $\frac{3}{4}$ - 4 cm
 lang, davon 4-7 mm auf
 die Hs. - geneigt bis gespreizt
 fleischgelb unterseits 6-10
 Nervenadern, die meist in
 d. Öffn. stehen, hinweisen auch
 bedeckt bleiben.

Kraube, mittlere 18-24 x 5-6 mm
 sehr lang zugespitzt, hinweisen
 Ende abgerundet. Größe
 Breite bei $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ Länge,
 unten wenig verjüngt,
 karmin oder weiß mit
 karminen Enden fast
 aufrecht, lfd. nach außen
 gebogen. Innere nach
 innen gebogen, größeres
 Teil weiß, seltener zum
 Karmin als die mittleren u.
 lfd. schmaler, kürzer,
 stärker nach außen gebogen,
 groß wie mittlere, aber

2823

die äußeren kleiner, mit meist
 viele Verzweigen in d. Krone.
 Nur Südküstenvorgänge 2. auf Nr. 2.

2) Syntherisma chilensis, bildet
 + Abweilen typische mit subgl.,
 diese haben Hs. geschlossen
 meist rote Blüte mit lfd.
 kleineren in schmalen
 Kronblättern.

chilens. in Krone ziemlich
 häufig auch Blüte T
 Blüten schwarz duftend,
 $3\frac{1}{2}$ - 5 cm lang, Öffnung
 weit. Daten von 4 Blüten.



N.-K nicht zweifellig sondern
 kurzröhrig. Nektar sehr
 öfters nicht immer zu
 schmecken. Über M.-K. kein
 oder nur sehr wenig Nektar
 vorhanden. N.-K. halbfest,
 durch geg. gen. gezeichnet
 N.-K. kann von R. abgesetzt

Form 26 XI 57 reife + unreife Fr. - selten Blüte

Trichidacna 2824

Nektar nicht sichtbar. N.-K.
 1-2 1/2 mm lang ca 1-1 1/2 mm
 weit von d. Griffel. Blüte gelblich.
 Röhre darüber weit
 trichterig, 11-13 mm lang,
 oben 13-18 mm weit. Außen
 stark bewollt in behaart. Das
 gelbbraune aber blasser
 innen weiß. Röhre oft
 noch auf d. Frucht. N. auf
 grüner, nicht bewollt.
 Schuppen grüner dichter,
 aber auch röhrl. Schuppen oft
 kaum weiß bis blaßgelb, alle
 fast gleichlang ca 8-15 mm
 so nach Polster. Röhre mehr
 nach innen, creme, Röhre
 creme, Faser außen
 oben 2 1/2-4 mm.
 Lf. überwiegend weiß blaßgelb
 21-30 mm, davon 3-5 mm
 auf die weiche gerippte
 zugespitzten 7-10 Narbenlappen
 Krone bilden. N. meist
 eine Schüssel, auch die
 äußeren nicht nach außen
 umgebogen, sondern
 aufrecht. 1 3/4 - 2 3/4 cm

2825

5-8 mm, unten ca halbe
 Breite, bei ca 4/3 Länge am
 breitesten. sehr reich,
 die röhren kaum kleiner
 viele Übergänge in d. Schuppe
 Farbe blaßgelb die äußere
 oft ~~hellrosa~~ oder
 fast reinweiß mit rosa
 Enden. Krone oben mehr
 oder weniger zugespitzt
 mit aufgesetzten Spitzchen
 F. seltener auch die innen
 rosa)

Trichidacna, y. purpurea

3) Neoport. sub gibbosa, kleinst
 varietät, bei Trichidacna
 Krone und Krone warzen
 im Norden. In ungeriffen Dr.
 mit reifen Lappen, weniger
 ausgefalte Dr. oder unreife
 Lappen, selten Bl. oder fe
 große Krone (Mutter). 8-13 cm
 mit 17-25 Rippen.
 Blüte 2 1/2 - 3 1/4 cm lang. Offen
 2-3 cm N.-K. 2 1/2 - 4 mm lang
 3-4 mm weit, Röhre wie die
 andere sub gibbosa

Pichidanguin 2826

Invert. amper oberst 3-5 mm
 vom Rohr ebenso. Kronbl. kleiner,
 8-12 mm lang, 3-6 mm breit,
 Form wie die andere. Röhre
 7-11 mm lang, oben 6-9 mm
 breit. Schuppen Filum meist
 blaf, selten rotlich, saust R. + Th.
 wie andere subgibbosa.

Wächst nicht so mit Nr 1,
 Wächst dicht an den Krüpfen-
 felsen während im Süden
 Nr 2 an den Krüpfenfelsen
 wächst und Nr 1 (subgibbosa
 langblütig) landet u. wärts
 davon an den flacheren Stellen.
 Daten von 5 Blüten.

4. Trichocereus litoralis im Kn.,
 selten Blüte

5. Eulychnia castanea
 ohne Kn Bl. Th.

2827
Las Virnas 20. IX 59.

1.) Neoport. comasensis
 im Sanden Dr. (weil liegen die
 Blütenenden fressen) + Bl. oft
 durch noch Knospen.
6 Blüten beobachtet
Bl 5-7 1/2 cm lang, Offn 4-6 cm weit.
1-K gut abgebliesen durch den
 Wandvorsprung in die Spandf.
 Basen die sich dicht den
 Anlagen N-K. 4 weichen
 an der Teilw. ansetzt u. umg.
 1 1/2-3 1/2 mm hoch + 7 mm weit
 kleine hornigall. 1 1/2-3 mm lang
 starr vorstehend. darüber
 trichterig 2-4 mm lang.
 in 4 Lagen # 5-12 mm lang.
R darüber 24-26 mm lang
 8-12 mm weit, Knospe außen
 obersten 5-10 mm.



Filum 6-12
 mm lang
 8-12 mm
Knospe 15-20
 5-7 mm
 Form wie sub-
 gibbosa

2828

- Wp 3 $\frac{3}{4}$ - 5 $\frac{1}{2}$ cm, überragend,
Narben in Offn., runde, lichter
als die inneren, Krone. Ex. weiß, oben
meist rötlich. Narben 7-10
von 4-8 mm, hellgelb wie Pollen,
meist rügenspitz, bis gerundet.
Blauß weiß 1 $\frac{1}{2}$ - 3 $\frac{1}{2}$ cm. Stems
alle Narben gleichlang, oder
die oberen kürzer als die
unteren.
2) Trichoc. chilensis Kn.-Beginn.

Chagres 20. IX 59

- 1) Neoport. coimaseusis wie
Las Coimas, reichlich in
Blüten, unreif Ex., häufig
auch Kn. Blühend wie
Las Coimas. Bei Las Coimas am
18. XI 59 unterirdisch, nur häufig
2) Tyrcho. coimaseusis Kn.-
Beginnende u. reifere Kn.,
weniger große Kn. 1 Blüte
(photographiert).

2829

Valparaiso 21. IX 59

- 1) Trichoc. litoralis Kn. + Bl.
Stems Blühen von ca 13 cm Länge.
2) Neoporteria subglabra, Mittels
Ziehl. Stems bis gelb, schwarz
im Neutrieb bis kastanienbraun,
großblättrig. Bl 4-5 cm lang.
Mittels. Weniger als bei der
kleinblättrigen von Pichidengui.
In Bl. Kn. u. unreifen u. Stems
auch schon reifen Fruchtkn.
N-K. wie bei Art von
Pichidengui.

2832

Bankel u. Pollen creme.

Au einer Blüte war eine pollen-
sammelnde Wildbiene zu sehen;
die sehr viel Pollen dieser Farbe;
hatte. Die Blüte die sie besucht,
bildet ihren Hohlraum. Die Biene
vermag nicht mit N.-K. ein-
zudringen.

Rippen bei großen Yucca - Pflanzen
bis $1\frac{3}{4}$ cm hoch. F
geht bis ziemlich zur Spitze
des Berges; an Felswänden
häufig.

Frucht ca 2-3 cm lang, ca $1\frac{1}{2}$ -2
cm dick rot oder rötlich mit
sehr kleinen weißen Fleckchen
u. kleineren $\frac{1}{2}$ 2 mm langen,
schmalen röt. od. blauen Schuppen.
F Rippen bei Neop. wislizenii
von Chilcas nur $\frac{3}{4}$ -1 cm
hoch u. kleinere Areolen)

2833

El Yobre

Copiaroa tenuis Blüte gegandt
von Glide, untersucht, gepfl.
in Valparaiso p. X 59. FR 570
Länge 8 mm, Öffn. ca 16 mm.
Falk blaf, ca 3 mm lang mit 2
mm breit, gestreckt ohne
Schuppen; in den Röhre der N. K. nur
einige weiche, ca 1 mm lange,
schuppenartige Schuppen;
so viel ganz raus, als die Länge der
rechten Schuppen. Nollwischechen
haben.

N.-K. etwa 1 mm lang, ca $\frac{1}{2}$ mm
breit, mit d. lft. blaf, offen.

R darüber ca 3 mm lang, oben
ca 5 mm weit, innen blaf, goldlich,
außen grünlichgelblich, mit drei-
eckigen weichen, schwach braunen
2 mm langen Schuppen (ohne Nollw.).

Haar goldgelb, alle dreieckig
gleich lang, ca 6-7 mm. Bankel
gelb, rund, Pollen goldgelb.
Haar aufrecht, festsitzend, bis nahe
zum Rohrande.

Gr. 9 mm lang, bräunlichgelb mit
etwa gelblichbraun Narben von ca
2 mm Länge.

Krone, ca 8 x 3-4 mm, hellgelb, die
äußeren nach oben rötlichbraun.

2834
 abgerundt, spatelförmig.
 1 Blüte getrocknet, gepreßt, mit mäßiger
 Erhaltung der Blüte.
 2. Blüte: Auch hier nicht so aus, als
 ob Willkommenschalen aus runderen
 Schuppen. R. ca 5 oder 4 1/2 mm
 lang, oben vielleicht 1 cm weit
 oder weiter, innen u. außen
 ebenso. N-K nicht größer als oben.
 Staub ca 6-8 mm lang, färbere
 u. längere gemischt, sonst wie
 sonst. La. 12 mm lang, gelblich
 davon 2-2 1/2 mm auf die 7 oder
 8 bräunlichgelben Neben-
 blätter hellgelb die äußeren oben
 bräunlichrot, stumpf, spatelförmig.
 10-13 x 4-4 mm
 Bl. 22-23 mm lang, mit mäßiger
 Erhaltung der Blüte.

2835
 Oberhalb Inco 10. X 59. ca 600 m
 1) Neoport. semis. Zuweilen noch
 groß, seltener große Knospen.
 Fast wie Fruchtansatz. Die selte-
 nen Fr. fast stets noch unreif oder
 zuweilen am Reife.

2) Symploc. curvirostris v. com-
 m. var. balensis meist Knospen-
 beginn, öfters größere Knospen.

3) Symploc. fusciflorus cf. selten
 in d. Spindel, kaum abgeflacht.
 Vielleicht var. von curvirostris.
 Knospenbeginn. Siehe
 auch nächste Seite Nr. 2.)

Matucilla 10 X 59 ca 600 m

1) ~~Neoport. semis.~~ ~~Neoport. semis.~~ ~~Neoport. semis.~~
 von Matucilla am Wege nach Inco.
 (Matucilla 300 m hoch). Groß, zieml.
 langgestreckt. Die Blüte aus
 wie in den mit abh. com-
 m. semis. zieml. vielrippig
 (etwa wie spinosissima). Die
 reifen Fr. diese spärlich
 1 große Knospe. In Schieferwänden

FR 474b

2836

curvica. v. fuscaeflorum
 2.) *Pyrrhocact.* wie vor. N. 3.
 auch etwas mehr nach
curtispinus. Knospengrün
 schwärzlichgrün wie vor
combarbalensis.

- 3.) *Trichoc. chilensis*.
 4.) *Eulychnis acida*
 5.) *Limnoph. berterii*.



2837

Esmeralda

Chileorebutia esmeraldana FR518.
 gepflanzte Beute gesamt von Tübingen
 untersucht in Valparaiso
 am 12. X. 59.

Blüte 4 1/2 - 5 cm lang, Öffnung
 trichterförmig, weiß. Blütenblätter 2. Bl.
Ftbl. 4 - 6 mm lang, 8 - 11 mm breit
 grünlich, aber Farbe nicht sicht-
 bar, weil völlig bedeckt mit langen
 weißer Wollschuppen. Schuppen dunkel
 braungrün 1 - 2 mm lang, schmal.
~~Bl.~~ Samenkammer etwas
~~trichterförmig~~ nierenförmig (in Zwick-
 überwiegen dann die relativ
 längen) kein Strahl darüber
 außen, dann einige feine, helle
 strahlenförmige Borsten.
Stk. 12 - 15 mm lang, weiß in
 der Ftbl. eingelassen.
 3 - 3 1/2 mm lang und ca 7 - 8 mm
 oben weit, offen. Blap. oben tubul.
Rhr. darüber ca 12 - 15 mm lang
 unten ca 7 - 8 mm weit. Öffn.
 ca 13 - 18 mm weit. R. trichterförmig
 trichterförmig, dann weit trichter-
 förmig werdend, und wieder
 trichterförmig werdend. In der wieder
 trichterförmig werdend. Tubu-
 lärer Teil ca 1/2 cm lang.

2838

Röcke innen bleß gelblichgrün,
außen wie Eisen, die Rücken-
schuppen hellbräunlich; die
Schuppen ca 3-8 faden, nun lang,
schmal, dunkel bräunlichgrün.
Haute hellgelb, zahlreich ca 7-10
nur, die unteren die längeren,
breit, gleichmäßig vertikal
mit Ausnahme der oberen, faden
ca 4 oder 5 mm der Br. Bantel
creme gelb, schmal, ca 1 mm lang,
faden keine.

Griffel rötlich, nach oben rötlich-
braun, ca 23 mm lang, mit
etwas überlegenden Narben,
in entfallen ca 5-7 mm auf die
etwa 10 gelbbraun behaarten, meist
ausgebildeten, etwas krummen
Narbenstrahlen, die nur oberhalb
knaul, ca 22-25 x 4-7 mm breit
nadelformig, aber oben breit
lang zugespitzt, hell grünlichgelb,
die breiten Ränder sehr bleß, die
Enden der Ähren rotbraun.
Rückenschuppe.

2839

In Mafancilla 2835

1) Neopocheria semilivida FR 474

Valparaiso 15. X 59.

Bl ca 5 cm lang, Offen 3 cm weit
gerichtet.
Fäden bläulichgrünlich, mit weiß
Flöckchen ca 9 x 9 mm, schmal
N-K. unter. Teil schmal, fadenförmig
1 mm hoch, 5 mm weit, bleß,
dopp. Nektarien auf ca 1 mm
Höhe, die vordringend, dann
ober. Teil sich verengend, fast
umgekehrt trichterig, endet in
einem ringförmigen, dreieckigen
als Wandvorragung bleß, bis an
d. sp. kranzgebend. N-K gerollt,
wie das Lörmas, ober Teil mit
Nektarien 4 mm lang.

Röcke darüber 2 faden lang,
oben 8 mm weit, sehr
schmal, fadenförmig, breiten
bragmisch, weiß
weiß Flöckchen, fadenförmig,
weilen, sehr weilenförmig,
u. rötlich schmalen 1-3 faden
mm langen Schuppen.
Haute weiß, 1 1/2-2 1/2 cm,
die unteren die längeren,
parallel, faden, bis 8 mm unter Offen
Bantel creme, 1/2 mm lang, faden
creme.



2840

Ep. tam. überaus gut in der
 Öffnung unten weiß oben rot,
 Himmelfarb die 7 hellgelben,
 Stummelflecken Karminlappen.
Kraute tiefere Karmin innerer
 unten weiß oben Karmin,
 äußere ausgebleicht, innerer
 aufrecht, mittlere am größten
 ca 1 1/2 cm x 4-5 mm lang
 zugespitzt unten Karmin
 oben weiß, innerer
 ca 12-3 mm, beinahe geschlossen
 Öffn. in Mitte der Narben.
 äußere kleiner.


Die genommenen Harteln unter gleichen
 mehr sensilis als rudus nur sind
 die größer als sensilis, aber von
 Farbe etwa wie rudus, etwas gebogener
 als rudus und darin wie sensilis.
Randspitzen sind mehr als bei rudus
 und bilden wieder sensilis gleichend.
Blüte Körner die von sensilis wie
 rudus sein. Danach wird man wohl
 doch annehmen können daß rudus
 durch Einwirkung von Licht, Nahrung
 (die weniger Karmin hat) entstanden
 ist (wie ja auch Winterformen
 von El. laeta zeigen), und man
 wird rudus doch nur als Var.
 von sensilis auffassen müssen
 und ebenso als rudus als Varietät Km.

2847

Villa Pret, 16. X. 59.

- 1) Trichoc. chilensis.
- 2) Pyrocephalus macronus ohne
 Ku Bl. Tr. (gute Aufg.)
- 3) Neopetelia castanea Blüten,
 große Ku. + unreife Tr. nur
 1 Tr. mit reifen Samen.
Blüte 6-6 1/2 cm lang, Öffn. ca 4 cm
 weit, geruchlos, oben 3 Bl.
Tr. allseitlich nicht abgesondert
 mit sehr rötlich-wirrigem
 weißen Fleckchen u. schwarzen
 2-3 mm langen grünlichen bis
 rötlichen Schnaps.

N-K 9-10 mm lang, 4-5 mm breit,
 unter. Teil schüsselförmig, 2-3 mm
 hoch, oben 4-5 mm breit, blatt. darüber



Es am N-K-Ende, kein Trichter,
 in N-K. oben offen, aber untere
 Haupt, mehrere Nektarien.

2892

im ganzen R. außen am Ende der
N.-K. am schmalsten. Röhre
darüber 21-24 mm lang, oben
10-13 mm weit, brüchig,
innen bläß, außen fast flock-
schneidig, gewölbt, mit Spinnen bis
4 (oben) und lauw. rot die außen
mehr grünlich, die oben mehr bläß
rot. Glanz dreieckig, behaart,
ganz vorhanden. Blatt weiß,
2-3 cm lang, die unteren die
längeren parallel, Rand
zitrongelb, kleine Dellen.

Kraut [Kraut] die inneren
untere Hälfte weiß.

Blüte 20-22 x 5-6 mm,
innen ganz hell so breit, von
verschiedent mit grünl. Sa-
nden oder länger, länger, nicht
große Bl. bei ca. halber Länge,
äußere ausgebreitet, innere
etw. nach innen, eine Öffn.
von ca. 1/2 cm Längs. Innere
ca. 1 1/4 mm x ca. 3-5 mm. Außen
die äußere spärlicher nach außen
gekrümmt.

W. weiß, oft nach oben rot.
Farben überwiegend Lf. 5-5 1/2

2893

im lang, davon + mm auf die
ca. 9 gestrichen stumpfen Narben-
lappen.

Rammisch Kirschen vorpung
bei Conception ca 36° 45'
Breite

Neoporteria andyibloze von
Musschen wie bei Valparaiso
u. Concon. Blüthenöffnung
zug bis auf die Narben
Blüthengröße, Blüthenstellung, Be-
haart, N.-K. wie bei Valpa-
raiso. Röhre ebenfalls wie
bei Valparaiso. Blüthenlang,
gerade, Kränze, glanz.
Nur an der Spitze der
der Kränze, die Kränze
in großen Kränzen Bl. + sehr
unreifen Kränzen.

25. I 59/ 1.81 + 574.429.
 26. Saas Rte Pude Mo Doumings
 27. 57.
 28. 57.
 29. 57.
 30. 150.
 31. 100.
 32. 360.
 33. 300.
 34. 300.
 35. 300.
 36. 300.
 37. 300.
 38. 300.
 39. 300.
 40. 300.
 41. 300.
 42. 300.
 43. 300.
 44. 300.
 45. 300.
 46. 300.
 47. 300.
 48. 300.
 49. 300.
 50. 300.
 51. 300.
 52. 300.
 53. 300.
 54. 300.
 55. 300.
 56. 300.
 57. 300.
 58. 300.
 59. 300.
 60. 300.
 61. 300.
 62. 300.
 63. 300.
 64. 300.
 65. 300.
 66. 300.
 67. 300.
 68. 300.
 69. 300.
 70. 300.
 71. 300.
 72. 300.
 73. 300.
 74. 300.
 75. 300.
 76. 300.
 77. 300.
 78. 300.
 79. 300.
 80. 300.
 81. 300.
 82. 300.
 83. 300.
 84. 300.
 85. 300.
 86. 300.
 87. 300.
 88. 300.
 89. 300.
 90. 300.
 91. 300.
 92. 300.
 93. 300.
 94. 300.
 95. 300.
 96. 300.
 97. 300.
 98. 300.
 99. 300.
 100. 300.

21. I 59/ 1.81 + 608.872.
 22. 1.81 + 608.872.
 23. 1.81 + 608.872.
 24. 1.81 + 608.872.
 25. 1.81 + 608.872.
 26. 1.81 + 608.872.
 27. 1.81 + 608.872.
 28. 1.81 + 608.872.
 29. 1.81 + 608.872.
 30. 1.81 + 608.872.
 31. 1.81 + 608.872.
 32. 1.81 + 608.872.
 33. 1.81 + 608.872.
 34. 1.81 + 608.872.
 35. 1.81 + 608.872.
 36. 1.81 + 608.872.
 37. 1.81 + 608.872.
 38. 1.81 + 608.872.
 39. 1.81 + 608.872.
 40. 1.81 + 608.872.
 41. 1.81 + 608.872.
 42. 1.81 + 608.872.
 43. 1.81 + 608.872.
 44. 1.81 + 608.872.
 45. 1.81 + 608.872.
 46. 1.81 + 608.872.
 47. 1.81 + 608.872.
 48. 1.81 + 608.872.
 49. 1.81 + 608.872.
 50. 1.81 + 608.872.
 51. 1.81 + 608.872.
 52. 1.81 + 608.872.
 53. 1.81 + 608.872.
 54. 1.81 + 608.872.
 55. 1.81 + 608.872.
 56. 1.81 + 608.872.
 57. 1.81 + 608.872.
 58. 1.81 + 608.872.
 59. 1.81 + 608.872.
 60. 1.81 + 608.872.
 61. 1.81 + 608.872.
 62. 1.81 + 608.872.
 63. 1.81 + 608.872.
 64. 1.81 + 608.872.
 65. 1.81 + 608.872.
 66. 1.81 + 608.872.
 67. 1.81 + 608.872.
 68. 1.81 + 608.872.
 69. 1.81 + 608.872.
 70. 1.81 + 608.872.
 71. 1.81 + 608.872.
 72. 1.81 + 608.872.
 73. 1.81 + 608.872.
 74. 1.81 + 608.872.
 75. 1.81 + 608.872.
 76. 1.81 + 608.872.
 77. 1.81 + 608.872.
 78. 1.81 + 608.872.
 79. 1.81 + 608.872.
 80. 1.81 + 608.872.
 81. 1.81 + 608.872.
 82. 1.81 + 608.872.
 83. 1.81 + 608.872.
 84. 1.81 + 608.872.
 85. 1.81 + 608.872.
 86. 1.81 + 608.872.
 87. 1.81 + 608.872.
 88. 1.81 + 608.872.
 89. 1.81 + 608.872.
 90. 1.81 + 608.872.
 91. 1.81 + 608.872.
 92. 1.81 + 608.872.
 93. 1.81 + 608.872.
 94. 1.81 + 608.872.
 95. 1.81 + 608.872.
 96. 1.81 + 608.872.
 97. 1.81 + 608.872.
 98. 1.81 + 608.872.
 99. 1.81 + 608.872.
 100. 1.81 + 608.872.

14. werden
 15. werden
 16. werden
 17. werden
 18. werden
 19. werden
 20. werden
 21. werden
 22. werden
 23. werden
 24. werden
 25. werden
 26. werden
 27. werden
 28. werden
 29. werden
 30. werden
 31. werden
 32. werden
 33. werden
 34. werden
 35. werden
 36. werden
 37. werden
 38. werden
 39. werden
 40. werden
 41. werden
 42. werden
 43. werden
 44. werden
 45. werden
 46. werden
 47. werden
 48. werden
 49. werden
 50. werden
 51. werden
 52. werden
 53. werden
 54. werden
 55. werden
 56. werden
 57. werden
 58. werden
 59. werden
 60. werden
 61. werden
 62. werden
 63. werden
 64. werden
 65. werden
 66. werden
 67. werden
 68. werden
 69. werden
 70. werden
 71. werden
 72. werden
 73. werden
 74. werden
 75. werden
 76. werden
 77. werden
 78. werden
 79. werden
 80. werden
 81. werden
 82. werden
 83. werden
 84. werden
 85. werden
 86. werden
 87. werden
 88. werden
 89. werden
 90. werden
 91. werden
 92. werden
 93. werden
 94. werden
 95. werden
 96. werden
 97. werden
 98. werden
 99. werden
 100. werden

[illegible]

12. Δ 59
6 + 8.724 -
1.100.-
425.-
1.100.-
1.100.-
197.-
216.-
93.-
87.-
165.-
180.-
420.-
216.-
200.-
1030.-
95.-
658.-
1.100.-
380.-
310.-
640.-
1.100.-
1.275.-
620.-
300.-
420.-
12.786.-
658.-
27938.-
658.-

Japanese Research Institute
of rare plants and animals
862-1 Shimogakubo Utsunomiya
Shimogakubo-Ku, Kofu, Japan
Address: Japan
Kokubun.

46
1312

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Samstag den 17ten Sept. 1959 von
FR. Volkmann 18.59 Uhr

FR. Volynskii 18, 592 m.

[illegible]

[index and binding 82 X 58 cm
in 2 volumes 905 X 72 cm]

[illegible]

[The page contains faint bleed-through from the reverse side, which appears to be a handwritten ledger or account book.]

[illegible][illegible]

Polyporus + Sauri

Substrat: abgestorbene Kiefer

Ort: de. reingewaschen

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

Stückzahl

14 50-

500

780

1.660

1.530

1.395

70-

2.200-

650-

2.50-

2.90-

1.90-

300-

1.100-

1.140-

5.50-

30-

60-

30-

5.50-

17.18.59/18 + 12.8.52.5-

↑

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

160-

8) Kieselsteine, Halbschnecke
F R 599
1/25. Sek. Kieselstein n. 1. m.
Die mit 3. Sek. aufen n. 2. m.
Kieselstein n. 1. m.
ca 4 1/2 cm. hoch.

[illegible]

[illegible]

1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334

And from 1970-1985 (ca 15
km outside) 12 x 59 1/4 x 64
Black sandstone & shales 8 1/2
Blk 1/4 dark lignitic mud

1. *Chamaecyparis*
 2. *Juniperus*
 3. *Thuja*
 4. *Podocarpus*
 5. *Sciadopitys*
 6. *Widdowsonia*
 7. *Platycladus*
 8. *Widdowsonia*
 9. *Platycladus*
 10. *Widdowsonia*
 11. *Platycladus*
 12. *Widdowsonia*
 13. *Platycladus*
 14. *Widdowsonia*
 15. *Platycladus*
 16. *Widdowsonia*
 17. *Platycladus*
 18. *Widdowsonia*
 19. *Platycladus*
 20. *Widdowsonia*
 21. *Platycladus*
 22. *Widdowsonia*
 23. *Platycladus*
 24. *Widdowsonia*
 25. *Platycladus*
 26. *Widdowsonia*
 27. *Platycladus*
 28. *Widdowsonia*
 29. *Platycladus*
 30. *Widdowsonia*
 31. *Platycladus*
 32. *Widdowsonia*
 33. *Platycladus*
 34. *Widdowsonia*
 35. *Platycladus*
 36. *Widdowsonia*
 37. *Platycladus*
 38. *Widdowsonia*
 39. *Platycladus*
 40. *Widdowsonia*
 41. *Platycladus*
 42. *Widdowsonia*
 43. *Platycladus*
 44. *Widdowsonia*
 45. *Platycladus*
 46. *Widdowsonia*
 47. *Platycladus*
 48. *Widdowsonia*
 49. *Platycladus*
 50. *Widdowsonia*
 51. *Platycladus*
 52. *Widdowsonia*
 53. *Platycladus*
 54. *Widdowsonia*
 55. *Platycladus*
 56. *Widdowsonia*
 57. *Platycladus*
 58. *Widdowsonia*
 59. *Platycladus*
 60. *Widdowsonia*
 61. *Platycladus*
 62. *Widdowsonia*
 63. *Platycladus*
 64. *Widdowsonia*
 65. *Platycladus*
 66. *Widdowsonia*
 67. *Platycladus*
 68. *Widdowsonia*
 69. *Platycladus*
 70. *Widdowsonia*
 71. *Platycladus*
 72. *Widdowsonia*
 73. *Platycladus*
 74. *Widdowsonia*
 75. *Platycladus*
 76. *Widdowsonia*
 77. *Platycladus*
 78. *Widdowsonia*
 79. *Platycladus*
 80. *Widdowsonia*
 81. *Platycladus*
 82. *Widdowsonia*
 83. *Platycladus*
 84. *Widdowsonia*
 85. *Platycladus*
 86. *Widdowsonia*
 87. *Platycladus*
 88. *Widdowsonia*
 89. *Platycladus*
 90. *Widdowsonia*
 91. *Platycladus*
 92. *Widdowsonia*
 93. *Platycladus*
 94. *Widdowsonia*
 95. *Platycladus*
 96. *Widdowsonia*
 97. *Platycladus*
 98. *Widdowsonia*
 99. *Platycladus*
 100. *Widdowsonia*

36) *Asperula racemosa*
58 km and 1/2 mi
17. IX 59
St. I. 59

Seite 53a

All right I appear to be
 taken in then I shall
 run it as a business
 in the same manner
 I did it to camp #6-6/10
 camp. Done

(Faint handwritten notes at bottom)

72 Bat 92 2 1/5. f.f. - grafted
Klein Ring und 186th
Petersburg, June 20th

(Faint handwritten notes at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.)

Falling Rock XXII

307 Newport Avenue, 151X 59

19. 12/24 Mr. Jones with Dr. H. H. Jones

① *Chrysomelids* m. 120 mts

1/10. Tok. Koolingda van

3.7.2 km up with the water table

[illegible]

not with you 4 1/2 in. wide

ms A 5/2 cm. long.

31) *Chrysomelids* *Chrysomelids*

19.18.59. 42 km. 1000 ft. 1000 ft.

12.12.1941. 12.12.1941. 12.12.1941.

21. 12. 1922. 12. 12. 1922.

Washing and x

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

King's College London 3 1/2 cm

Wiederholungsfrage: in wie vielen Jahren wird ein Kubikmeter Wasser verbraucht?

or other, I have not seen

32) Zweifelhaft nach ob. d. 14. IX 59

3/4 12 Km. Storm settled 22nd.

March 11 1882 1/3 for 200000
with interest 11.00

Plants 8 cm Ø and 15 days

11. 9. 1944. Berlin-Kornitz

Can you explain to 12 cm long
from the 1st to 180 cm long.

1

(33) *Chrysomelidae* - *Chrysomelidae*

Roll. Plan. Stickhausen 11. 1892. 1/5 F.

Franklin wird geboren. 1713

and to Mr & Mrs Thompson

13. *Myrica fruticosa* (L.) Link.

Let $v = 3/2$ in $\mathcal{O}(\mathbb{A}^1)$, then $\mathcal{O}(\mathbb{A}^1)$

Ameghinella *helleri*

34) 1st Battle of the Marston, 1213

identical 11.18 d 59.1 3/4 3 2.02

From the above accounts, it is seen that the

Aug 1/25 J.R. Finkelman

[illegible]

1.81 + 166.88 = 168.69
 8.1 x 59 = 477.9
 9. " (Midd) " 168.69
 10. " 168.69
 11. " 168.69
 12. " 168.69
 13. " 168.69
 14. " 168.69
 15. " 168.69
 16. " 168.69
 17. " 168.69
 18. " 168.69
 19. " 168.69
 20. " 168.69
 21. " 168.69
 22. " 168.69
 23. " 168.69
 24. " 168.69
 25. " 168.69
 26. " 168.69
 27. " 168.69
 28. " 168.69
 29. " 168.69
 30. " 168.69
 31. " 168.69
 32. " 168.69
 33. " 168.69
 34. " 168.69
 35. " 168.69
 36. " 168.69
 37. " 168.69
 38. " 168.69
 39. " 168.69
 40. " 168.69
 41. " 168.69
 42. " 168.69
 43. " 168.69
 44. " 168.69
 45. " 168.69
 46. " 168.69
 47. " 168.69
 48. " 168.69
 49. " 168.69
 50. " 168.69
 51. " 168.69
 52. " 168.69
 53. " 168.69
 54. " 168.69
 55. " 168.69
 56. " 168.69
 57. " 168.69
 58. " 168.69
 59. " 168.69
 60. " 168.69
 61. " 168.69
 62. " 168.69
 63. " 168.69
 64. " 168.69
 65. " 168.69
 66. " 168.69
 67. " 168.69
 68. " 168.69
 69. " 168.69
 70. " 168.69
 71. " 168.69
 72. " 168.69
 73. " 168.69
 74. " 168.69
 75. " 168.69
 76. " 168.69
 77. " 168.69
 78. " 168.69
 79. " 168.69
 80. " 168.69
 81. " 168.69
 82. " 168.69
 83. " 168.69
 84. " 168.69
 85. " 168.69
 86. " 168.69
 87. " 168.69
 88. " 168.69
 89. " 168.69
 90. " 168.69
 91. " 168.69
 92. " 168.69
 93. " 168.69
 94. " 168.69
 95. " 168.69
 96. " 168.69
 97. " 168.69
 98. " 168.69
 99. " 168.69
 100. " 168.69

February XXII

22. Henry 4.18.59 1/2 1/2 5 lbs

Not at all bad. It will send
 1 to Japan and 1 to Australia.
 The other 13/4 can come. Well-
 morning!! Some coffee.
 Oct. 22 1/40 up. Nothing.
 1/5. Jk. Ocean Service. After
 7/5. Jk. Ocean Service. After

23) Ovariole with summer
region (shaded brown)
(inhibitory, at 10 x 2 weeks.)

27. Shikellie Mt. Weir
August 1974 5.18.59 1/4 1974

Donnerstag 14. April 1894

Sickling v. Ind., 1872, 10/2

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

2.5) ~~Metastasis~~ ~~in~~ ~~the~~ ~~liver~~ ~~and~~ ~~spleen~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~mouse~~ ~~with~~ ~~the~~ ~~5X550~~

3/4 4th (Living with John
Lepidoptera with Gussone)

Kidneying 18. 1/5 lb. Kleiner
Osteo. n. 1 m. 1822

Well met at Brynau-Llyn
Gower where we stayed
of the N. & W. side were back
from the Llanymore
could swim down. At the bottom
water was clear.

26) Spalte 2 und 3
8-18-59 12 Uhr

The Blue Tuffaceous sand
Shelburne Co. Vermont Aug.
to 7 m. N.W. 1/4, Sec 22, T8N R9E

John Kasper Wenzel

1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344

Handwritten text on the left margin: "Fruit will be ready in 30 days" (written upside down).

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

My dear Mr. Garrison
I have your letter of the 14th inst.
and am glad to hear that you are
interested in the cause of the
colored people. I am sure that
you will do all in your power
to help them. I am, Sir,
Very respectfully,
Your obedient servant,
Wm. Lloyd Garrison

Friedrich Hagenknecht & Söhne
 27, Boulevard de la Liberté
 741 Paris 17ème

Boqueirão abastecido ab 15.75
(custo de 10.37)

Mark Wilkerson

2 Stunden
1 Unförmigkeit
1 Unförmigkeit
1 Unförmigkeit
2 Unförmigkeiten
3 Unförmigkeiten
1 Unförmigkeit
1 Unförmigkeit

[illegible]

[illegible]

19.00 km north of station 3.1859

1 kg. 1/2 Monomom grinded.

3 1/2 cm long (and 1 cm wide) for
3 1/2 cm long (and 1 cm wide) for

[illegible]

10) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
 11) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
 12) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
 13) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
 14) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
 15) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
 16) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
 17) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
 18) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
 19) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
 20) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

Seite 58

Stadtkasse Blanken XXII
 1915 2. IX 59 3/4 1374. Vlll
 12.000.000. 13.000.000. 14.000.000.
 15.000.000. 16.000.000. 17.000.000.
 18.000.000. 19.000.000. 20.000.000.
 21.000.000. 22.000.000. 23.000.000.
 24.000.000. 25.000.000. 26.000.000.
 27.000.000. 28.000.000. 29.000.000.
 30.000.000. 31.000.000. 32.000.000.
 33.000.000. 34.000.000. 35.000.000.
 36.000.000. 37.000.000. 38.000.000.
 39.000.000. 40.000.000. 41.000.000.
 42.000.000. 43.000.000. 44.000.000.
 45.000.000. 46.000.000. 47.000.000.
 48.000.000. 49.000.000. 50.000.000.
 51.000.000. 52.000.000. 53.000.000.
 54.000.000. 55.000.000. 56.000.000.
 57.000.000. 58.000.000. 59.000.000.
 60.000.000. 61.000.000. 62.000.000.
 63.000.000. 64.000.000. 65.000.000.
 66.000.000. 67.000.000. 68.000.000.
 69.000.000. 70.000.000. 71.000.000.
 72.000.000. 73.000.000. 74.000.000.
 75.000.000. 76.000.000. 77.000.000.
 78.000.000. 79.000.000. 80.000.000.
 81.000.000. 82.000.000. 83.000.000.
 84.000.000. 85.000.000. 86.000.000.
 87.000.000. 88.000.000. 89.000.000.
 90.000.000. 91.000.000. 92.000.000.
 93.000.000. 94.000.000. 95.000.000.
 96.000.000. 97.000.000. 98.000.000.
 99.000.000. 100.000.000.

Booth's Goldfish, *Bothius*

Blue-billed Littering much 2

gibt mir ein starkes
gutes Gefühl

collected, differences are shown.
 Oct 22. 1902. Nothing simple.

1. $\frac{1}{2}$ cup of sugar
 2. $\frac{1}{2}$ cup of butter
 3. $\frac{1}{2}$ cup of milk
 4. $\frac{1}{2}$ cup of cream
 5. $\frac{1}{2}$ cup of vanilla
 6. $\frac{1}{2}$ cup of eggs
 7. $\frac{1}{2}$ cup of flour
 8. $\frac{1}{2}$ cup of baking powder
 9. $\frac{1}{2}$ cup of salt
 10. $\frac{1}{2}$ cup of sugar

Seite 58a

$$\begin{array}{r} 28.9 \\ 10.5 \\ \hline 39.4 \end{array}$$

1.81 + 230.685-	29. VIII 59 Ruckwischke	1.500-
	" Kofflerhoganzen	300-
	" Tschande weckeln	200-
	" Wron	560-
	" Wron Wärale	1.850-
	" 31. Zelen	290-
	" 31. Zelen	520-
	" 21. IV 59 (Photograph)	2.140-
	" Tschety Schumbron	18.000-
	" Korykoff + Kolo Boffone	660-
	" 100m Wron	300-
	" 100m Wron	250-
	" 100m Wron	1.350-
	" 100m Wron	300-
	" 100m Wron	2.000-
	" 100m Wron	8.300-
	" 100m Wron	350-
	" 100m Wron	11.600-
	" 100m Wron	990-
	" 100m Wron	300-
	" 100m Wron	400-
	" 100m Wron	46.940-
	" 100m Wron	86

1.81 + 230.685-	29. VIII 59 Ruckwischke	1.500-
	" Kofflerhoganzen	300-
	" Tschande weckeln	200-
	" Wron	560-
	" Wron Wärale	1.850-
	" 31. Zelen	290-
	" 31. Zelen	520-
	" 21. IV 59 (Photograph)	2.140-
	" Tschety Schumbron	18.000-
	" Korykoff + Kolo Boffone	660-
	" 100m Wron	300-
	" 100m Wron	250-
	" 100m Wron	1.350-
	" 100m Wron	300-
	" 100m Wron	2.000-
	" 100m Wron	8.300-
	" 100m Wron	350-
	" 100m Wron	11.600-
	" 100m Wron	990-
	" 100m Wron	300-
	" 100m Wron	400-
	" 100m Wron	46.940-
	" 100m Wron	86

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

= keine weiteren Tarnung

[illegible][illegible]

[illegible]

Thos. W. Dewar
Oct 2nd,

(The page contains handwritten notes in German, mostly illegible due to being upside down.)

Die Krants' Markon 22. April 1957.
Fellennote von Kette, sellennote nicht.)

[illegible][illegible]

1. Wilde
 2. Wilde
 3. Wilde
 4. Wilde
 5. Wilde
 6. Wilde
 7. Wilde
 8. Wilde
 9. Wilde
 10. Wilde
 11. Wilde
 12. Wilde
 13. Wilde
 14. Wilde
 15. Wilde
 16. Wilde
 17. Wilde
 18. Wilde
 19. Wilde
 20. Wilde
 21. Wilde
 22. Wilde
 23. Wilde
 24. Wilde
 25. Wilde
 26. Wilde
 27. Wilde
 28. Wilde
 29. Wilde
 30. Wilde
 31. Wilde
 32. Wilde
 33. Wilde
 34. Wilde
 35. Wilde
 36. Wilde
 37. Wilde
 38. Wilde
 39. Wilde
 40. Wilde
 41. Wilde
 42. Wilde
 43. Wilde
 44. Wilde
 45. Wilde
 46. Wilde
 47. Wilde
 48. Wilde
 49. Wilde
 50. Wilde
 51. Wilde
 52. Wilde
 53. Wilde
 54. Wilde
 55. Wilde
 56. Wilde
 57. Wilde
 58. Wilde
 59. Wilde
 60. Wilde
 61. Wilde
 62. Wilde
 63. Wilde
 64. Wilde
 65. Wilde
 66. Wilde
 67. Wilde
 68. Wilde
 69. Wilde
 70. Wilde
 71. Wilde
 72. Wilde
 73. Wilde
 74. Wilde
 75. Wilde
 76. Wilde
 77. Wilde
 78. Wilde
 79. Wilde
 80. Wilde
 81. Wilde
 82. Wilde
 83. Wilde
 84. Wilde
 85. Wilde
 86. Wilde
 87. Wilde
 88. Wilde
 89. Wilde
 90. Wilde
 91. Wilde
 92. Wilde
 93. Wilde
 94. Wilde
 95. Wilde
 96. Wilde
 97. Wilde
 98. Wilde
 99. Wilde
 100. Wilde

[illegible]

[illegible][illegible]

Burning
Burning

[illegible]

④

24/1/45

