

Friedrich Ritter

Tagebuch 55



Ritters Bezeichnung:	Heft 55
Seiten:	3584–3670 (+ 33 nicht nummerierte Seiten persönliche Notizen)
Land:	Bolivien, Argentinien
Zeitraum:	26. November 1962 – 15. Dezember 1962
Bemerkungen:	---



Heft 55

Rayado Oficio

Nº 6

60 HOJAS

E 84-81

Fab. Chilena

Oroya (Boliv.) 3584 -

La Torre 3588 - Tupiza 3589 -

u u 3590 - Las Carreras

3592 - Sanaplatz Par. rufferi

3594 - Cieneguilla, 3594 - 20 km.

süd El Pucallpa 3602 - Cieneguilla 3604

Cacha Cruz 3607 - Cascho unterh. Capilla

3610 - Höhen über Mal Paso 3615 - Höhen

über Cacha Cruz 3617 - North San Antonio

3626 - Aufstieg von Tupiza nach Tama 3642 -

Tupiza, Vorfelände nach Nord 3655 -

Augustura 3660 - Finca Carlos Wag-

ner 3661 -

55

3584

Oroya, 26. XI. 62.1) Lobivia cincta? v. elongata.Mitten in Blüte.3 rote + 2 gelbe Blüten; 4-6 cm lang
weit geöffnet. Geruchlos, fast seifig!
Blau, 7-9 mm lang, 6-9 mm breitgrün, fast höckerig, mit halbkugeln
blaugelben bis gelbgelben, etwa
1 1/2 - 3 mm langen, dreieckigen
Schuppen u. weissen Malhaaren.N. K. u. Nektar. kleinen Insekten.F. bis oder fast bis zum Grunde.Blüten 1 mm über d. Grunde ohne
Insertionen. Rote brüchig,18-23 mm lang, oben 13-18 mmweit, innen dunkelgrün, gelblichvoll rotbraun (rote Bl.); außengrün, alle nach unten, weiß, amWachsende schwarz bis braun.Schuppen wie Blau. 2 (unten) breit (oben)zuerst lang, mehr spitz, auch stielich.Staub, inwendig gelbe Blüte nach untenbraunlich grün, kleine KronblattfädenBlau (rot Bl.) nach unten, braunlichoben. 10-20 mm, die unteren die Blütestehen unten, stark gegen G. gebogenim oberen Teile der Wand aufgehendoben (Kehle) ab 12 mm, mehr nachinnen geneigt. Dunkel creme; Insertionen

3585

sehen auf ca 12-15 mm
 Linsenförmig mit Narben mitten zw.
 den Bandeln 15-22 mm wovon
 3-6 mm auf die 8-11 blaßgelben
 bis grünen Narbenlappen, lg
 grün bis braungrün.

Krauß 20-30 mm x 7-12 mm
 Linsenförmig bis spatelförmig,
 unten lsg, verkehrtelliptisch oben
 gerundet bis zugespitzt, mit
 grünen bis schmutzigen, Farbe
 entweder purpurn 10 (mit
 5-7) die äußeren Farbe 10 1/2 mit
 Längs ca 4. Die äußeren farbe schwa-
 chere grünlich, oder Farbe 2 1/2
 Längs 9 bis fast 2 (mit gelb)
 Auf der Längs- oder -Seite des Kelches
 ebenfalls die beiden gleichen Schuppenfarben.)

2. Parodia cuneata mittelmäßig in
 Längsreihe, selten unreihe Ex,
 sehr selten 10 oder größere in
 höchster Lage und bei Schatten.
 3 Blüten: geringe Luft, spärlich
 vorwiegend offener, 28-35 mm
 lang, oft 25-30 mm weit,
 Fäden 6-7 mm lang, 8-10 mm breit,
 unten gerundet, außen gelblich bis
 rotlich, mit dichter weißer Wolle

3586

bedeckt mit winzigen, dünnen
 ca 1/3 mm langen gelblichen bis rotlich
 Schuppen, in der Band von ca 2-3
 mm. Blk pubescent, fast 2-3
 mm lang 1/2-1 mm weit, unten
 offener oder halb-gerundet, oben
 abgerundet, darüber Frischling 10-11
 mm lang, oben 10-15 mm weit,
 innen blaßgelb, außen Farbe wie
 oben mit oberer weißer
 Wolle, nicht bedeckt, ohne Bänder,
 mit roten bis gelben schmal drei-
 eckigen Schuppen von 1-2 (unten)
 mm bis 6-8 mm, oben Länge
 5-10 mm, stark Blau Länge
 5-10 mm, Bandel creme
 lg, etw. überlegend, 20-25 mm
 wovon 2-3 mm auf die 10-12
 hellgelben Narben, etw. gepreßt
 lg, hellgelb.
Krauß 11-16 x 2 1/2-5 mm, fast line-
 oval bis fast lanzettlich, oben
 gerundet oder kurz zugespitzt,
 gerundeter vorwiegend, Farbe 7 1/2
 bis 2, oft 1/2, 4-5. Dunkelrotlich,
 die spärlichen ebenso wie braun-
 krebrot (oder braunrot oder?)
 Dunkelrotlich ca 4.
Rippen etw. grüngrün, gerade,
 ca 12-14 mm hoch, Längsrippen
 für den gerade oder kaum gebogen

3587

fast ungekerbt oder nur ca 2-
mm eingekerbt. Knospen weiß
silbrig, ca 5-10 mm in Ø, lins-
förmig, ab breit, 10-12 mm
entfernt. (diese Daten von 3 Pfl.)

3) Parodia fulvispina noch ohne
Knospen, noch viele rötliche
Früchte mit Linsen. Begl. mit
dünne Knospen. Linsen rötlich.

4) Gymnocaulis cardenasii Beginn
milde bis große Kn., Bl. + unreife
Früchte. Sehr selten reife Fr.

5) Blossf. liliputana, Schlucht
nach W. M. M. unreife Fr.,
manche reife Fr. selten Kn. + Bl.

6) Tichocarpus camargensis Kn. - Be-
ginn

Foto in Linz, 19. II. 1958, Kfz
nur so weit wie aus Foto zu sehen
der ganz kurze Teil am Tage. Blüte
alles Foto war 52 mm lang, eine andere
war länger, 72 mm lang, 8 mm breit.
H-K. rötlich, oben verengt, mit 12-15
mm lang, 4 mm lang, end. fast durch
Hand. Rötlich, 12 mm lang, 15
mm, Wand rötlich, untere vom 3587

3588

La Torre, 28. II. 62.

1) Par. rubida, Kn + Bl + unreife Fr.
Knospen 5-10 mm entfernt.
Rippen so gut wie ungekerbt,
gelade bis gedreht, erste rundliche
Knospe kn. über Wegabweisung
in Richtig. La Torre kommt Cap.
camargensis vor. Beide Arten
kein Nebeneinander, trotz
gleicher Blütezeit, also gleich, daß
pl. zu einige Hybride Fr.
beiden dort vorkommen.

2) Par. camargensis rötlich
Kn + Bl. Rippen ungeriffelt, im
runde Höcker aufgelöst, Alter
fast hockendes Rippen ca
13-16. Knospen 5-10 mm entfernt.
+ unreife Fr.

3) Blossf. liliputana oberhalb La Torre
in Schlucht. Knospe, unreife
Fr. auch schon im Bereich der Schlucht
in d. F. der roten Sandsteinfelsen
ebenfalls in hohen Lagen an Felsen-
wänden. Häufig.

4) Par. camargensis wohl var. camargensis
grünlich-gelblich, im ganzen
dicker als Par. camargensis, nicht oder
kaum merklich, aber der gelbe T.

3539

Tupiza

1) *Lob. claysiana*, n. sp. h. Tupiza.
 Seitenspross gegen Süd. In
 beginnenden bis mittel Knospe,
 Blütenbeginn 27. XI. 4 Blüthen
 verwickelt. Blf. ca. 35-45 mm lang
 außen weißlich, Kronblätter
 sehr klein, gelb, fast bis 1/5 fast
 weiß, Kelch 1 bis 1 1/2, die äußeren
 Kronbl. blasse (farbe fr. 6 u. 10)
 Kelch 1 bis 1 1/2, die äußeren spitz
 braun, Kelch durch Schiffe
 und die oft runden Spalten
 während Blüthen fast weiß ist.
 Narben blasse bis gelblich, 4 u. den
 Ovarien. Die Kr. sehr reduziert u.
 lang, kaum länger als Nekt. nicht
 richtig festzustellen. (Nekt. gegeben
 bei Fortuin Sept 54)

F/ vorvor. 4 Gyanta, card. 3) Kain
 verwickelt 5 mm lang, oberer Langer
 mit Ovarien (Kain) nach innen gebogen.
 Insert, ganze Krone, 4 u. nur 1 Bruch
 grüngrün, 9 Blf. grün. Narben von
 6 mm, sehr gepresst. Kronbl. 20-25
 mm, bei and. Bl. länger, oben weiß
 od. schwach rosa, br. braun. Enden
 unten sehr rotlich 1-2 mm purpur
 bei 4/5 Länge am brüchigen 14-17 mm
 zugespitzt. Die Krone fast grün.)

La Torre (Fortocks) 28. XI. 62

3540

- 4) T. an den wien Landsteinhagen.
 kleine Lagen, die mir nahe beieinander
 wachsen, aber nicht zusammen, ob
 nicht 2 Arten sind.
- 5) *Trichocereus* caudatus. Blütenbeginn
 FR 383 u.
- 6) *Solms* m. ca. 200 m über
 der Tabakke, an steilen Felsen
 hängen, Blf. klein, die Länge
 ca. 3-4 cm, ca. 10 cm lang.
Rippen ca. 3-19 sehr niedrig,
 ca. 2-3 mm hoch, gerade
 od. etw. verhoeben ca. 6-10 mm
 entfernt, Rippen tief gekerbt,
 mehrere mittl. Längeln der
 mittlere der längste ca. 2-4 cm
 lang, zum wenigsten die
 jugendf. stark gebogen
 oft auch später, od. wenigstens
 gekrümmt, Blf. mit schwarz
 am Ende oder auch von
 unten sehr rotlich, Rinde
 sehr hart, hell. In Knospe,
 alle Blüthen weiß, weißlich.
 Sehr geringe Blüthe. Spärlich
 auf den hohen Bergen von
 Fortuin nicht gesehen, aber
 besser nach West nach einer
 Hölle von Nord kommenden

2591

Fotiniat ungefähr zur Blütezeit 767 (H. 18)

st. Wasser füllenden Seiten-
schluckt. Blütenverhalten am
31. XII. diese geruchlos 4 cm lang,
fast röhrenförmig geöffnet 3.5 mm weit.
Ekke 8 mm lang, 1 mm breit, olivbraun,
mit sehr zehnfache Wimpern ca 2 mm
langen Schuppen 1-1.5 mm entfernt
u. mit langen dicken weißer Woll-
haaren halbbedeckt.

H-K stark reduziert, 1/2 mm hoch, eug.
blau, Nektar nicht beobachtet. Kammer
geradlinig durch inneren Hohlraum, welche
den oberen wie Scheitel hat.

Röhre trichterförmig, aber Ende nur gering
erweitert, 27 mm lang, oben 11 mm
weit, innen glatt, außen oben
blau, krebserot, außen graugrünlich
mit Schuppen nach oben bis ca 5 mm Länge
zunehmend breiter, die unteren röhren-
förmig, die oberen röhrenförmig, dann reibend.
weiße, oben aus Wollhaaren schwarze Wollhaare
sichtbar, unten purpur, oberhalb halber
Röhrenhöhe röhrenförmig, 8-15 mm die der
Röhre 1 cm, stehen mit Beugeln viel höher.
Bemerkung: Bug-Lücke 12 mm

W 4 mm grün, oben rotbraun, 17 mm wovon
3-4 mm auf die 10 gelogen Wollhaare

Kraut 13-14 x 5-8 mm die Krümmung

11-12 mm Längen außen, unten oben
bei 2/3 Länge am Krümmen, oben gerundet
mit aufgesetzten Spitzchen, Basis 1/4 Breite
oben schmal, 1/2 Längig ab od. st. nicht
dunkelrot 3 bis 4, also sehr dunkelrot.
unten mit grün. Mittelstrecke Ränder nicht

3592

Las Carreras 22. XI 62

1) Lobelia ciliata Blütenbeginn
unreife Früchte, daher von
7. Blüten 13-6 cm lang, weit geöffnet,
nicht angenehm duftend, daher
wenig beliebt. Der R. Ende auch, brach-
wollig, Schuppen schmal dreieckig,
2 mm lang bis 10 mm, oberhalb
flügelartig blaugrün od. rotbraun
H-K stark fast ganz fehlend, ist
Nektar doch spärlich vorhanden,
sonst beginnt fast am
Grund, od. höchst bis zum
oberen Boden der Kammer
blau, darüber Färbung der von
letzten Röhrenkilen.

Röhre trichterförmig, oberer Rand meist
etw. eingezogen, R. 10-23 mm lang,
oben 10-20 mm weit, unterer
Teil ca die Hälfte, meist blaugrün
in etwa 1/4 der Röhre blaugrün fast
weiß, oberer Teil immer blaugrün
außen wie Ekke grün od. graugrün,
Hohlraum wie bei Oroya, im
Bereich der unteren R. Röhre braun-
lich purpur, in 1/4 der Röhre grün
bis braunlichgrün; in d. oberen
Röhrenhälfte etwa von Farbe der
Hohlraum Röhre + Colletten creme
Länge ca 3/4-2 cm die längeren unter
inneren Lücke 5-14 mm

3593

mit Narben in 1/2 - Lücke,
 Dunkelgrün 10-18 mm wach
 4-7 mm auf die 8-9 Narbenlagen
 Dunkel, 12-25 x 4-9 mm, fast
 kreisförmig, fast laubförmig, stehen etwas
 Bürgen, bis selbener, gerundet,
 Farbe dunkel 1 1/3 mit rötlich
 Längs 6-7, oder auch 7-8, feldförmig
 Längs 1, Längs 4-5, Längs auch gleich
 mit auf 3609 von Lina Lina.

- 2) *Paracarya*, v. *prolifera*
 • Ku Bl + verblühte Bl.

- 3) *Heing. cinctus* mitten in
 Fruchtzeit, selten noch große
 Knospe.

Trichocereus 3614 wie eine Lockenring
 aber *Trichocereus* hat keine Gattungsbereich
 fähig, in Gruppen in *Trichocereus* aufsteigen
 Früchte in Längen der Lockenring sind
 typisch für *Trichocereus*. Früchte sind
 wie kleine *Trichocereus* - Blüten. Es fragt sich,
 ob die Lockenring nicht in *Trichocereus*
 entstanden sind, denn Argentin hat
 häufig im Norden von Jungwölle keine
Trichocereus mit roten Blüten und Vork
 kommen die von Lach, aber auch können
 die Beize, aber es ist fast genau die
 gleiche wie die von *Trichocereus* (3609) und
 auch in Blüten oft ebenso. Lina Lina,
 die in *Trichocereus* - Längs, magische
 Kette und von *Trichocereus* (3609) und
 wie die aller *Trichocereus* von *Trichocereus*

Grundplatz der Paracarya 3594

29 XI 62

- 1) *Paracarya* noch ohne Knospe

Fassbar Varietät zu der
 von La Antonio

Trichocereus 30. XI 62 ³⁶¹⁴ ^{FR 1134}

1) *Lobelia* ~~Trichocereus~~ alles an
Lobelia bei *Trichocereus*, nur
 eine Art, in Blaufarben
 sehr verschieden. *Trichocereus* Dunkel
 grün, Rippen ca 16 bis über 20
 bis ca 2 cm hoch, *Trichocereus* ver-
 zogen, ca 1-2 cm entfernt.
 Rippen fast saugen, meist recht
 sehr hervor tretenden, wellförmig.
 Blöcheren *Trichocereus* *Trichocereus* bis
 grau braun bis grau gelb
 Mittelst. 1 bis 6 meist nach
 oben gebogen nicht, hat im Längs
 wenig, *Trichocereus*, sehr stark
 bis mittel dünn, ca 4-8 cm
 lang, Rand ca 8-14, halb
 weiß, gerichtet, ca 1-6 cm
 höher, Färbung weniger stark.
 5 Blüten, während *Trichocereus*
 Knospe. weiß
 untersch. 15 Blüten, aber es waren
 noch mehr weisse Blüten da, die
 nicht untersch. wurden)

3595

Lilueguillas

Blüte duftend 6-9 cm lang,
 Eign. weit geöffnet, bei
 kühl. Wetter schlüpfend

Frk. mit 10-15 Blüthen
 od. 1-2 Blüthen. Blüthen
 bis gelblich oder bräunl. od. grün
 gelb. Schuppen von 2-4 mm
 Frk. gleich. h. ca 3/4-1 cm Ø
 N-K. Zeichnung weniger als

von ungl. 12-3-4 mm lang,
 glänzend. Blüth. Nekt. sehr wenig
 Blüte darüber blüth. 22-42 mm
 lang, oben 12-25 mm weit,
 innen weiß, außen grauweiß

mit Woll wie Frk. Schuppen
 länger, mehr rot bis grünrot.
 Schale

Blau mit immer grün
 und streife der Krone frei
 weissen Blüthen weiß od. gelblich
 bei gelb od. gelb bei rot od. weiß
 od. gelblich od. grünlich. Frucht

Frucht 1/2-1 1/2 cm lang, 1/2-1 1/2 cm
 lang 1-1 1/2 cm lang, die unteren
 1/2-2 1/2 cm. Stängel creme

grün. Narben zw. d. Stängel
 28-50 mm, davon 7-14 mm auf die
 hellgelb bis hellgrün 10-12 tpf
 gepunkt. behendappen.

(3596)

Kraubl 20-37 x 8-12 mm

Laurelle bis mehr spaltförmig,
 aber oben gering bis längl.
 zugewandt Basis schmal

Frucht meist weiß oder bräunl.
 schwach rosa; mittlere stärker
 rosa, zehnerl. auch weiß. Äußere
 rotlichgrüngrün. Blüte war
 innere Krone purpur

stark rotlich. Mittlere ebenso
 äußere olivrotlich. 1 Blüte war
 innere purpur fast violett
 (Foto) Rand der Blüte gelb

spitzen rosa, mittlere hell
 zw. grünlich, Äußere spärlich
 lichenförmig 1 Blüte war innere
 Krone goldgelb (Foto), mittlere

mit rosa Äußere grünlich
 rotbraun 1 Blüte war: innere
 Krone war ~~rosa~~ ebenso aber
 das goldgelb noch ausgeprägter
 (Foto) 1 weitere Blüte war

Äußere Krone sehr rotbraun in
 lang gezogen (Foto)
 Keine Korrelationen der farbige
 Odonten von sonstig. Eingen.

erhalten der Blüte
 Blüth. verschicken von Farbe von
 Uzun. E innere Krone
 schon rosa wie (Foto) mittlere
 blauer rosa, Äußere wie sonst

3597 ~~Neonopsis~~
 wie San Antonio # 8 FR 106
 colored

- 2) Rebutia sp. wohl wie Rebutia
 12 Zehen stark aufgelockert
Rebutia ist sehr stark, leichtlich nicht
 faltig, ist braunlich, aufsteigend
 1 wohlwollende St. mit wenigen
 Zehen, weißer Hülls. ohne Blüten
 Längelstube. Nicht wachsend
 1 weinlicher ca 100 an einer der
 Hüllserien. Blühen verloren.

- 3) Trichocereus werdermannii St. be-
 ginnende Kn.; spärlich gefaltet
 4 Bl.

- 4) Trichocereus torillanus, oft beginnende
 Kn., spärlich große Kelchblätter.

- 38 Blüten 1 große Kn. Bl. duftet nach
 Nelken. 7 Bl. lang. Fruchtk. 18 mm
 lang, 20 mm breit, innen dunkel
 grünnlich, mit vielen schmalen
 schmalen gelben Strichen. 2-3 mm lange
 Schuppen sind rotbraun, Basis gelb
 mit einem dunklen roten Strich. 2-3 mm
 Haare dunkler, außen sind sie schwarz
 V-K sehr reichlich, dick kartonartig
 hart, gelblich, nur hohler Ring von 1
 mm Höhe von der Basis, halbkugelförmig
 2-3 mm lang, aber 30 mm weit
 etwa verformt, hellgrün innen
 außen grünlich, bräunlich, mit roten

- 3598
 nach dem (oder auch nach dem) Haaren
 nach oder gegen (5-3) (nicht bei
 15-20 oben) in langer grünen
 bis rotbraunen Schuppen
 Staubfäden Bereiche der Röhre grün
 oben, auch die ungetriggert
 nicht mit gelbem Ende. Undere ca 2 cm
 mittel 2 1/2 cm, nur B.-Rande 2-2 1/4
 cm lang. Frucht-Lücke ca 1 cm
 Dunkel, kleine, 3-7 mm lang,
 br. fleischig, ca 100 an einer, davon
 15-20 in der Mitte, die starker, hellgelb
 15-20 in der Mitte, die starker, hellgelb
 deren Ende ist sehr stark übertrag
 Kronte 20-40 x 10-13 mm, fast lin-
 ealisch, Fruchtk. nur wenig gebogen,
 Ende gerundet, oft kurz ringe-
 rückt, die äußere schmal, nach
 dem Ph. zugewandt, die inneren
 Kronte haben eine Überlagerung zweier
 Farben: 4. orangegelb mit 9. Rubin
 rötliche, 5. gelblich, 6. bräunlich, 7. braun
 8. dunkel, 9. dunkel, 10. dunkel, 11. dunkel
 12. dunkel, 13. dunkel, 14. dunkel, 15. dunkel
 16. dunkel, 17. dunkel, 18. dunkel, 19. dunkel, 20. dunkel
 21. dunkel, 22. dunkel, 23. dunkel, 24. dunkel, 25. dunkel
 26. dunkel, 27. dunkel, 28. dunkel, 29. dunkel, 30. dunkel
 31. dunkel, 32. dunkel, 33. dunkel, 34. dunkel, 35. dunkel
 36. dunkel, 37. dunkel, 38. dunkel, 39. dunkel, 40. dunkel
 41. dunkel, 42. dunkel, 43. dunkel, 44. dunkel, 45. dunkel
 46. dunkel, 47. dunkel, 48. dunkel, 49. dunkel, 50. dunkel
 51. dunkel, 52. dunkel, 53. dunkel, 54. dunkel, 55. dunkel
 56. dunkel, 57. dunkel, 58. dunkel, 59. dunkel, 60. dunkel
 61. dunkel, 62. dunkel, 63. dunkel, 64. dunkel, 65. dunkel
 66. dunkel, 67. dunkel, 68. dunkel, 69. dunkel, 70. dunkel
 71. dunkel, 72. dunkel, 73. dunkel, 74. dunkel, 75. dunkel
 76. dunkel, 77. dunkel, 78. dunkel, 79. dunkel, 80. dunkel
 81. dunkel, 82. dunkel, 83. dunkel, 84. dunkel, 85. dunkel
 86. dunkel, 87. dunkel, 88. dunkel, 89. dunkel, 90. dunkel
 91. dunkel, 92. dunkel, 93. dunkel, 94. dunkel, 95. dunkel
 96. dunkel, 97. dunkel, 98. dunkel, 99. dunkel, 100. dunkel

3599 7 mm weit mit d. (offen) Chelonegalla
5. Parasitica maxima. mitten im
Fruchtheife, noch viel unreife Fr.
offers bereits verbrocknete Fr.
sehr selten Bloder große Kriecher.
7. Bliken (Tot) geruchlos 39-40
mm lang. Offen ca 2 1/2 cm D.
Frucht 5-9 mm lang, oben 7-11 mm
breit, unten stumpf, Blät gelblich
bis grünlich, in weiche Masse ge-
hüllt. Schuppen verstreut, dreieckig,
ca 1/4 od. 1/3 mm lang, stellen 2-3
mm entfernt.
H.-K. nicht reichhaltig, Blatt 2-4 mm
lang, Subst. 1/2-1 mm weit, nur 1/2
hell gelblich durch Staub.
Blüte darüber freistehend 10-15 mm
lang, oben 13-17 mm weit (mit Krone)
Blatt gelb, außen Blät grünlich, unter
oberer Blüte, weiche, oben
Blüten, Schuppen nach oben
größer werdend bis mehrere mm
mit vielen Übergängen im Kronbl.
Blät, grünlich, oben rotbraunlich,
sehr gering.
Staub Blät gelb 3/4-1 1/4 cm, faserig
gelbe Röhre steht, Buntbl. Blät prang
hell überlegend die Buntbl. Blät gelb,
3-5-28 mm, davon 3-4 mm auf
die hellgelben 9-14 Narbenlappen
Krone 14-16 x 2-4 mm, fast lineal

(3600)

klein gerundet od. knipf gen. 1/2 H.,
unten verschmälert. Farbe ~~hell~~ 1 1/2
Läng bis 2 Läng ca 5
Diamet. 1, 1
Körper sehr schlangenförmig, weißer poll-
schmelz. Nieren 13-18 gerade bis
gedreht; 1 1/2 + 2 1/4 cm hoch, stumpf,
oberwärts beackert, unten 4-3 mm hoch,
gekerbt. Fäden rundlich, 5-10 mm 4, 1/2
1 mm dick.

6) Oreocera Hollii Beginn Frucht
reife

7) Oreocera Hollii Reife Fr + Bl + von
reife Fr, 13-16 Rippen, Unter-
schnitt 6 Rippen; tags und nachts
offen, geruchlos, meist von den
Schädeln, meist gering, zuweilen
stark spitz auf den Kopf, zuweilen
zuweilen gerade, aber spitz.
warmer, schief mit dem Kopf
rasselt. Gr 1/2 H 1/2 cm lang
Fäden, unten ist flach, 2-2 1/2 cm
und 9-12 mm dick, oben von
dickem, Paris verdickt. Basis
grün, nach dem rotbraun, mit
spitzem, weißem Nollkaren
höckerig, 1-4 mm lang, 1/2
oben, gelb, spitz oder röhrenförmig
Reife, schlangenförmig dargestellt.
N-K. Durchmesser 13-8 mm lang 1/4
mm weit und 1/2, blatt, volldeklar, gut
abgetrennt durch ein aus der Wandern
Licht wandern, meist schief nach oben

3601

Siemegwillas

gerichtetes, unweit nach horizontal
stehendes (in der Mitte) purpurnes, bla-
nfarbiges mit rot. oder purp. Flecken.
Blasse, auf dem einen Ring von
dunkel. aufsteigenden Schuppen den an-
der. entlang.

Robur rubic. 25-43 mm lang wobei
die Oberseite 3-6 mm länger als die
untere; in der unteren Richtung
5-10 mm weit, über der H-K am
in der Mitte im Inneren bläulich.
An den jüngeren bis zu den Schuppen
mit oder ohne weißer, oben auch
gerichtet, schwarzen Wollhaare,
in der im engeren Querschnitt
10-15 mm dick, mit roten, seltener
gelblichen, abwechselnd, nach oben
bis auf ca 15 mm die Länge von
abnehmenden Schuppen.

Blasse nach unten meist fast grün,
auch gelblich od. rotbraunlich,
nach oben gelblich od. purpurn.
Erstreckung alle nach oben der Höhe
der Krone, manchmal bis unter-
ragend, einander parallel, die
der Oberseite die kürzeren, die
der Länge mit der Breite ebenso
hoch stehend od. etw. niedriger
hängend - Rösche 1 1/2 - 2 cm, Beutel
violett bis schwarz. Stellen isoliert
als selten nicht überreguliert 1-2 mm
die Krone, überreguliert 1-2 mm
nach unten, seltener purpurn od. braunlich
einen Bruchteil bis etw. purpurn.
68-85 mm lang, davon 46 mm T.

3602

20 km südlich von Perote

28 29. XI. 62 5-8 cm, fast kugl. bis gedrückt

1) Lobelia horrida 13-21 Rippen

st. nicht lakig, in Jugend
an Spitze etw. gekrümmt
geringe Rösche, kleiner dunkel-
grün bis bläulich, nach
13-21 Rippen, ca 1 cm hoch,
mit fast ohne tiefen Kerbung.
Blätter der Wurzeln kleine
keilförmig hervorstehende Blätter;

Blasen ca 5-8 mm lang, ca 3-5
mm breit, ca 1 1/2 - 2 cm entfernt,
schief in die Krone gehend,
grünlich-gelb. Blüten ziemlich
weit, seicht, angenehm duftend
fast radförmig 5-6 mm weit, 1 1/2 - 5 1/2 cm lang, oben von
2 Blüten von Pfaden benachbar-
ter Krone.

Fäden 4-8 mm lang ebenso breit
abgerundet, mit acht bis zehn ab-
1 1/2 - 3 mm langen rotbraunen
bis grünbraunen Schuppen
und grauer bis rotbrauner
Wolle.

N. 3 mm im Durchmesser, nur
etwa 1 mm lang und 1/2 mm weit
rund, mit abgedrückter, durch
untere Blätter, die gegen 90° und
oben gegen 180° gebogen sind.

3605

Früh, Form wie Procereus.
 4-6 mm lang, oben 6-8 mm breit,
 rund bis rötlich mit grauer
 bis rotbrauner harter Walle,
 spärliche sehr schmale, 1-2 mm
 lange, gelblich rötliche Schuppen.
 N-15. fast kugelförmig bis glockenförmig
 4-5 mm breit 1 1/2-2 mm lang,
 bläulichbraunlich mit Nektar,
 gut geschlossen durch rötliches,
 quer gestelltes, aus Wande. entstand.
 Ophioglossa mit rötlicher Haut,
 und in einem 1/2 sitzenden, nicht
 abwärts. Ring ausgekehrt.
 Röhre 22-35 mm lang, Oberseite
 3-6 mm länger als untere; Au-
 ßen, aber N-15 etwa abwärts
 wie bis zum R-ende, ca 3-6 mm
 breit, im Querschnitt 1 mm
 außen 6-9 mm dick, innen
 rötlich, außen grünlich (bis
 purpur) mit harter grauer
 bis rotbrauner Walle u. gelblichen
 bis rotbraunen bis purpurnen
 Schuppen, die nach oben bis
 auf ca 5 mm Länge, zunächst
 schmal nach unten weiß bis rose,
 nach oben bläulich bis voll purpurn
 bis zum Ende der Krone oder
 sie etwa überragend, die der Röhre

ebenfalls hoch, mit den Beulen ³⁶⁰⁶
 oder etw. tiefer. Innerk. Linske
 2-2 1/2 cm lang. Dargest. dunkel
 violett. Pollen violett.
 Die Krone bis 1 cm
 überragend, selten nicht über-
 ragend, rötlich, gelblich, bräunlich,
 oder weißlich, 4-5 1/2 cm lang,
 wovon 2-3 mm auf die 6-8
 hellgrün. Harter Kinnmen.
 Krone, lassen nur ein Öffn. zur
 Röhre von 1-3 mm Weite. Obere
 aufrecht oder etw. vorn. abenge-
 neigt, untere nur gering nach
 außen gebogen 8-12 x 2-3 mm
 etw. linsförmig bis röhrenförmig,
 oben kurz zugespitzt bis gerundet,
 unten abgerundet. Farbe 6
 (Krone) bis 10 purpurn, mittlere
 bis hohe Linske, viele meist
 gelblich gerandet, etw. nach außen
 gebogen, spitze Übergänge in
 die Schuppen.
 Die Röhre gleicht in der weiten
 Röhre Merkmalen der Oreoc. Schute

3607

Lana Cruz auf dem Wege nach
Capilla, ca 2880 - X am 2. XII 62.

- 1) *Platyop sulphurea*
- 2) *Trichocereus wendlandianus*
- 3) *Trichocereus sacaguanensis*
- 4) *Oreocereus celastrius* meist weiß-
haarig, manchmal rotbraunhaarig
- 5) *Eleocharis thymifolia* & weiß bis
rotbraun
- 6) *Eliotia actinophora* (L. Magardiae)
buschig
von Grunde sprossend, oft nur
20 cm hoch, im Schatten über 1/2
m lang und dann halb lie-
gend. Triebe 2 1/2 - 3 1/2 cm D. mit
ca 15 - 19 Rippen 2 1/2 - 4 mm hoch
um die halbe Höhe rot, nach unten
kahl. Areolen rund, weißfilzig,
ca 2 mm D. in die Kerben bis
reichend ca 4 - 6 mm entfernt.
Mittels gelbgrün bis hochrot
sandfarbig mehr weiß (siehe Skizzen)
Sehr zahlreich blühend in die Bl-
m. in reifen zuckrigen reifen Fr.
Pollen (unter such) 6 achselig

3608

bis zum Scheitel ohne Duft
26 - 35 mm lang, meist in
ganzer Länge etwas nach
hinten gebogen, anweilen gerade.
Fleisch ca 3 mm lang, oben 5 - 6
mm breit, mit rotbraun, rötlicher
meist schwarz gerippter Schuppe
von ca 1 mm Länge und wenig
weißem auch rotbraun Haaren.
N. K. 1 1/2 - 3 mm lang, 3 - 4 mm
breit, weiß. Nektar spärlich,
oben gelblich, dünn, weißes
nach oben gewölbt. Diaphragma
mit 20 - 25 Nerven, das in einem
kleinen Ring ausläuft.
Rinde rund 15 - 20 mm lang, ca
5 mm dick, 2 - 3 mm weit, rund
weiß, außen Farbe wie Klobenblech
alt, bläulich, mit markigen
weißen Nerven. Schuppen nach
oben auf ca 5 mm Höhe, nach
unten rot, meist schwarzspitzig.
Blattstiele bis zur halben Krone
Blattstiele oder etwas weniger
reichend, Bündel kreisförmig.
Nur dicht über N. K. und
am Stängelende.
Fr. mit den Narben meist in
der Öffnung oder gering heraus-
ragend, weiß 23 - 30 mm, wovon
2 - 2 1/2 mm auf die hellgrüne
6. Narben kommen.

3609 La Carlota

Parodia neglecta Witt. & Schell
 altmännlich, die Blätter
 vom außen gesehen, die inneren
 heller aufhell, eine kleine
 Öffnung ca 2 mm lang und
 die ausgebreit. Kronblätter ca
 1 cm Ø; 5-8 mm lang, 1 1/2-2 mm
 breit, läng. gestreift, inneren
 dunkler (9) Längl. 7, Dunkelst. 3.
Frucht dunkelgrünlich (10) Längl. 7, Dunkelst. 3.
 ca 1 cm lang, etwas über 1 cm
 breit, mit kleinen Schuppen
 an Früchten und wenigen kleinen
 weißen Härchen pro Areole.
 7 schließlich orange oder grünorange
 am 9. II. 3. mittern. in Fruchtphase vergangen
 ne 4. bis 10. Hauptphase Jan. - März
F immer purpurfarben

76) Leleuvia intensis Witt.
 Kst. hell, Bl. hell bis dunkel
 Kn + Bl. Bl. 3. J. wie Las Carreras
 alle mit unten purpurfarb. Haube
 1 Blüte war identisch mit Las Carreras
 gleich lg, 23 mm lang in, Kronbl. 30 mm
 lang, fast linear, Dorsalb. weiß
 ventral. Blenden in höherer Lage
 Kronblätter varierend von weiß bis
 hell bis purpur mit allen Areolen
 außen, inner. einfärbig. Staub mit

3610

8) Parodia maxima, Witt.
 im Samen reife; sehr selten und
 Blüte.

9) Blossy deliputana; Agave.

10) Parodia minima Witt. selten
 11) Parodia minima Witt. selten
 12) Parodia minima Witt. F (P. 3614) F (P. 3614)
Cuebrada Laucha 3. XI 62

ca 76-78 km nördlich von
 Laucha, 3-4 km unterhalb
 Laucha, 3. XI 62, ca 2570-2 m
 und Berghänge ca 200 m hoch
 Alle Orden von Laucha mit
 Ausnahme von Trichocereus werden
 u. Parodia minima Witt. (P. 3614)
 10) Leleuvia intensis Witt. 5-6
 cm Ø, ca 1-1 1/2 m hoch, von
 Grunde sprossend, in von
 unten. rippenf. ca 27 Rippen
 (Anzahl? ca 18 Rippen) St. n. n.
 von ihr. bräunlich (Anzahl)
 größer als Anthurus? F (P. 3614)

3611 F wächst auch auf dem
Berg bei Capilla, aber nicht
weiter nördlich aufwärts.)

11) Eym. nivalis ^{FR 1131} ~~sp. nov.~~ F
starke konische Röhre, nicht
gründend, bis ca 12 cm Ø,
sehr flach, ab ca 4 cm Ø
blühfähig. 8-15 Rippen,
knospen bis Blütenstielgrün,
2 Trockenfrüchte, Frucht
ca 1 1/2 - 2 cm lang, 3/4 - 1 cm
weit, mit wenigen nussförmigen
Schuppen von 3-5 mm Breite und
1 1/2 - 3 mm Länge,
Knospen 1 1/2 - 3 cm weit, ca 4-7 mm hoch,
mit geraden Markungsrinnen
gering gefurcht. Dornen horison-
tal, wie zu den Rippen, lang, gerade,
meist graufarbig, rundlich
ca 6-10 mm Ø, auf den Höckern
ca 5-8 mm entfernt.
Blüten nahe dem Scheitelzentrum,
nur bei Wärme wenige Stunden
offenend, wohl mehrere Tage,
glockenförmig, 2 3/4 - 3 1/2 cm lang,
offen auf ca 3 cm weite Öffnung.
Kelch halbkuglig oben 6-9 mm breit,
nach unten gerundet 3 1/2 - 4 mm lang,
mit granulierten oder rötlich weiß gerandeten

Farnwall ^{Wald abh. aufrecht, spärlich} ~~sp. nov.~~ (3612)
weissen Schuppen von 1 1/2 - 3 mm
Länge, 5-7 mm Breite
oben gerundet. Kelch dunkel graugrün
N.-K. purpurn, ca 1 1/2 mm lang
ca 1/2 mm weite zum 1/4
gerundet durch untere Längs-
Röhre darüber etwa becherförmig
ca 12-15 mm lang, oben
ca 11-13-15 mm breit, innen
karmen außen graugrün,
mit Schuppen bedeckt, aber größer
grüner, weiß gerandet.
Kelch ca 1/2 mm Länge in 4 mm
Öffnung, darüber wenige Abgänge
zu Kronblätter
Blatt hell purpurn, die unteren
ca 5 mm ankerförmig, die anderen
fast eine Glocke bildend, die unteren ca 3 mm
breiten bildend, die oberen ca 3 mm
breiten bildend, die unteren
nach unten kleiner, die oberen
ohne Narben 6-7 mm
lang, ohne Narben 6-7 mm
lang; Narben weißlich, 8-11
3-5 mm, bläulich, ca 8-11
Kronbl. ca 15-17 x 5-8 mm
nahe oben am breiteren
nach der Basis sehr schmäl
oben gerundet od. kurz zugesp.
Breite Ränder weißlich
Mittelpunkt unten purpurn
nach oben bräunlich od. weiß
Farnwall ^{Wald abh. aufrecht, spärlich} ~~sp. nov.~~ (3612)

3615 F. über Laia (Cruck)

in dicke rotbraune Wacke
gehüllt. Bl.-Rest ebenso wackig.
rot, oben mit feinen schwarzen
Punkten. ~~Offenlegung~~ ~~ausgespart~~
~~intermediäre Bl.~~ Vergleich elgast
identisch mit *Synura* der hohen
Flöden über Malast. Grundgebiet
der Neopendern vorwiegend 6.X.62

1.) Leb. ~~ausgewachsen~~ 1 Blüte
bei Laia Cruck geöffnet 6.X.62.
Blüte nicht angenehm duftend,
(ähnlich *Loripodanthus*), weit seitlich,
über 5 cm lang weit geöffnet.
Blüten rotbraun, breiter als lang.
Staubbeutel gelblich, radial 1-2 mm lang,
Blatte rotbraun, Blk. niedrig
sehr eng, 2 mm lang halb genkt düst
glanz. Röhre nicht 2 mm lang
oben 1 mm weit innen blaf,
außen rotbraun mit rotbraun
Leinwand, oben bis ca 5 mm lang
mit rotbraun. Nolle, Haar unter-
se ca 15 mm, unter ca 20 mm
oberse ca 14 mm, allerhöchste
an Basis rotbraun, sonst die
unteren untere orangen nach oben
blaf purpur. In oben rotbraun
dunkel von Kantenfarbe, ebenso
die oberen. Rinde kreine, Furchen

Lücke ca 15 mm, Bl. mit 3616
Neben v. B. B. 2 3 mm
wovon 5 mm auf die hellere
so. geneigt 4 Kerne, 1 kleiner
gering, nach oben rotbraunlich
Doppel 21-23 x 7-9 mm, Blende
spärlich, nach unten verohnd,
bei 13+14 am breitesten, oben
gerundet, die äußeren zugespitzt.
Farbe dunkelrot (3). Längung
ca 5, schmal, Stachel
etwa prange, an Fl. 4
schmal, linienförmig, rotbraunlich,
Läng. ca 4, Dunkelrot ca 3,
Bl. (der Blüte) 5/2 cm, dunkelgrün,
19 Rippen, leicht verohnd
Anlagen. Rippen schmal, 5-7 mm hoch,
fast ungerichtet, Blende 4-5 mm
rundlich 15-18 mm unterse
Winkel etc. rüth. Bl. # mittleren
neu schwarz, gerade od. leicht etc.
gekrümmt, stark nadellösung # #
6 cm lang, absteigend, brandlich
blau weiß, nadell. gerade, lang
sehr gerichtet, 1 1/2-3 cm, ca 10-10.

(Ektro)
F. zu F. 3616 ausgewachsen zeigt Best
sehr abal. Bl. typischer, ca 12 Rst.
u. mehrere Bl., Marke wie typischer
zu dichter, etc. Blende. Samen sel-
ten, aber, braun, als typischer
13 x 0.8 x 0.5 mm, schwarz, glänzend, daher
Rückenstück, ventral leicht abgeflacht, mit flach
gehöckert, Hilum oval, (nicht)

3617

Höhen über Laibenz. An
der Warte. 9. Nov. 3400 m hoch.
6. Dez. 1962.

- 1) *Cylindropuntia wrightii* sp. n.
- 2) *Platyopuntia sulcata*
- 3) " *soehrensis*
- 4) " *concolorata* wie *L. submin.*
- 5) *Cumulopuntia boliviana*
- 6) *Trichocereus wendlandii* selten noch
- 7) *Trichocereus wendlandii* sp. nov. Halbkugeln
bis zu ca 27 cm im
Durchmesser, meist ohne Stacheln,
mit ca 18-30 Stacheln
Km. Bl + verbleibende Stacheln.
Blüten von 4-5 cm; etwas
duftend, nicht angenehm,
8-10 1/2 cm lang, rings um
den Scheitel. Frk 13-15 mm lang
12-13 mm breit, mit 4-5 Stacheln
auf der Innenseite. Schuppen von
1-3 mm Länge und dachziegel-
förmig. Blätter ~~von~~ Blätter
der Blüte ca 5 mm dick. Frk
lückig.

3618

N.-K. fehlt völlig, indem
nur bis zur Griffelbasis
hinabgehen. Es kommen in der Blüte
bis zu 1 mm dicke Blätter vor,
die aber auch dann fehlt. Blüte
becherförmig, 25-37 mm
lang, oben ca 22-33 mm breit,
innen von Farbe der Kronblätter,
außen blasser, am Zerteilungs-
rücken, mit Schuppen wie Frk,
aber nach oben bis ca 2 cm lang
die unteren sind die flachen
mehr rot, alle rötlich abgesehen
Reichlich rötlich-schwarzes
Wolle.
Blüte im unteren Röhrenteil
nach oben, oben am Ende Kronbl.,
untere 1/2-2 1/2 cm, obere etwa
ebenso lang, die untere auf-
recht, nicht gegen die Blüte
die obere mehr der Rand
aufliegend. Insetion unter
ungemein dicht. Insetions-
höhe ca 13-20 mm. Bündel orange
2-3 mm lang.
Blüte mit Bl. die Bündel überagender
nach oben bis 10-15 mm, 5 cm
über 7 cm von 10-15 mm auf
die Blüte bis 10-15 mm, 14-16
nach oben kommen.

3619

Kronbl. 30-50 mm lang
5-12 mm breit, linische lineal-
lisch, unten wenig verschmälert,
oben häufig bislang eingestülpt,
zahlreich schlangenförmig, in Schnitten
gleicher Farbe, Farbe purpurn
10 bis 10 1/2; Laßbig 17. Dunkel
Stufe 2-3 (Farbe im Innern)
Rippen gerade, dunkelgrün 12-20
mm hoch, im Querschnitt dicklich,
Basis 1 1/2-3 cm breit. Zwischen-
rippenfurchen unten mit Korkland,
oben schlangenförmig. Rippen mit
mäßig stumpf, gering gekrümmt
Körner stumpf, höher im hoch bis
fast ausgeglichen. Dreien auf der
Oberseite der Höcker in die Höcker
verlaufend oder auch mitten zwischen
den Höckern in den Kerben, ganz
oder bräunlichfilzig oval bis fast
rund, 5-10 mm lang, 4-8 mm breit,
3-10 mm entfernt. Mittelst braun
bis meist rufbraun bis schwarzrot
nadelförmig, gerade, dmergierend,
etwa 3-9 cm lang, etwa 4-12
Rauchst. gleicher Färbung bis fast weiß,
immer stiel. bis halbrostig glänzend
etwa 12 bis 30 ohne scharfe Forderung
von den mittleren, 4-4 cm lang, F 3621

3620

- [8.] Trichoc. (?) 2 oder 3 Exemplare
abul. Nr 7 waren bedeutend
länger und Trichoc. hirsutus
abul. oder letztere (?) Körner nicht
nahe am Zeitpunkt untersucht
werden nach Trichoc. hirsutus
verlangt gewachene Trichoc. hirsutus
9.) Oreoc. hirsutus häufig. 7. T. in Blüte.
10.) Oreoc. celsianus, nicht häufig
u. sehr niedrig.
11.) Ulex supra hirsutus gärtlich
12.) Lobelia sp. wohl wie Linagwillas.
aber Blüte nicht gesehen. Körper
s. u. Best. wie dort. Trichoc. hirsutus
= Trichoc. hirsutus bis Trichoc. hirsutus F (Hinden)
[13.] Lobelia horrida sp. wie 20 km
nördl. El. Tunkte, zuweilen stark
stark. Meist aber weniger und
schwächere Stacheln. Blüthen stark
orangefarbt bis purpurn. Best. etwa
wie dort, Mittelst meist 1 bis 4, zu-
weilen mehr. Rauchst. etwa 6-10
fast abstehend und von gleicher
Färbung, halb so lang oder fast so
lang wie die mittleren, stehen ca.
1 1/2-2 1/2 cm entfernt. St. meist braun

3621

Starker str. best. Bräun, lang-
kurve korallenf. Rinde,
s. scheint, daß diese stark mit
Nr 12 hybridisiert. Bei einer Blüte
mit Markfarbe s. orange und
purpurn waren Staubf. sehr blassgrün
N-K 4 mm lang, Labrosa, Rinde!
7 mm lang, Rinde innen fast weiß.
Nr 13 ist vollständig nur als 1. u. 2. von
Nr 12 zu nehmen. Keine Blüte
untersucht, die typische korallenf.
Blüte gewesen zu sein.

Thranse grüne oder braune, seltener
nigraze, dilligare, gleich gelblich
weiß, wasserförmig. Boden gelblich
ca 3-5 mm dick, fast mit beidseitig
schlecht ab. u. verbleibend aufsteigend
sehr schaumig, 5 Stunden wasserhart.

Feine weiße Blüte, außen oft rote
harte Haut, fast weiß mit grün.
Lapin mit, N-K, 6 mm lang.

Blüte zuerst etwa wie *hieroglyphica*!

F (Zu L 3619 *hieroglyphica*?) *Tracht*
2 1/2 - 4 cm lang 2 1/2 - 4 1/2 cm breit,
meist str. breiter als lang oben und
besonders unten stumpf, dunkel
mit oben Querschicht, ca 1-1 1/2
cm x 1/2 - 1 cm. 1/2 - 3/4 cm tief. Th. rötlich
los purpurn, seltener gelbgrün, mit
unten mehr grünen, Mark oben lang
gestreckten Höcken, von 1 bis 1 1/2 cm lang
Rinde etwa 1/2 cm d. u. 1/2 - 1 cm über 1 cm
Länge. Dreieckige dicke rötliche, seltener
grünliche Schuppen von 1-3 mm Länge
1/2 - 1 cm entfernt. Geringe *hieroglyphica* T.

(nicht = *hieroglyphica* mit *hieroglyphica*) 3622
[4.] *Loliva* sp. 1 Exemplar in
Trockenstelle von Nr 16. Körper
wie Nr 13, aber sehr fest, mit fleck
1. str. lakis *hieroglyphica* mehr
ausgehend 7. str. heller, ca 1/2 - 1 1/2
cm. Neben wenig mm Ø, ca 1 1/2 cm
entfernt (Hybrid mit Nr 16?)
1 verblühte Blüte weit seitenl. 6 1/2
cm lang, Fkn 12 mm lang, 7 mm
breit rötlich weiße Rinde. Schuppen
weißlich 1 mm lang, dreieckig
N-K. blass, rötlich, 7 mm
lang, halb gest. durch 1/2.
Rinde darüber 15 mm lang, oben 13
mm weit, rötlich, innen blass,
außen mit grünen oben auch
schwarzen Haaren. Rinde unten
weiß, nach oben grüne rötliche
ca 1/2 cm langen schmalen Schuppen
Haut. Rinde hellgrün oben hellgelb
grün, ca 1 1/2 cm, Rand ca 1 cm
Fkn - Lücke ca 12 mm. Rinde orange
gr. hellgrün 25 mm von 5 mm an
die 9 hellgrün Narbenlappen.
Kronbl. innerer Farbe 7-7 1/2 hokerförmig.
(Zunächst bis blutrot) äußere
schwach purpurn mit grünen
ca 25 x 5-6 mm. *hieroglyphica*
Blüte entspricht etwa der Art von
hieroglyphica mit *hieroglyphica* Nr 16.
Auch str. verblüht.

Fadenfaden wie Nr 16

3623 (wohl Cieneguitas)

[15.] Lab. sp. 1 Exemplar wildlebend, der Art von Cieneguitas, jugendexemplar mit 3 fast schwarzen Hakenstacheln von 1 1/2 - 2 cm, 2 davon oben fast mandelförmig, das vierte etc. hellere kurzgest. Randstacheln.

16a) Lab. sp. nov. nur 2 Exemplare u. 3 Stacheln. Hybride mit Nr. 12. 3-4 cm dick, nicht prominent, stw. grüngrün, starke lange kantige Rückenrippe. Bl. silberhell bis hellgelb, in den Bockeln linearwärts. Rippen 13-15, stark verhält, schwach gebogen, stöcker büßförmig 3/4 - 1 1/2 cm lang, 3-6 mm hoch, darüber Kerbe, der nächste Stöcker in gleicher Richtung od. stw. schief fortsetzend. Stacheln 2-3 x 1-2 mm, schwach graufilzig, am pheren Ende der Stöcker, nicht voll nur etwas in die Kerben gehend, 5-15 mm entfernt. Randst. körnerförmig gekrümmt, anliegend, bläßbraun od. rötlich, ca 3-8 mm, stw. 7-10. Antheil (1 Exempl.) fehlend, das andere Exemplar mit 4 darüberen Mittelst. von ca 1 cm mit etw. Rippen nach oben, braun. Die line. Blüte verbleibt!

3624 beide glashartig: ca 4 cm lang, Frkn. 7-8 mm lang, 5-6 mm breit, rötlich, mit weißer Wolln. n. merke bis braun. Stachel dreieck. Schuppe von 2-3 mm Länge. Dorniger Verzweigung im Bereich N-K auf 3-4 mm. N-K. Stachel spitz, 2 1/2-4 mm lang bis rötlich, bläßrötlich, halb gerad, durch Stöck. Röhre darüber weit buschig, unter kräftiger, nach oben hakenförmig, ca 10-12 mm lang oben ca 12-14 mm weit bläßgrün, nach oben bläßrose, außen rose mit weißen Wollhaaren n. Schuppen oben bis ca 3/4 cm lang, röhrenförmig, rötlich od. grüngrün. Stacheln unten hellgrün, oben hellgelb, 3/4 bis 1 cm. Beutel creme bis rötlich ca 3/4 cm. 4 hellgrün, ca 20 mm davon ca 3 mm lang, die 5-9 geradst. hellgrün, Narbene, die nicht überragen. Knochel, annere intensiv karmin bis blutrot (7 1/2-8) ca 18-20 mm, wohl ca 5-6 mm, zieml. linear ab, oben stw. zugespitzt. Cieneguitas. Stacheln hybrid mit 12. (mit roten Stacheln, mehr stiel längerer Blüte diese mehr rötlich, N-K ca 6 mm lang, spitz, fuderer Hybrid = Nr. 14. Nahezuhybrid. 2 Lab. Stacheln Nr. 12 und 16, dann Lab. Cieneguitas Nr. 12

3627 Norda van Armit2.) Echinocactus adpressus,
Blüten orange-rot bis blutrot
+ unreife Früchte.3.) Echinocactus dactylifera4.) Echinocactus dactylifera ^{FR 1163} ~~var.~~ ^{von}?
Laufen dichter. Glieder kleiner
als bei kürzer, stärker seit-
wärts gerichtet, meist goldgelb
(dunkel) Bei 4000m und höher,
jungfräuliche mit kleinen wei-
ßen, verbogenen Stacheln und
dunklen Höckern. Blüte?
F Höckerung sehr gering5.) Opuntia prolata, Früchte
selbst in hohen Lagen, Bis
über 4000m hoch.6.) Parodia suprana ohne
Kerbel, nur wenig gelb-
wärts an Färbung. Mittels.
Schwarz, randliche Fortsätze weiß.Bis ca 100m höher als Sancti Spiritus 28
FR 80a7.) Lobelia n. scheint Varietät?
der Art von Sienequillas und
steht über Cañabro Parson,
dem Blüten etwa dieselben,
aber immer farbig, etwa
goldgelb bis orangefarben. Nek-
farbener so lang wie
bei Sienequillas, Stach. ver-
schiedenfarbig, meist hart,
zwei-fach, nicht sehr gerade,
Mittels, 1 bis ca 1/2 Dutzend,
unter Stach. Stach., Rippen
sehr stark wellenförmig ge-
höckert, was bei Sienequillas
sich meist der Fall ist, geht
bis ca 4000m hoch, Rippenzahl
in hohen Lagen manchmal sehr
groß aber meistens nicht größer
als bei Sienequillas.

3635 Frucht 1/2 an 9. Basis mehr
bedeckt - über Ende der Frucht
F. (Hocher 2-3 mm hoch)

12. Rebutia sp. n. FR 1109/10 Nov 29 + 30
 13. Royce sehr dunkelgrün, matt,
 fiedeln od. etw. pyramidal, mit
 dornl. langer bräunlicher R.
 bew. w. 1. Rippen stark auf-
 gelöst oder etwa 4-12 Rippen
 erkennbar. Körp. 10-20 mm in Ø,
 wenig verläst. F. breiten
 mit sehr spär. F., etwa 1-1 1/2
 mm lang, 1/2 mm breit auf
 den etw. schuppen. Stöckchen
 1/2-3 mm entfernt. Stacheln
 neu stachelblau, dann
 meist schwarz oder braun
 übergrauend, zertrü. gerichtet,
 2-3 mm lang ca 8-12
 in Schattelage bis ca 3700 m
 beginnend, am häufigsten bis
 3900-4000 m, sehr
 spaltenweise bis 4200-4300 m an
 Gipfen u. Blöcke. Sehr häufig
Blüten meist weiß, geruchl. 26-30
 mm lang, gut ausgebreitet
Fäden 2 1/2-3 mm lang etwas dick
 weißlich bis rot, mit sehr schmaler
 1-2 mm langer verflachen bis
 grünen schuppen. Klappen weißer
 Stöckchen u. Stacheln sind sehr
 weichen Borste, darüber Röhre 1-2 mm

Tafel der höchsten von allen Reflexen)

Weste von Butenid. (3636)
mit 60 Verwachser.

No. 10. repr. 1-2 mm lang, blaf
alt blafrot, offen meing Naffar
Rohre daruober weit überherd
ca. 7-8 mm lang oben ca 10-12 mm
weit, inneren blaf purpur an den
innen spitz mit, dunkel
grünen schuppen, nach oben auf
ca 5 mm Länge ausgehend, dar
über gefaltet. Mit 10-12 mm Länge
blaf purpur, ca 6-10 mm
lang, 3-4 mm breit, inneren
besonders innen. Über inneren
festen, sehr meing, auch auf dem
inneren meing.
10. gelber, hell, mit sehr gering
schwarz. Naffar. Fieder Teil 15-20
mm, oben 1 1/2-2 mm auf die
10. geneigten, grünlich gelber
5-6 Karbale.
Kraut, 15-18 x 5-7 mm, spähförmig
oben zugrund, ohne Spitzchen, inneren
schwarz (1 1/2) bis Karmin, ohne
Färbung. Basen offener purpur,
die Enden oft etwas dunkler, die
äußeren Kraut, oft etwas purpur,
besonders die Ränder, die äußerste
mit grün, Mittelteil, 3-4 mm
weit, oben sind die Blüten einiger
offener heller, rot, die inneren
Blätter rötlicher oder häufiger schwarz
auch mit rot. 10. 10. und 10. 10.
gering. Blüte mit beiden inneren.

T. bl. n. n. Bedgood first prize Kanwin

1) 36.24
zu höchsten Lager von 700 - 4200
cm wo Nr 12 fallen würde, ist
die Farbe wieder karmin.
F Frucht hugely ca $\frac{3}{4}$ von B, Be-
deckung wie (Frucht)

13) Rebutia violascens ~~ex Hoffm.~~ ex Hoffm. ex Hoffm.
 FR 352, Vom Tafe der Berge bis
 auf ca 3900 m Höhe ziemlich
 häufig in unreifen Fr. Blüthen
 und Knospen. Pfl. normal ein-
 sprossig bei Besonnung von
 Ostlicht, mit starker weißer
 Rinde, 2-4 cm dick, meist nur
 wenig verlängert. Rippen
 ausgeprägt 11-13, 3-5 mm
 hoch, meist nur etwa die Hälfte
 einkerkend, matt od. glänzend.
Breite ca 2 mm lang, halb-
 so breit, wenig sparrig, bis
 oben auf den Gipfen 5-8
 mm entfernt. St. radelartig,
 dicker. Adstr. abtund, Mann-
 u. Weibchen 3-7 mm lang, 6-10

57. Balken rund oder leicht 3/4 4/5 mm
lang. Balken 5-7 mm lang in Brett,
mit weißer, brauner od. rötlicher
Schuppen bed. 1-2 mm dick
weißlich und meist 1-2 flach

3638
 wie ich mir die Fäden von der
 darüber 4. auf 3-5 mm mit Nadel
 verwachsen
 1-14. Nadel, 1-2 mm lang,
 1-14.

Dahl darüber Bruchteil von Beschaffenheit.
6-12 mm lang, abg. 5-15 mm weit,
inneren etwas dicker, abg. 5-15 mm
verlängert, mit überlappenden, rötlichen,
Schuppen nach oben gerichtet
auf ca. 2-3 mm Länge, abg. 5-15 mm
bis mehreren unvollständigen
Bogen. Überlänge in Knochel
Schaufel hell gelblich, ca. 10 mm
Bauart orange, 1-2 mm - Länge
3-4 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 7 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm
11-12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm - 16 mm - 17 mm - 18 mm - 19 mm - 20 mm
2-3 mm auf die Kellchen, v. hell
gelblich 6-8 mm - geneigte Harbe
Knochel 14-20 x 5-7 mm Schuppen
Knochel 14-20 x 5-7 mm Schuppen

4. etwa nabelsg. Kamm bis zur 1.
 Plasse (Längs 2-3) ~~etwa~~
 5. Rücken v. 1. (Längs 5-7)
 schon bei Fischen 7 1/2 bis ca. 9.
 unipol. bl. pup. oder nicht
 stopfende Längsdr. die 4 P. waren
 7. v. d. etw. ausgebreiteten) etw. verweilt
 5. P. nur ganz in der Basis
 18-4 und 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 8

3649

darüber ist L. mit Röhre auf
5-6 mm hoch.

N. K. bläß, rötlich, 1/2-1 mm lang
mit weissem Nektar offen.

Röhre darüber 3 mm lang oben
3-5 mm weit, rötlich.

außen bräunlich purpur, das
innere rötlich, der Röhre
hoch, ohne Schuppen nach oben.

grünlich-rötlich, Schuppen bis
1/2 mm lang, ohne Röhre, Borsten
kurz, weiß, 6-12 mm, innerlich

glatte Röhre, Röhre mit angell
voller gelb als vordere.

etwa 1/2 mm lang, abdrückbar, Narben
weiß, ca 15 mm, oben 1/2-2/3

mm auf die weisse bis bläßgelbe
gegrünliche 3-4 Narben, Narben

Wachst. rötlich, rötlich, rötlich
nach unten, Röhre rötlich, rötlich

10-20 x 5-7 mm, rötlich, oben
rötlich, die Röhre rötlich, rötlich

mit Röhre, die Röhre rötlich, rötlich
der Röhre, die Röhre rötlich, rötlich

Körper dunkelgrün, rötlich, rötlich
ca 3-5 cm, Röhre rötlich, rötlich

grün, rötlich, rötlich, rötlich
Röhre rötlich, rötlich, rötlich

3650

Röhre stark aufgelöst, meist
gegen 20. Röhre rötlich, rötlich

Röhre, 2-4 mm D, rötlich,
fest, rötlich, 1-1 1/2 mm D, rötlich

Röhre, 2-3 mm, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

Röhre, rötlich, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

Röhre, rötlich, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

Röhre, rötlich, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

Röhre, rötlich, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

Röhre, rötlich, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

Röhre, rötlich, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

Röhre, rötlich, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

Röhre, rötlich, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

Röhre, rötlich, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

Röhre, rötlich, rötlich, rötlich,
Röhre, rötlich, rötlich, rötlich

365) Agrostis purpurea mit eben-
ständigen Schuppen, dreiecksförmig
5-7 mm lang, weißlich, braunrot,
mit kalten Schalen.
Blaufl. infusur purpurea, 10-12
mit Beutel ~~mit~~ mit mit.
Insekten mit mit mit
hellgrün, mit mit mit
Nachsch. oder Nachsch. zu Beutel
16-18 mm, wobei ca 1 mm auf
die mit mit mit mit mit mit
Nachsch. mit mit mit
Kronbl. infusur mit mit mit
mit mit mit mit mit mit
spärlig, nahe oben am mit mit
mit mit mit mit mit mit
mit mit mit mit mit mit
mit mit mit mit mit mit
Blüte dunkelgrün, einzeln, oder
topförmig mit etwas mit mit
Wurzel. Köpfe etwa halbkuglig,
in den Boden wachsend, etwa 3-5
cm Ø, mit vertieften Best, oder un-
best. Scheitel. Rhizom etwa 12-16
stark aufgelöst in mit mit mit
Löcher von etwa 7-12 mm, mit
u. etwa 4-6 mm Höhe, mit mit
3-4 mm lang, ca 1 mm weit, meist

3652
 aktiv. reicht bis zum Grunde der
 17 Rippenrippenfurden gehend, oder
 nahe bis zum Grunde und sich in
 eine Falte darüber hinaus bis
 in den Grund fortsetzend. Presien
 auf der Hölzer und in dieser
 Richtung darüber reichend, etwa
 5-8 mm von einander entfernt,
Markeln neu braun vergreant,
 kammförmig, nicht ansetzend
 oder halb absetzend, kammförmig
 gekermt 5-12 mm, etwa
 48-12 Bl. mit an der Spitze, Erk oft in
Pod etw finger stark ↓

T 3 Blüte konnte genauer auf Farbe fest-
gestellt werden! Die beiden ang. Blüten
waren von Verwelken! Markeln von
Blau is mit mittel-dunkelgelb die
inneren, die äußeren nur blau rot;
inner nach oben rubin, Spitz 6-7
die neuen enden nur braun wachse
Spitz 5-6, Dunkel 4-5 1/2. äußere
im Ganzen nur braun wachse mit
grünlichen Ende. Keine Purpur Farbung;
Wachse ist in der Wachse von etw Wachse von
Wachse in rubin 4. Blüte was
in der Farbe etwa ebenso.
 Am 8. Okt. 63 in reifen in wenigen in
reifen Er. In Wachse in Wachse in
Wachse in rubin, etwa hügl 5-7 mm ↓
Wachse wie Erk.

3655

Tariza, Vorgelände nach Nord 12. XII 611.) Platyph. sulphurea, im Blüte.2.) Platyph. ipatiana, in Knospen3.) Phyllocactus tarizensis, ausgefallene,
Reife in ganz reife Bl. Bl. + Kn. Rhynchos
2-3 mm hoch Einzelst. + vielfach knospenetwa 12-18 mm lang u. breit, nach unten
blau-grünlich od. weißlich, nach oben
~~etwas~~ etwas zitronengelb
mit dreieckigen dunkelbraunen bis hellgelben
1/2-1 mm langen Schuppen und sehr
spärlichen kleinen weißen Wollhärchen
blau bei Reife oben auf. Einzelst.
schleimig weiß.Meiste Blüte 20. XII 62. Alpinomorphmorgens und schliefen hoch
mit tags od. früh nachmittags
anscheinend bereits verwelkend,
Blüten seitlich, 27-40 mm lang,
meist über N.-K. mit einem Knospe
nach unten seltener gerade.Frk. 5-8 mm lang, oben 5-8 mm
breit, oben am breitesten nach derBasis gerundet u. nur gering
verschmälert, orange, nach oben
meist karminrot, mit vielen
3 dreieckigen blossen, ca 1/2 mm

3656

langen Schüppchen u. spärlichen
kurzen weißen WollhärchenN.-K. Zwiebelförmig unten weiß
ungerundet, oben eiförmig, 2-3 mm lang,
2 1/2-4 mm weit (mit Bl.), blau, mit
deklar, oben geschlossen durch aus
der Wand hervorstehendes blaus
fast quer bis schräg nach oben
gerichtetes, bis an den gr. zwi-
schendes Diaphragma mit Inset.
darauf und in einen Stb. Ring
auslaufend.Dreiecke darüber röhrig, 15-22 mm
lang innen 2 1/2-4 mm weit, blau,
außen meist karminrot, in Schalen-
lage auch orange-gelb (4) mit
ebenroter Bl. od. in Schüppchen
diese gelb bis auf ca 2 mm Länge
zunehmend mehr rot, in
Schalenlage gelb.Blau weiß, die kleinen cremefarb. Punkte
stehen in gelb. Beginn bis hell. Höhe
der Kronblätter. Pollen cremef.
Griffele blaugelb, Ende meist rötlichbraun,
mit Narben sehr tief, gleich oder
höher als Öffnung, 20-35 mm von
2-3 mm auf der hellgrün gepunkteten
6-9 Narbenlappen.Kronk. immer aufrecht, nur Narben
breitend, äußere bräunlich, nach außen gebogen
Krone ca 1 cm breit, Kronbl. 6-8 x 1 1/2-2 mm
ungerundet, rubinrot (9) bis purpur (10) Länge 6-7.

3657

Tariza

4) *Tridocentacagnensis*; selten5) *Diplazium*? *forbesii* *bolivianus*
Kn + Bl. Daten von 4 *Blüten*

mit etwas Wohlgeruch, ausgebreitet
 12-15 cm lang, oben weit geöffnet
 Frkn orangefarben 3-4 cm lang
 18-22 mm breit, sonnenförmig
 höckerlos, glatt, mit sehr wenigen
 roten Punkten, dreieckig, $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{3}{4}$ mm
 langen $1\frac{1}{2}$ -2 mm breiten Schuppen, kahl.
 N-K. mit Nektar bekränzt, sehr wenig,
 25-35 mm lang, 1-3 mm weitem Lk.
 oben geröhrt, durch Basal der unteren. Hl.
 Röhre darüber, drückerig 42-33 mm
 lang, oben 20-33 mm weit innen
 weiß, außen etw. graugrün, glänzend
 im Inneren N-K schuppenlos oder
 mit sehr wenigen Schuppen wie Frkn.
 oben mit einigen Schuppen bis zu
 ca $1\frac{1}{2}$ cm lang, fast eiförmig, oben
 graugrün, rot gerandet, glatt, über
 dem in Knospe. *Blüte* weiß, $3\frac{1}{2}$ -5
 cm, die Knospen oben, fuchsrot, gelbe
 Röhre oberh. N-K. dick, Lk. ohne
 Schuppen, Harben, weißgrünlich, 3 mm
 dick
 $9\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ cm, von 12-15 mm auf
 die Blätter bis 15-17 Harben, kommt
Knospe, innere weiß, zuweilen mit F

3658

3658

6) *Chimaphora* *diffusa* in Knospe
 selten, Blüte, Frucht F(S. 3663)
 1 *Blüte*, *Blüte* 22.XII.2, nahe am
 Scheitel, Knospe geöffnet, nur einer
 Tag, in der Nacht, wellend, gerollt.
 Frkn grünlich, 16 mm lang, 11 mm
 breit, halbkreisförmig, gehockert,
 mit schmal dreieckigen, blaugrün-
 lichen, 3-5 mm langen, schuppen-
 ca 5 mm entfernt, ohne Schuppen.
 geistlichen, werben, wellen, gegen die
 Mitte der Blüte, einige gelbe, wenige
 rot, worden, oben, bei ca 5 mm
 Höhe, hier in größerer Zahl, aber
 erst bei 4-5 cm, fuchsrot, Nektar
 mit etwas rosa, außen rubinrot
 5-7 x $1\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{4}$ cm, spaltförmig
 außen oval, oben gerundet
 ob. etw. fingerförmig, die äußeren
 lineal (förmig)
 vorhanden, bildet sich wohl nur im
 Inneren cm, Röhre oberhalb der
 unteren 5 mm, auf ca 4 cm fast
 weiß, darüber schneeweiß, fuchs-
 rot, rot, in Knospe, 14 cm
 lang, oben $2\frac{1}{2}$ cm weit, innen
 kahl, oben grünlich, außen
 bräunlich-grünlich, mit Schup-
 pen nach oben, ca 2 cm lang
 werdend, bei nur ca 4 mm Breite
 an Basis, grünlich-grünlich, mit
 Schuppen, weiß, oben, dann schwar-
 ze, Harben, F(S. 3660)

3661 Augustura4) Chlorocallis karwinskii5) Chlorocallis karwinskii
ohne Knospe6) Chlorocallis karwinskii FR 1170.

Zur beiden Seiten des Laubstems
aufsteigend auf der Füllstängel
Stängel des Laubstems, nicht des Laubstems
Kleine Knospe, verbleibt, selber
frühe Blüte, einige runde Früchte
oben, viele Frucht, Blühen, Blauen
einseln bis reichlich wachsend durch
Artung, Leben, Ausschlag, die sich
größer können, was große Knospe, die
bei Blüte werden. Köpfe mit etwas
Rötlichwurzeln in der Boden, keine
wachsend etwa 20-40 mm dick, halb-
kuglig oder flacher mit gerabbeltem
Bestandtheil, dunkelgrün bis, etwas
Orangegrün auch etwas rötlichgrün, meist
matt. Rippe 11 bis 17, gerade mit
gerader Mittellinie, flach, leicht
stumpf, seltener etwas mit 1 1/2-3 mm hoch
umgekehrt oder geringfügig gekrümmt. Stiele
gerade oder bis leicht in die Länge
kurven gehend weißlich, gerade bis
weilen etwas schief auf die oberen

Ecken gegen die Rippe, 1 1/2-3 mm 3662
lang, 1-1 1/2 mm breit, 1-4 mm entfernt.
Blätter kammerförmig, seitwärts
gerichtet u. h. Körperwärts gebogen,
selten geringfügig anseits gerich-
tet, matt, sehr mäßig, man
ruht auch etwas verbogen 11-21,
meist 1-4 mm manchmal bis 6 mm lang,
wenn frisch, braun bis rotbraun bis
hellgelb, beim geizt. Anweilen
ist sehr kleiner, dicker und dunkler,
stark nach oben gebogener Mittelstiel
vorhanden von ca. 5 mm, nach
Anweilen ist der oberste Stachel von
gleichem Aussehen in gleicher Stellung.
Blüten halbsitzend, nicht aus der
Erde kommend.

Frucht vom Aussehen von Echinops-
Früchten, oben etwas spitz, Basis
sehr vergrünert, aber weniger als
oben spitz, dick bei etwa 1/3 Länge.
Dunkelgrün 12-16 x 8-12 mm, mit
sehr rötlich dreieckigen 1-2 1/2 mm langen
geblieben bis rötlichen Schuppen 2-3 mm
entfernt, und langen seidigen, weißen
Haare. Stiele mit einigen kleinen
Stacheln wie die des Körpers, Frucht
platt der ganzen Länge nach auf
Reich, rötlich weiß von Anweilen aufgesucht
Stiele, 2-3 mm Ø, wenn verbleibt
Echinops - Same, Same ohne den Stachel
10 Blüte von Länge 13. 2 1/2 mm, Foto 3665

3665

F (zu Lob. Wiskam 3662)
 geruchlos halbseiflich 38 mm
 lang, gut ausgebildet.
Erkni 7 mm lang $4\frac{1}{2}$ mm breit,
 hellgrün viel dichter bedeckt als
Helicidna, echinoprismig,
 rötlich sehr verknallt
 aufsteigend. Schuppen sehr scharf
 als bräunlich $1\frac{1}{2}$ (funkt.) bis 2 mm
 lang, reichlich weiße Wolle. V-K
 sehr reduziert, da U auf ca.
 2 mm Länge mit Rinde verwachsen.
 Kein Nekt. oder Nektar. Frucht
 sehr, sehr fast bis zum
 Reifezeitpunkt.
Blüte darüber trichterig 10-11 mm
 lang oben 8-10 mm breit innen
 oben außen hellgrün, wie Erkni.
 Schuppen bis ca. 1 cm an Länge
 zunehmend u. mehr grün, nach
 unten all. Schuppen fast bräunlich
 reichlich weiße Wolle, an Rande
 und zwischen schwarz. Blatt
 puppur. 1-1 $\frac{1}{2}$ cm lang
 die ganz Rande fast 1 cm lang
 Beutelgrüne. Frucht-Lücke 7 mm
U mit Harz, rot. d. Beuteln.
Blattgrün 16 mm, wovon 3 mm
 auf die hellgrüne, gepreist 5 Ner-
 belklappen.
Kronbl. 16 x 8 mm, sehr spitzlich,

unter verknallt, oben etwas
 zugespitzt, die äußeren mehr
 aufgestellt. feiner Spitze, puppur. 10 $\frac{1}{2}$
 die inneren schmal, 2-3 mm breit
 lang zugespitzt, mehr grün.
 (Siehe auch Blatt auf S. 3420.)
F nachblühend, Blüte öffnen abends
 und schließen früh am Morgen
 öffnen nicht wieder, von hellen
 Kalken die reichblühende und damit
 den umgebenen Blüten (Erkni)

3666

Frucht (zu Lob. Wiskam 3659) Frucht
 5 $\frac{1}{2}$ cm U mit Harzen am
 Rande rot. d. Beuteln, hellgrün,
 45 $\frac{1}{9}$ cm wovon 2.5 mm auf die
 14 Blätter, gepreist Harzenklappen.
Kronbl. Innere 2. mittlere rein weiß,
 5-6 cm x 18-22 mm, bei ca. $\frac{2}{3}$
 Länge am breitesten, unten sehr
 verknallt oben gerundet
 od. sehr zugespitzt. Die
 äußeren sehr linear, oben
 1-1 $\frac{1}{2}$ cm breit, mehr blaugrün
 mit bläulichen Rändern.
 Ringe in Schuppen stark nach
 außen gebogen, blaugrün. Exemplar
 der Blüte dunkelgrün, hellgrün
 mit verbleib. nachblühenden
 26 Rippen. 13 cm D. Rippen 12 mm hoch
 Karben tief, scharf, gering beiförmig
 gehöhlet. Frucht 5-10 mm lang,

3667

3-5 mm breit, $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ cm entfernt,
in den Kerben zw. den Höckern;
diese Kerben ca 2-5 mm eingesenkt
flachbögig, die oberen Enden der
Hörner etc. verröhren, aber nicht stark
barben gleich glattartig &
ganz bleib. braun, dunkel gerichtet,
etw. gebogen namentlich die Spitzen,
8-12. stark nadelförmig, die
Handlilien gering aussichts gerich-
tet, meist oft fehlend oder bis 83,
alle $1\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ cm lang, spreizend
weitere 8 Blüten 15-19 cm lang,
Öffn. 10 cm Ø und weiter Frühe
ab 12 mm lang, ab 10 mm breit, Lagen
ab 2 mm Länge, mäßig schmal bis
sehr schmal auch rotbraun, nicht
immer mehr braun gerichtet
Frühe aber weniger ab $\frac{1}{2}$ mm breit
um 1/2; ab $2\frac{1}{4}$ cm Länge, Röhre dar
über ab $4\frac{1}{2}$ cm Länge oben $1\frac{3}{4}$ -3 cm
weit. Schuppen, auch rot gerichtet.
Nachtbaute oben auch reich schwarz
ohne weiße dorn. Blüte die ab Röhre
 $1\frac{1}{2}$ -3 cm lang, die andern ab 5 cm lang
Invert. - Lücke ab $2\frac{1}{2}$ cm. Frühe ab $9\frac{1}{2}$ cm
Narben ab 15 mm, bläugellisch hellgrün
an Zahl ab 5. Krone bis 1/2 cm
etw. rosa, meist rinnend, ab $3\frac{1}{2}$ cm
lang, 13-24 mm breit; bei $\frac{1}{2}$ bis $\frac{2}{3}$

3668

^{No 68}
Länge am breitesten; öfters mit
gleich aufgesetzt Litz cher; die äußere
 $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ cm breit, mit blaßrosa bis
weißen Rändern. Übergang zu Schuppe
nicht immer nach außen gebogen.
Blaspapier von mehr gelbbraun,
ell. fleischlich bis halbkugelig
bis ca 15 cm D., bis ca 28 Rippen
Rippen bis stark bei Formung
15 mm hoch. Breite 2-3½
cm entfernt bis 1 cm tief eingesenkt
in die Rippen in die Kerbe.
Vorwiegend gering bis fleischig stark
blauen bläulich weiß seelich.
In manchen auch sehr sterb-
liche freundlich, gebogen, sonst
nur 5-8 ohne für Pleurastacheln
Kamm oder Blitze Rippen
u. ca 6 cm D. bilden.
Heißere Blüte 20 cm lang mit
Krone von 7 cm Länge. Die
äußeren schmal, die auch
sonst meist schleimigsten sind
bis 8 cm lang sonst wie oben.
Laust viele Beulen gehen immer weiß.

³⁶⁶⁹
Firma von Herrn Carlos Wagner
 einige km östl. von Tuxtla
 nordl. des San-Juan-Flusses, 15. II. 62

- 1) *Platypus sulphurea*
- 2) " *ipatrana* Bl.-Begium
- 3) *Cleistocarpus karibensis*
- 4) *Echinomastix*
- 5) " *fielbridgei* var
- 6) *Robinia filigularia*, blüht
~~nur wenn sie in der Sonne steht~~ spärlich
 auf gelbem, gelblich-weißem, hierher?
- 7) *Reh* ~~fielbridgei~~ *fielbridgei* var
 am Fußwänden des Flusses,

F (zu *Echinomastix* ~~manuata~~ *manuata* 3663)
 fast dufflos, nahe am Scheitel,
 nachts offnend, am Tage darauf
 noch offen, 19-24 cm lang, 8-17
 cm weit.
Röhre 13 mm-20 mm lang u. 13-17
 mm weit
 grün mit weißen Flagen u. schmal
 dreieckigen weißlichen
 1-3 mm langen Schuppen.

11-15 mit Nektar, röhrig 23-30 mm
 lang, weißlich, eng

~~gerundet nach rückwärts~~ 3670
Röhre darüber ~~schmal~~ ~~breit~~
 11-13 cm lang, oben 2-3 1/2 cm weit,
 innen grün, außen eben so grün,
 mit roten, weißten, oben roten
 Schuppen nach oben
 bis ca. 2 cm Länge, nach unten
 schmal, röhrig, weißlich, oben
 braungelb, fahl, schmal
Blau, unten grün, nach oben
 11-13 cm lang, die der Röhre
 2-4 cm lang.
 Kr. Länge 5 1/2-7 cm.
 lg. 1 1/2-2 mm dick, unten grün,
 oben weiß, oben stark, ober 15
 -17 cm lang; Mark. bläulich,
 1 1/2-2 cm weit ausgebleicht
 11 II an Fahl.

Kraut 5-8 x 18-40 mm
 bei ca. 2/3 Länge am breitesten,
 oben gerundet mit Spitzchen,
 unten 1/4 Breite, schneeweiß,
 mittlere auch etw. purpurne,
 äußere 4-6 cm lang, 6-14 mm
 sehr lang, röhrig, nach rückwärts
 die Blätter mit roten
 Blüthen im ganzen etwas wie
 var. röhrig.

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

34) Exposition von # 26. Okt.
 XXXX
 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. - 39. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. - 47. - 48. - 49. - 50. - 51. - 52. - 53. - 54. - 55. - 56. - 57. - 58. - 59. - 60. - 61. - 62. - 63. - 64. - 65. - 66. - 67. - 68. - 69. - 70. - 71. - 72. - 73. - 74. - 75. - 76. - 77. - 78. - 79. - 80. - 81. - 82. - 83. - 84. - 85. - 86. - 87. - 88. - 89. - 90. - 91. - 92. - 93. - 94. - 95. - 96. - 97. - 98. - 99. - 100. - 101. - 102. - 103. - 104. - 105. - 106. - 107. - 108. - 109. - 110. - 111. - 112. - 113. - 114. - 115. - 116. - 117. - 118. - 119. - 120. - 121. - 122. - 123. - 124. - 125. - 126. - 127. - 128. - 129. - 130. - 131. - 132. - 133. - 134. - 135. - 136. - 137. - 138. - 139. - 140. - 141. - 142. - 143. - 144. - 145. - 146. - 147. - 148. - 149. - 150. - 151. - 152. - 153. - 154. - 155. - 156. - 157. - 158. - 159. - 160. - 161. - 162. - 163. - 164. - 165. - 166. - 167. - 168. - 169. - 170. - 171. - 172. - 173. - 174. - 175. - 176. - 177. - 178. - 179. - 180. - 181. - 182. - 183. - 184. - 185. - 186. - 187. - 188. - 189. - 190. - 191. - 192. - 193. - 194. - 195. - 196. - 197. - 198. - 199. - 200. - 201. - 202. - 203. - 204. - 205. - 206. - 207. - 208. - 209. - 210. - 211. - 212. - 213. - 214. - 215. - 216. - 217. - 218. - 219. - 220. - 221. - 222. - 223. - 224. - 225. - 226. - 227. - 228. - 229. - 230. - 231. - 232. - 233. - 234. - 235. - 236. - 237. - 238. - 239. - 240. - 241. - 242. - 243. - 244. - 245. - 246. - 247. - 248. - 249. - 250. - 251. - 252. - 253. - 254. - 255. - 256. - 257. - 258. - 259. - 260. - 261. - 262. - 263. - 264. - 265. - 266. - 267. - 268. - 269. - 270. - 271. - 272. - 273. - 274. - 275. - 276. - 277. - 278. - 279. - 280. - 281. - 282. - 283. - 284. - 285. - 286. - 287. - 288. - 289. - 290. - 291. - 292. - 293. - 294. - 295. - 296. - 297. - 298. - 299. - 300. - 301. - 302. - 303. - 304. - 305. - 306. - 307. - 308. - 309. - 310. - 311. - 312. - 313. - 314. - 315. - 316. - 317. - 318. - 319. - 320. - 321. - 322. - 323. - 324. - 325. - 326. - 327. - 328. - 329. - 330. - 331. - 332. - 333. - 334. - 335. - 336. - 337. - 338. - 339. - 340. - 341. - 342. - 343. - 344. - 345. - 346. - 347. - 348. - 349. - 350. - 351. - 352. - 353. - 354. - 355. - 356. - 357. - 358. - 359. - 360. - 361. - 362. - 363. - 364. - 365. - 366. - 367. - 368. - 369. - 370. - 371. - 372. - 373. - 374. - 375. - 376. - 377. - 378. - 379. - 380. - 381. - 382. - 383. - 384. - 385. - 386. - 387. - 388. - 389. - 390. - 391. - 392. - 393. - 394. - 395. - 396. - 397. - 398. - 399. - 400. - 401. - 402. - 403. - 404. - 405. - 406. - 407. - 408. - 409. - 410. - 411. - 412. - 413. - 414. - 415. - 416. - 417. - 418. - 419. - 420. - 421. - 422. - 423. - 424. - 425. - 426. - 427. - 428. - 429. - 430. - 431. - 432. - 433. - 434. - 435. - 436. - 437. - 438. - 439. - 440. - 441. - 442. - 443. - 444. - 445. - 446. - 447. - 448. - 449. - 450. - 451. - 452. - 453. - 454. - 455. - 456. - 457. - 458. - 459. - 460. - 461. - 462. - 463. - 464. - 465. - 466. - 467. - 468. - 469. - 470. - 471. - 472. - 473. - 474. - 475. - 476. - 477. - 478. - 479. - 480. - 481. - 482. - 483. - 484. - 485. - 486. - 487. - 488. - 489. - 490. - 491. - 492. - 493. - 494. - 495. - 496. - 497. - 498. - 499. - 500. - 501. - 502. - 503. - 504. - 505. - 506. - 507. - 508. - 509. - 510. - 511. - 512. - 513. - 514. - 515. - 516. - 517. - 518. - 519. - 520. - 521. - 522. - 523. - 524. - 525. - 526. - 527. - 528. - 529. - 530. - 531. - 532. - 533. - 534. - 535. - 536. - 537. - 538. - 539. - 540. - 541. - 542. - 543. - 544. - 545. - 546. - 547. - 548. - 549. - 550. - 551. - 552. - 553. - 554. - 555. - 556. - 557. - 558. - 559. - 560. - 561. - 562. - 563. - 564. - 565. - 566. - 567. - 568. - 569. - 570. - 571. - 572. - 573. - 574. - 575. - 576. - 577. - 578. - 579. - 580. - 581. - 582. - 583. - 584. - 585. - 586. - 587. - 588. - 589. - 590. - 591. - 592. - 593. - 594. - 595. - 596. - 597. - 598. - 599. - 600. - 601. - 602. - 603. - 604. - 605. - 606. - 607. - 608. - 609. - 610. - 611. - 612. - 613. - 614. - 615. - 616. - 617. - 618. - 619. - 620. - 621. - 622. - 623. - 624. - 625. - 626. - 627. - 628. - 629. - 630. - 631. - 632. - 633. - 634. - 635. - 636. - 637. - 638. - 639. - 640. - 641. - 642. - 643. - 644. - 645. - 646. - 647. - 648. - 649. - 650. - 651. - 652. - 653. - 654. - 655. - 656. - 657. - 658. - 659. - 660. - 661. - 662. - 663. - 664. - 665. - 666. - 667. - 668. - 669. - 670. - 671. - 672. - 673. - 674. - 675. - 676. - 677. - 678. - 679. - 680. - 681. - 682. - 683. - 684. - 685. - 686. - 687. - 688. - 689. - 690. - 691. - 692. - 693. - 694. - 695. - 696

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

25) 20. Millede da Lorge 28 XI
62 m m m 30 m m m
Kunst, Schalen, Fossilien a f
Falten 6 A 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 8

23) 20. Stammkorn, an der
 27. XI 62
 24. XI 62
 25. XI 62
 26. XI 62
 27. XI 62
 28. XI 62
 29. XI 62
 30. XI 62
 31. XI 62
 32. XI 62
 33. XI 62
 34. XI 62
 35. XI 62
 36. XI 62
 37. XI 62
 38. XI 62
 39. XI 62
 40. XI 62
 41. XI 62
 42. XI 62
 43. XI 62
 44. XI 62
 45. XI 62
 46. XI 62
 47. XI 62
 48. XI 62
 49. XI 62
 50. XI 62
 51. XI 62
 52. XI 62
 53. XI 62
 54. XI 62
 55. XI 62
 56. XI 62
 57. XI 62
 58. XI 62
 59. XI 62
 60. XI 62
 61. XI 62
 62. XI 62
 63. XI 62
 64. XI 62
 65. XI 62
 66. XI 62
 67. XI 62
 68. XI 62
 69. XI 62
 70. XI 62
 71. XI 62
 72. XI 62
 73. XI 62
 74. XI 62
 75. XI 62
 76. XI 62
 77. XI 62
 78. XI 62
 79. XI 62
 80. XI 62
 81. XI 62
 82. XI 62
 83. XI 62
 84. XI 62
 85. XI 62
 86. XI 62
 87. XI 62
 88. XI 62
 89. XI 62
 90. XI 62
 91. XI 62
 92. XI 62
 93. XI 62
 94. XI 62
 95. XI 62
 96. XI 62
 97. XI 62
 98. XI 62
 99. XI 62
 100. XI 62

24) 20. Stammkorn, an der
 27. XI 62
 24. XI 62
 25. XI 62
 26. XI 62
 27. XI 62
 28. XI 62
 29. XI 62
 30. XI 62
 31. XI 62
 32. XI 62
 33. XI 62
 34. XI 62
 35. XI 62
 36. XI 62
 37. XI 62
 38. XI 62
 39. XI 62
 40. XI 62
 41. XI 62
 42. XI 62
 43. XI 62
 44. XI 62
 45. XI 62
 46. XI 62
 47. XI 62
 48. XI 62
 49. XI 62
 50. XI 62
 51. XI 62
 52. XI 62
 53. XI 62
 54. XI 62
 55. XI 62
 56. XI 62
 57. XI 62
 58. XI 62
 59. XI 62
 60. XI 62
 61. XI 62
 62. XI 62
 63. XI 62
 64. XI 62
 65. XI 62
 66. XI 62
 67. XI 62
 68. XI 62
 69. XI 62
 70. XI 62
 71. XI 62
 72. XI 62
 73. XI 62
 74. XI 62
 75. XI 62
 76. XI 62
 77. XI 62
 78. XI 62
 79. XI 62
 80. XI 62
 81. XI 62
 82. XI 62
 83. XI 62
 84. XI 62
 85. XI 62
 86. XI 62
 87. XI 62
 88. XI 62
 89. XI 62
 90. XI 62
 91. XI 62
 92. XI 62
 93. XI 62
 94. XI 62
 95. XI 62
 96. XI 62
 97. XI 62
 98. XI 62
 99. XI 62
 100. XI 62

Verlag. - 2042

