

Friedrich Ritter

Tagebuch 65



Ritters Bezeichnung:	Heft 65
Seiten:	4354–4458 (+ 55 nicht nummerierte Seiten persönliche Notizen)
Land:	Peru, Bolivien, Brasilien
Zeitraum:	17. August 1964 – 10. November 1964
Bemerkungen:	Hinterer Einband fehlt.



[Fragment of a document with handwritten notes and a stamp.]

5 1/2 ...
... 4431
... 4438 - ...
... 4439
... 4440 - ...
... 4441
... 4442 - ...
... 4443
... 4444 - ...
... 4445
... 4446 - ...
... 4447
... 4448 - ...
... 4449
... 4450 - ...
... 4451
... 4452 - ...
... 4453
... 4454 - ...
... 4455
... 4456 - ...
... 4457
... 4458
... 4459
... 4460
... 4461
... 4462
... 4463
... 4464
... 4465
... 4466
... 4467
... 4468
... 4469
... 4470
... 4471
... 4472
... 4473
... 4474
... 4475
... 4476
... 4477
... 4478
... 4479
... 4480

[Stamp: LORE]

Palca, Urten 3000 m 4354 -
 Machac 4356 - Recuay 4357 - Valle
 Forjalera von 3600 - Km aufwärts
 4358 - Valle Forjalera ca 2000 m
 4359 - Chacabambilla 4360 -
 15 km nördl. Chancay 4361 -
 Maturana 4362 - Oberhalb Lammasio
 4363 - Lardaco 4364 - Oroya 4364
 22 km nördl. Oroya 4364 - Pasos
 4365 - 13 km von Pampas nach
 Colcabambilla 4365 - Villanueva
 4366 - Ort. Mantaro, 14 km nördl. Villanueva
 4367 - Pampas Ort 4380 - Höhen zw.
 Pampas 4380 phyll. nach Mantaro
 3500 m 4381 - Mantaro 4383 - Moya
 4393 - Oberhalb Acusho 4398 -
 Schlucht Rio Pampas oberh. 4400 -
 Schlucht Rio Pampas unte. 4403 -
 oberh. Andahuaylas 4405 - Valle
 Pachachaca, 2000 m 4407 - Chahu-
 anca oberh. 4409 + 4415 - 2 km nördl.
 unte. u. Lucanas 4416 + 4418 - Rio
 nördl. Lucanas 4423 - Huayllabamba 4427
 Nördl. Chahuabamba 4427 - Yampara 4429
 Nördl. Chahuabamba 4430 - Nördl. Baquerito 4431
 8 km nördl. Chahuabamba 4433 - Elmer
 4434 - 28 km nördl. Chahuabamba 4435 -
 4436 - 46 km nördl. Chahuabamba 4436 - Elmer

[illegible]

4355

- 9) *Trichocereus pallarensis*; ohne Kn. B&E
 10) *Maturana cunecephala*, noch
 weit unterhalb Talca; auf den
 Bergen bis fast 3600 - 1 x auf
 Kn. B&E, nur bei Tr. selten reife Fr.
 etwa bis 1 m hoch!

- 11) *Maturana paniculata*, nur
 etwas unterhalb Talca und
 Recodo; weder weiter unterhalb
 noch auf den Bergen gefunden.
 ohne Kn. B&E.

12) *Maturana* (na 4358) Blüte schieß
 aber Kronblätter auch der Oberseite
 sind ausgebreitet. Farbe etwa zim-
 mer oder gelbrot, gering bis
 breit violett gerandet (siehe Foto).
 Frucht typisch in Streifen aufwand
 bis etwa $3/4$ oder $4/5$ nach oben
 aber an der Basis nicht geöffnet,
 sondern sich aufplatzt. In der
 Mitte der oberen Kronblätter wohl die
 der Fotoblüte. Die Kelchblätter sind identisch
 mit denen oberhalb Talca bei ca
 3000 Metern, auch in Größe und
 Farbe der Stacheln. Ist mit vereinigt

4356

Oberhalb Maipo n. Oberhalb
 22. VIII 64

- 1) *Glyndora* sp. spärlich, 2-3
 Blüten pro Pflanze, 2-3
 mit 10-15 cm Durchmesser, 2-2 1/2
 cm hoch, korallenförmig, nicht
 ausgebreitet; Frucht weiß, 1/3-1/2
 cm hoch, korallenförmig, gelblich-
 weißlich, 1/2 cm hoch, 1/2 cm
 weinlich, groß, rund, 1/2 cm
 höher, weinlich, Schlecker.
 T. weinlich, auf Ende einige feine gelbe
 stachelige Stachelchen (siehe Foto).
- 2) *Trichocereus pallarensis* ohne Kn. B&E.
- 3) *Maturana crinita*, vielleicht
 nur var. *var. cunecephala*. 22
 Blüten in Blüte, kleine Kn. bis
 ausgefallene Früchte. Die zahl-
 reichsten Früchte, 1/2 cm
 Durchmesser, sehr rötlich, oberhalb
 unterhalb Talca rot gerandet, *cunecephala*
 4) *Glyndora florosa*; nur bei
 ca 4000 m Höhe.

4357

Recuay, 22. VIII. 64 bei ca 3500-Xm

1) *Cylindropuntia exaltada*, kum bis Früchte2) * *floccosa*, nur überhalb3) *Napocana yungayana* in spärlich kum bis reife Fr.4) *Oreya bocheri* kleine Kirschen bis große noch unreife Früchte! F* *Oreya bocheri* x *Napocana yungayana* in Hybrid, Hybriden, nicht genötigt mit unreifen in Reife Früchte mit Blüte. Die Hälfte in Farbe Größe und Fugen genau die Mitte der Mutterarten. Blüte von

mit geringer Größe Fr. grün, platzt F. nicht auf, sondern die Samen

F. hat massig an der Größe von der Staphöhe

größer (ca 3750-Xm) noch größer, noch mit Fr. in Blüte ist, besonders 100-200m

Fr. auf Vorderen, hinten auf allen 4 Fr. auf Vorderen, hinten auf allen 4

Fr. auf Vorderen, hinten auf allen 4 Fr. auf Vorderen, hinten auf allen 4

sicher als der Paß; hier alle Pfl. gelb (ca. allg.)

4358

Von der Paßhöhe Forcalver ca 3950-Xm bis auf ca 3600-Xm in Forcalver sichtbar 23 VIII 641) *Cylindropuntia floccosa* - Hybrid auf der Paßhöhe; bis 3700-Xm mit sehr seltenen Exemplaren mit sehr neuen Wuchsen2) *Cylindropuntia* sp. laevigata (als) 4356 N. 1. Pfl. in Obertal bei 3700-3800-Xm3) *Cylindropuntia exaltada* gelb bis ca 3800-Xm hinauf4) *Oreya bocheri* bis ca 3750-Xm hinauf5) *Napocana yungayana* laevigata bis 3800-Xm in der Höhe6) *Ardisia* sp. laevigata (als) 4356 N. 1. Pfl. in Obertal bei 3700-3800-Xm

4359

Valle Fortalaza, mit Hiera
~~in Hiera~~ Lager, 23. VIII. 64.
 ca 2000-Xm.

- 1) *Cylindropuntia eschscholzi*
- 2) *Armatocereus chilobreghii*
 etwa wie die Rinschkele,
 Ku Bl. in unreife Früchte.
- 3) *Loxanthocereus sulcifer*
 selten Ku, Bl. oder Fr.
- 4) *Haageocereus fulvus*
 Ohne Ku Bl. Fr.
- 5) *Melocactus chichu* Ku Bl. Fr.
 oft mit der Jugendform
 ähnlich, die auch polio-
 stichien kann.
- 6) *Trichocereus pachanoi* mit
 var. *peruvianus*, ohne
 Ku Bl. Fr. - Iph. schlaf, meist
 am Felsen herabhängend.

4360

Chasquitambo, Valle Fortalaza
 ca 950-Xm. 24. VIII. 64.

- 1) *Armatocereus procereus* var.
 offener Ku Bl., unreife u. reife Fr.
 ↓
- 2) *Haageocereus multangularis*
 offener Ku Bl. und Fr. mit freien
 Stämmen, Blüten früh morgens
 in der Sonne noch offen,
 weiß bis blaugrün.
- 3) *Melocactus peruv?* stark-
 stachelig.
- 1a) unbekannt Hybrid
Armatocereus procereus x
Armatocereus chilobreghii
 Reife Früchte.

4361

15 km nördl. Chaucay
25. VIII. 64

- 1) ~~Laageocereus~~ ~~Laageocereus~~ n. u. Bei gut durchfeuchteten Boden und reichlich grüner Vegetation auf dem kahlen Landeinschnitt auf der Straße ohne Kaktus. Etwas östlicher, wo grüne Vegetation ist, einige Exemplare in reichlichem Kriechenbeginn. Blüten auf der Oberseite des Scheitels. Pflanzen wachsen waagrecht am Boden, ohne den Scheitel zu erheben.

Matucana 2380-X m.

2. VIII. 64

4362

- 1) Trichocereus pachangii von Felsen herabhängend. Ohne Kaktus Fr.
- 2) Leptocereus acanthurus ohne Kaktus Fr.
- 3) Mila cubana ohne Kaktus Fr.
- 4) Echidna n. u. unterhalb Matucana sign. Norden. Alte Fruchtstelle nicht wiedergefunden. Nur 1 Exemplar gefunden. 70 oder 100 Meter über dem Bach zu Felsenwand, nahe über isolierter Felsenkuppe, war in kleineren Knospen; diese schwarz.
- 5) Matucana haynei Blüten ohne Fruchtansatz. Ofters Blüten u. große Knospen.

4363 (Spezialf.)

San Mateo (oberh. Maturana)
bei ca 3200-Xm. 3. IX. 64.

- 1) *Cylindropuntia eschscholtzii*; gemein.
- 2) *Maturana haynei*, untere Lage wie bei Maturana, einspachlig, höhere Lagen wie Valle Fochalera, stark größer u. länger; Mittlere gelblich bis schwachrot. Alle Pflanzenteile u. hier gleiche Varietät, und Formwandel, fähigkeit nur gering vorhanden und sich beinahe überdeckend, daher als eine einzige Varietät zu nehmen, Lagen meist ausgefallen, aber mit viele reife und unreife Früchte, auch noch Blüten u. große bis kleine Knospen. Sonst nichts an Kakteen.

4364

Lautiaco (oberh. San Mateo)
bei ca 3800-Xm. 3. IX. 64

- 1) *Cylindropuntia* sp. wohl wie p. 4358 Nr. 2; selten.
- 2) *Maturana haynei* wie voriges, hat nur Morgensonne, Kn. Bl. u. unreife Früchte. Sonst nichts an Kakteen.

Oroya ca 3700-Xm. 4. IX. 64

- 1) *Cylindropuntia floccosa*; nur weilen Blüten!
- 2) *Oroya peruviana* Kn. u. Blüten u. sehr unreife Früchte.

ca 22 km unterh. Oroya ca 3580-Xm. 4. IX. 64. Weiße felsige Berge

- 1) *Cylindropuntia eschscholtzii*.
Sonst nichts.

Ebenda im Fleckfelsen.

- 1) *Oroya peruviana* Kn. Bl. u. sehr unreife Früchte.

4365

1 1/2 km über Pávo, (ca 30 km
über Huancayo). Kalksteinfelsen
am Wege. 5. IX. 64.

- 1) *Cylindropuntia floccosa*; langhaarig,
gelbstachelig.
- 2) *Oroya peruviana* var. th
goldgelb bis orangefarben
kurze Knospen

13 km über Pampas in Richtung
Colcabamba bei 3440-xm
5. IX. 64. FR 1301

- 1) *Erdissia* sp. Exemplar an Felsenwand
aufsteigend, ca 40-50 cm hoch
vom Grund steil auf ca 3 cm
4-9 Rippen, grasgrün, gerade
5-7 mm hoch, gebogen, dann etwas
mehr als 1/3 bis Breslen schwarz-
braun, 4 mm Ø, auf der Oberseite
der Höcker, unterhalb der Höcker
spitze in die Kerben gehend,
10-11 mm freie Entfernung.
In Knospen, diese meistlich bis
zum Scheitel, nur Stacheln mit
weißen Beeren; dunkelbraune
mit schwarzen Punkten. FR 4383.

4366

Hacienda Villa Azul un-
terhalb Colcabamba, ca. 2700
-xm. 6. IX. 64.

- 1) *Platyop* sp. wie *Markea* sp.
offers Ku-Beginn. FR 753
- 2) *Platyop* sp. ^{FR 151} kleiner als
vorige, halb niederliegend
Triebel spinn, schmaler
als vorige, eine Seite ge-
wölbt, eine flacher.
Triebel etwa 20-30 cm lang,
6-10 cm breit, 1-2 cm dick,
oben u. unten sehr seer-
schmalent Breslen 1-2 mm Ø
hellbraun 1 1/2-3 cm entfernt,
mit gelben Glöckchen u. kleiner
weißen 1-3 cm langen, mehr
unwärts als vorige u. br.
Ähnliche Stacheln. Durchmesser
Stacheln, 12 oder 14 mm. FR 4343
FR 4346
- 3) *Trichocereus* knospen
kurze Knospen. FR 4346
- 4) *Erdissia* sp. spinn 1 1/4-2 1/2
cm Ø, aufrecht, oft auch lie-
gend und Wände herabhängend
und wieder Wurzeln schlängelnd

4369

Villa Azul

4369 Villa Arul
Breiden weißfellig oder auch weißlich gefärbt,
später weißfellig in die
Korben gehend. (nicht bestimmt)
(Anfang weißfellig) oval 2-3 mm
lang, 2-5 mm flache Entfernung.
Spacheln: heller, kaum vergesselt.
Handtasche 6-14 reitwärts, meist
stark fächerförmig gekümmert.
nadelförmig, manchmal fast
pfriemlich (bleich ca 4-7 mm lang);
mittlere oft fehlend oder einzeln,
selten 2-3 zylindrisch und
nach oben stark gebogen,
namentlich am Ende spitz
pfriemlich, 1-3 mm nachwärts ge-
richtet.

Kleine Kuppen bis Plücken.

Blüten (6 Stück) geruchlos, in den warmen Tagesstunden offnend, ~~stark~~ schwach, 6-9 cm lang, 7-9 cm weite Blütenkrone, weiß ausgebreitet.

Erbe, 12-22 x 4-6 mm, wovon 1 1/2-6 mm auf den Kopf zu entfallen. Braun bis braunlichgrün. 1-2 mal dreieckig, dann bis abgerundeten, vierkantigen Schuppen von 1 1/2-2 mm Länge und weiß oder silberweissen, wolligen Haaren. N-K wenig weiß ohne Nektar und ohne Bräunung, der für die Wandlung

437

4370
 aufliegend oder mit sehr
 geringem Liebrang 11-20 mm
 lang 1 mm weit.

Röhre darüberstrichend 16-18
mm lang oben 10-15 mm weit,
spinnwebig außen wie Röhre,
oberen ~~Strich~~ ^{Strich} 12-10 mm
lang, ~~Strich~~ ^{Strich} übergehend
Schuppen grün bis bräunlichgrün
spitz, Röhre wollige weiße
bis schwarze Haare.

Stapel 5 cm unteres Drittel oder
Hälfte der Röhre grün, rest
hell ungrün.

Apfeln 10-15 mm lang, der Wand
anliegend, die oberes (unreife)
Frucht - Größe ca 1 cm. Beutel
fast kreisförmig, nierenförmig
1/2 - 3/4 mm Ø, weißlich-gelblich

Uffriffl Frucht den ausgebreiteten
od. glanzlos. Narbenstr. mit
grün d. Perikarp. Fruchtfarbe grün,
nach oben ^{grünlich} kornblattfarbe, 3 1/2
bis 4 1/4 cm lang, wovon 4-10
mm auf die gelbe bis rötliche
Narbenstrahlen ^{korngroße} mitteil. Teil d. Perikarp.
Kornbl. 3 1/2 - 4 cm x 6-9 mm, fast

linealinh unten schmal, oben
schmal, ganz begrenzt purpur,
(10) Lauffg. 5-7, kirschelb. Rand-
lich karminf. was zusammen
sch. Rubin f. ergibt, die außer
den schmalen mit grünen
Mittellinien
Die Flecken öffnen 2 Tage, wenn gelblich

4373 Valla AzulF (zu Platyop J. 4366) FR 151

Frucht 4 cm x 2 1/2 cm, rot
oben, am Stielchen unten
verändert nicht bräunlich,
schwarzbraun, rötlich
auch grün, großer Kiefer
Napf. Bröckel 2-3 mm Ø,
braunfärbig, mit gelben
Glockenblumen und
außer den untersten
Bröckeln mit mehreren weiß
lichen, gespreiteten Nadelstern
ca 1 cm langen Schachteln
Fleisch dunkelrot, saftig
kleinlich weiß. Fr. Wand und
Wand im Grunde gegen 100
x zu im Masse den Boden
schlecht bedeckt.)

weiße Nadelsternchen Übergänge
in Knochel. grünlich-braunlich weiß
gerändert, sehr schwach gerändert.

Wand purpur, nach unten reich
weiß, parallel als Bündel. Rüssel
hell zitronengelb-creme, rötliche
am Beginn der Krone, oberste etwas
dunkler, als in der oberen Krone.
Wand stark 1/2 mm lang, durch
ganzes Rohr spärlich auf Rinde
gelblichbraun, dicht diese Punkte
die höchststehenden.

4374

Griffel mit Mark zw. den
Obenteln [rotlich, oben
wovon 3 mm auf die 4 hellen
42 - geringsten Narbenlagen.
Krone, untere ausgebleicht,
oben aufrecht, linearlich,
20-23 x 4 mm, rötlich, wenig
orbitaler, oben gerundet mit
Kanten aufgesetzt, gestrichelt,
purpur, mit violettem
Rande. Hohe Pflanzung.

9) Cylindropuntia exaltada, selten
noch in dieser Höhe

10) Platyop kleine rundliche
drige, wenn stäbiger sind
die Glieder oft flach (Pflanz
müde) selten

F (zu Cleistoc J. 4368) mit dem Knick
der querschnittlichen Blüte. Jeder
Knick war meist geringer als bei
der Photocle. Blüte anders, die
von mekanotrans. Diese 4 mm
lang, oben 10 mm dick. 10 mm wie man
oben kaum fast bedeckt von dem
dickigen dreieckigen scharfen Ringe
zischen 2-3 mm langen Schuppel
Ekt. Wand Wand.
W-K fast linear, kaum über 3 mm
lang, 5 mm weit, mit rosa Boden,
auch blaß; oben klein Wand.

4377.

Südlich Villa Paul

auf der Ostseite der Mauer-
 schneidung von ca 1670-x
 zu (Schneidgrund) bis ca
 2470-x m. 7. IX. 67. FR 1322

- 1) Platycodon wie obere Mandarinal.
- 2) Platycodon wie P. 4366 Nr. 2. FR 1322
- 3) Platycodon ^{FR 1322} kleine runde
 glatte, glatte Glieder
 Stängelblätter dunkelgrün.
 Blätter nicht hoch hinauf.
- 4) Platycodon ähnlich Nr. 2
 aber Glieder runder und
 länger, oft ca 20-30 cm lang
 und 4-5 cm breit.
 wenn Blätter jung. Höhere
 Glieder kleiner. Blätter
 breiter als bei Nr. 2.
 Blätter sehr stockig.
 Blätter Pflanzen unter;
 Blätter von 2000-x m. ohne Kn.
 Aufrecht, ca 1/2-1 m hoch. FR 1322
- 5) Platycodon ovalifolia. St. hell
 gelb. von ca 2400-2800 m.
 Höhere Lagerung.
 FR 1322
- 4a) Wie Nr. 5, aber Glieder breiter u.
 dünner; gegen 2500 m. FR 1322 a

4378

6) Trichocereus wislizenii
 wie 4366 Nr. 3. Blüht bis
 ca 2000 m bisiale.

7) Trichocereus wie P. 4368
 Blüht bis ca 2000 m.
 Ohne Kn. Blüht.

8) Cleistoc. ^{abund.} micranthemum
 in weiten Bl. unregelmäßig,
 selten sehr dichte; bis
 ca 2400-x m hoch. Blühte
 geschlossen, mit viel herab-
 hängenden, kleinen Kränzen.
 Blühte nahe unten
 mit einem leichten Knick
 abwärts.

9) Eudoria wie P. 4366 Nr. 4.
 von ca 2300-x m bis 2850
 -x m. Oft von jungen sehr
 viel vorhanden. Meist herab-
 hängend an steilen Felsen
 Rippen 4-5. Oft in Gruppen,
 selten in Paaren. Ohne Kn.
 spärlich.

4349
10) ~~Moravitz~~ ~~g.~~ ~~op.~~ ~~voll~~
H347 Nr. 8 nahe dem
Schluchtgrund bei ca
1750-Km. Behaarung
meist rufarber als die
Lagen der Westseite der
Schlucht. Oberviel + Fr.

11) ~~ER 1312~~ ~~(Pseudotsuga)~~
~~ichthys~~ ~~ichthys~~ ~~ichthys~~ ~~ichthys~~ ~~ichthys~~
Vordach vor der Schlucht
ca 14-15 Rippen,
meist mit Mittelschalen,
Blüte purpurfarbig, selten
bis 6 cm lang,
zu 10-12 Blüthen.
An weingehüllten und selten
von etwa 2600-2850-Km
Bunde n. Blütefarbig wie die Blüte.
Frucht etwa 1/2 cm lang, nahe
1 cm dick, grün, öffnet sich
langsam, in der Mitte
Frucht runden stumpf, am oberen
Ende dünner aufgezogen.
Bedeckung wie Erbsen. Fleisch weiß,
etwas saftig, nicht reichlich.

4380
Von Tumpen geht eine Fahr-
straße direkt nach Osten, die dem
Mandargale sehr nahe kommt.
Man sollte von da zu der
Haupterschließung steigen, denn
es ist im Gebiete des
Bruckes der Mandaro nach Osten,
wo die hohen Berge mehr zu
erschweren sind daher
mehr Trockenheit zu erwarten
ist und höhere Lage, dann
kann vielleicht wegen durch-
bruch nach Ost durch eine
Georgkette.

Höhen über Tumpen bei ca
3800-Km am Weg nach Man-
hara. S. IX 64.

1) Drya peruv. var. oder womöglich
eigene Art. Färbung in den
goldgelb bis orange, aber beim
Licht noch bläulich-lila. Die
Blüte ist 31 mm lang, Kronenfarbe 10
bis 10,5 nach der Blüte in
goldgelb. 2) M. - ist halboffen,
die Blüte ist nur 10 mm
lang, die Blüte ist ca 1 mm
lang, die Blüte ist ca 1/3 mm
lang. 3) M. - ist halboffen,
die Blüte ist nur 10 mm
lang, die Blüte ist ca 1 mm
lang, die Blüte ist ca 1/3 mm
lang. 4) M. - ist halboffen,
die Blüte ist nur 10 mm
lang, die Blüte ist ca 1 mm
lang, die Blüte ist ca 1/3 mm
lang.

4383

Mantacra (untere Mezorada)
ca 2000-xm. 9.11.64.

- 1) Chlorocactus moranobianus
Kleine km bis unreife Fr. mit
gelben Lamm; selten reife Fr.
3-4 m hoch, ästig, etwas
graugrün. Endzweige
~~4-5 cm~~ 3 1/2-5 cm Ø mit
13-15 Rippen enge, gelblich
gelbe Transversalstreifen. Rippen
5-10 mm hoch, stark gekantet.
Achsel braunfärbig, bis fast schwarz.
filzig rund bis oval, 3-5 mm Ø,
im Jd. vorhergehend, die 1/3 bis 1/2
tiefer in die Rippen gehen, 5-15
mm breit und fernung.
St. hell bis braun bis grau,
Binde (6 Stück) seitlich, 6-8 cm
lang, gerundlos.
Bl. grün oder auch rot, 6-8 mm
lang, aber 8-10 mm breit, nach unten
wiegend, glänzend, fast völlig bedeckt
mit den dreckigen, hellbraunen bis
hellbraungrünen Schuppen. Die
man langen Schuppen in der Mitte
nur wenige bis 10 mm lang.
N-K zweifelhafte bis fast
3-4 mm lang, 4-6 mm weit, stark
schwarz bis schwarz, mit
dem dunklen Blau, stark schattig.

nach oben bis zum G. gehend, 38x
Diaphragma mit einigen Faser-
linien, darauf, eindeutig in dicker
Bl. Ring, stark schattig, Boden bläulich
grün bis gelblich.
Die Achse: dem Rücken Ende der
N-K. geringerer oder stark kantig
nach unten. Röhre ca 35-45 mm
lang, wobei die Oberseite ca 1-3 mm
länger ist als Unterseite, 4-5 mm weit
innen bläulich, außen bläulich bis
hell rotbraun, ganz leuchtend wie
gelb. Kammi, lichter bis auf das
Kronende ganz bläulich, in
Kronblätter. Nur wenige kleine
wohlhabenden Schuppen 4-5 mm lang, mit
Röhre etwas rötlich mit ca 20 kleinen
Blättern, weiche, dunkel bläulich
grünlich od. auch weiß. Blütel
kreuzförmig, meist vom halben Kelch bis
Ende der Kronbl. stehend, dicht
blissamen. Inset nach der man
ersten 5-10 mm und am Saume,
die verbleibende nicht
zu meist bis etwa 1/2 cm über-
steigt, manchmal auch das den
Befehl der Kerbe, ca 55-72 mm
lang, bläulich bis weißlich,
oben ca 3 mm auf die 7-11
etw. gerichtet, grüne, Karbenlagen.
Kronbl. aufrecht, die Kelchblätter
in die Schuppe, nach unten
hängen. Kronbl. hell purpur
bis fast weiß, lineal, 10-16x
3-4 mm, etw. spitz, Röhre wird
die äußeren, stark grünlich
Trocken, selbst bis weit gedreht.

4391 *Hantaea* (Feldher)
 Füllungsgut (nur die unterste
 die Hantaea von der Oberseite
 spitz zulaufend, oben
 gefeldert, Felder etwa 4-6 mm
 lang u. breit, etwas erhaben
 fast quadratisch, bedeckt von
 kleinen, rötlich-braunen Schuppen
 jeder Feld oben in einer Reihe
 stehend, Schuppen ca 5-6 mm
 lang, grünlich-braun bis
 rötlich, deutlich schwarz
 bewimpert. Wimpern rötlich
 ca 1 mm lang, aufsteigend. Schuppen
 3-4 mm bis ca 4-5 mm
 breit, Basis etwas verbreitert,
 oben sehr zugespitzt
 N.-K. außen nicht abgesetzt. Ob
 untere N.-K. und Röhre 16-18
 mm dick, N.-K. etwa halbiert,
 11-13 mm lang, 7-8 mm weit
 braun, glatt, oben nur durch
 die rötliche Hof. etw. gerötet,
 mit reichlich Nektar
 Röhre darüber fast halbiert, gut
 8-9 mm Ende ca 10-11 mm weit
 14-22 mm lang, innen weißlich,
 außen bedeckt mit den anliegenden
 Schuppen etwa von Aussehen derer
 darüber, aber nur ca unteren
 Drittel längs sich zu unbewimpert
 und ganz glatt, nur der
 obere fast schwarze schwach
 geränderte Teil entspricht der

4392
 Gruppe der Füllungsgüter
 viele im Blütenfoto
 Haut weiß oder gering grün
 fast die unteren, nicht re
 14-2 mm, obere ca 1 cm
 sehr zahlreich in Füllungsgüter
 Röhre sehr dicht, weißlich
 grünlich-creme, sehr reichlich,
 1 1/2 - 2 mm lang
 Gr. weiß, 40-43 mm lang, oben
 4-8 mm auf die ca 14 4-8 mm
 Augen rötlich, Narben lappig
 die können herabgesetzt sind, glatt
 den oberen Keimeln
 Krouble, innere 16-18 x 3-5 mm
 schmal, spitzlich, außen halbe
 Breite, nahe oben am breitesten
 kurz zugespitzt, weiß oder
 mit einem dunklen Hof. von 15-20
 Enden schwarzlich, dünn
 Wimpern ca 1 mm lang
 aufsteigend 18-22 x 4-5 mm, linea-
 risch, kurz zugespitzt, unten
 nicht weiß, nicht oben braun,
 Enden schwarz, u. schwarz
 bewimpert, äußerste Krücker
 u. breiter, schwächer u. in die
 Schuppen übergehend

4393

Mayoc und durchbrust
des Tanks nach Osten 12. IX 64

- 1) Platycodon FR 153,
- 2) Platycodon FR 151 stuckt Bl Dr
- 3) Cylindropuntia amirata; gemein.
- 4) Cylindropuntia coactada.
- 5) Cleistocactus mogavei? solide
rosa wie bei Manabaca.
- 6) Trichocereus trichocereus sp.
brunneus (?) sp. stark stark
als Trichocereus in dem Kübel Dr

- 7) Azoreococcus herlingi?
- 8) Coryphantha agavechensis
aufrecht 1-2 dm hoch, hell
grün große Büschel mit sehr
zweigen von unten bis
ganz hoch. Stiele 3-4
cm mit 5-6 sehr stark Rippen
gebogen, 1-2 dm hoch, hell
gelblich mit stark in die Körbe
gehend. Stiele weißlich,
rundlich. 5-8 cm mit 2-3 1/2
cm im Stiel. Stark hellgelb,

4394

mit glänzender Basis, randl.
nadelförmig, randl. ca 10 etc.
absteigend, stark, von ca
1-1 1/2 cm, mittlere stärker
nicht so auf gebogen ca 4-6,
stark, gerade, ca 1 1/2-4 cm.
Blätter oben seitlich bis Längs.
Knochenbeginn; sehr selten
reife Frucht, länglich, ca 3 1/2 cm
lang und dick, braun
mit roten, sehr scharfe
flache Blätter, verstreute
absteigende Früchte von 1 1/2-3 cm
Länge, schmal, dreieckig, neben
den Früchten einige wenige
gerade, aber dieser Teil nicht
abfallend, darüber abfallender
absteigend, rund, weißlich,
ca 2 cm, mit braunen, hell-
gelben, gerippten ca 6
absteigenden nadelartigen 1/2-3/4 cm
langen Nadelchen, ohne Nadelchen
außer dem Stiel. Blätter
stark, stark

mit Agave agavechensis bei 28 30
cm. Stark braun gelb u. sp. mit
6-7 Rippen, die ein Aussehen
haben, stark hell gelb u. stark
hellgelb, Rippen normal 5-6

#395 FR1302
 F(2a ardisia 4367) (Villa Haul)
 im Blütenboden geht von
 der Griffelbasis nach unten
 in die Kammernanlage
 Kammern ein von der brei-
 teten Seite, unten von der
 Breite der Kammern endend.
 N.-K. von der der Beschaffen-
 heit der N.-K. der ardisia,
 von Größe 4388, vergl. mit
 auf dem Gt. obliegend, white
 Nektar von der Basis der
 untersten Staub. gebildete Wang-
 ung aber diese Basen sind
 nur ca 1/4 mm eingesenkt
 über Rückengrund

$a = \frac{1}{4}$ mm ^{KL 18} ⁵ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶

Kronbl. d. l. karmine (8) ⁴³⁹⁶
 Laubz. ca 7 Dunkelst. ca 3;
 12-14 x 4-5 mm, flach, abger.
 oben gerundet od. etwas
 abgeflacht, bräunlich
 ausgebreitet. Mit einem
 ausgebreiteten als die innere
 Öffnung im Innern
 liegt wie bei l. karmine ~~4388~~
 (F. 4389/4388.)

Fr. (20.V.68 in G. G.) Lomx 1,6 cm, länglich
mit schwachen Sporen, blasse, weißlich, auf
ca. 10-15 Sporen. Von 4 Sporen, die typ.
hellgelb, die mit mehr roten, kleineren
wässrig, grünlich.

~~F(73) *Tachycheilus kneri* (Lacep. 4366)~~

10 Blüte fotograf. Eichen 54 Nr. 7.
Vom den 'Nadeln' nachts offnend,
parochial, erst bei starker
Anwesenheit mit Wohlgeruch
haupteigentlich abwärts gelb-
lich, blüht. Länge 17-18 cm
Dfn. ca 14 cm breit.

Eika guten, kugelig, 22 mm lang
Staubsaufreiß, geböckert, Höcker oben
mit brechenen grünen
Fahnen von 3-5 mm Länge,
Herz, braune Wollbüschel.
Blütenboden 3 mm dick

N-K. Weg mit Kefkap, oben gerollt
durch Kullgrens Spalt, 12m lang
unterhalb. Weiter als auf oberer Ende,
das mit der Hof nicht durchläßt, bläß.

4394

Röhre darüber brüchig,
infolge Krümmung flachherig
8 cm. Oberseite 9 cm. Aug. akti-
vorsteht, oben 3 cm. weit
innen hellgrün, außen grün
mit langen Töckern, Endteil
in grünem Reichtum 1/2 cm. (oben
bis 2 cm) langer Schuppen, dicke
schwarze Wollhaare.
Haupt. Blap grünlich, untere
4-7 cm. Oberseite (Saum) 5 cm.
Bentel cremelblich, linealisch,
3-5 mm x 1 mm flach. Inset
obere obere ca 3 cm.
Gr. mit Verb. 7 mm. Blatt. Bentel.
hängend, 14 1/2 cm. Blap. gelblich
vorher 18 mm. auf die Spitze
hellgrünlich 15-17. Narb. Leppen,
vorab. weiß, 7-7 1/2 x 2 1/2-3 cm.
Bentel spaltförmig, aber unten
1/3 Breite bei 2/3 Länge am
breitesten, aber gerundet, mit
aufgesetz. Spitzchen, außen
1 1/2-2 cm. mit linealisch, länger
gepfl., nach außen gebogen.
Farbe bläulich mit rotbraun, mit
Verg. im Kronen.)

4398

Oberhalb Syacuco

12. IX. 64.

- 1) Elatyop. op. FR 153.
- 2) Elyndrop. Amnicata, tieferer Lagen
- 3) Elyndrop. exaltada
- 4) Corryoc. ~~agacchoensis~~, selten
höhere Lagen.
- 5) Elyndrop. moravetziensis
höhere Lagen. Kronen rosa
- 6) Elyndrop. ~~agacchoensis~~
höhere Lagen.
- [7) Moravetzi. doct. v. Zunda,
mit v. Syacuco u. Zanta]
- 8) ~~Elyndrop. agacchoensis~~ ~~doct. v. Zunda~~
mit v. Syacuco u. Zanta. 8500 x m.
nicht selten. Vom Grunde
aufsteigend, 1 Blüte f. d. Bl. 54
Nr. 8. und 1. W. Bl. 1 Nr. 8.
Lage offener, Blätter auf
dem Stengel oder sehr weit, den
selben. nahe dem Scheitel, mit
blauem, angenehm duftend,
3 1/2 cm. lang. Es ist weit offen, und
die inneren Kronen, weit geöffnet.
Es ist ein Schuppen, rotbraun
mit v. Syacuco u. Zanta, 1/2 mm. lang, einige
weiße Wollhaare, darüber
Lilavio, rotbraun, Es ist in wachsenden
weißen, sehr klein, Form wie andere
von Villafra. N.-K. gelblich

4403

Valle Rio San Juan, unten
bei 2100-2200-Xm
13. IX 64

- 1) Platyon FR 153
- 2) Platyon FR 151 spärlich
- 3) *Erdia* n. wie vord. ges.
ohne Kn. Bl., spärlich
an Wänden

4) *Cleistoc. purpurea*
in Kn. & Bl.

5) ~~*Strobil. crassicaulis*~~
Kn-Region

6) *Azoreoc. ciliosus* grau
Trockenfr. ohne Kn. & Bl.

7) *Azoreoc. columnaris* FR 154
Einzel oder geringe in
Mittelpunkten 3-5 cm hoch,
ca 8-10 cm dick in Jugend
8-10 Rippen; im Alter
13-14 Rippen sehr stumpf
blaugrün im Alter grün. Wren-
den 12-18 mm hoch. Flecken
gewölbt, unten 8-10 mm dick, Rippen
um $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ eingekerbt; oft schwarz

Blitzgefurchen. Trennfurchen 4404
gefurcht, unten einz. *Strobil.*
hell bis grau, in d. Kerben gehend,
unten bis oval 4-13 mm
lang, 10-25 mm entfernt.
In Jugend braun, die Blätter sehr
hell, bläulich bis fast weiß, ab
dicke Muster.
Wächst am senkrechten Kalkstein-
wänden. Nur Trockenfrüchte ohne
Kn. & Blätter. *Strobil. crassicaulis*
8) *Strobil. crassicaulis*, selten.

7) *Strobil. crassicaulis* wenn mehr, das ge-
wöhnliche Fleisch weich wie bei
Kaktus, im Alter sehr leicht
ausfallend. Schuppen klein,
schwarz bewirbelt.

4405

Andahuaylas direkt oberhalb der Stadt an d. Straße nach Oberray. ca 3250-xm. 14. IX. 64.

- 1.) Cylindropuntia floccosa oft in Blüten! Mark gelb! Vollafruchtig gering.
- 2.) Lobivia westii wurde nicht aufgefunden, fehltezeit, länger im Ansehen.
- 3.) Drosera gibbosa in Kn. Bl. sauer, reifend, zuweilen auch reife Früchte! Bl.-Form wie peruvian, meist halbkuglig, groß, glänzend dunkelgrün gelblich. Körner ca 12 (jüngl.) bis 20 und meist 4, ca 10-13 mm hoch gewölbt, außen in enge gerillte Dreifurche, mit 1/3-2/3 tief gekerbt, mit Stacheln von Ende der Areolen in die Vertiefung. Rinnen oft in der Längsrichtung gebogen, dann verbogen, sehr stumpf, im Areolenzentrum flacher, hinter den Areolen kinnartig halb angesetzt, vorgezogen. Spitze meist 2-3 mm hinter dem Areolenzentrum. Areolen weißlich ca 4-7 x 2-3 mm meist etwas eingezinkt auf der Oberseite der Platte in Folge Kerben gehend, 10-15 mm entfernt.

4406

Wach dick nadelförmig gelb, rotbraun bis schwarz (Kanten) gerade stehend, dunkler gerippt, ca 14-18 cm lang, seitwärts 2-4 mm breit, bricht 1-1 1/2 cm, nachfolgend füllend oder 1-3 cm überlappend etwas starrer, kaum länger!

Wächst auch weiter südlich ca 80 km an der Straße von Oberray nach Andahuaylas bei ca 3600-xm. Blüte 2-2 1/2 cm lang, purpur, stark rufenblauer, hell als Wit von Paucop. Stk glänzend durch Wandstruktur, kein Diaphragma.

4407 Valle Pachachaca (purpurea)

2000-5 m 15.8.1947

1) Platycodon sp. FR 1397 starkhell

2) Platycodon sp. FR 1397 starkhell
niedrige halb hängende

Blüte 6 1/2 - 8 cm lang, 6 - 8

cm weit offen, Knochen gelb

Blüte gelb mit rotten Auflagen

Blüte gelb mit rotten Auflagen

Blüte gelb mit rotten Auflagen

Blüte gelb mit rotten Auflagen

Blüte gelb mit rotten Auflagen

Blüte gelb mit rotten Auflagen

Blüte gelb mit rotten Auflagen

Blüte gelb mit rotten Auflagen

Blüte gelb mit rotten Auflagen

Blüte gelb mit rotten Auflagen

3) Platycodon sp. kleine
rundgliedrige, ohne Kanten

4) Cylindropuntia sp. spärlich

5) Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

Weberbaueria sp. spärlich

4417
 1/4 cm hoch, weißlich,
 5 1/2 cm, wovon über 3 mm auf
 die 1. + 2. gener. gew. 8 Lappchen,
 Kriechblätter (11) Längig
 ca 4 x 3 mm mit gering
 ausgebeulter Längs- und Querschnitt
 von etwa 6 mm Weite; die
 äußeren sind zurückge-
 beugen und klobig. Die
 Längs- und Querschnitt
 linear, oben gerundet
 zugespitzt.)

T Blühte in Cajon Gr. 2 Exemplare.
 Die Blüten öffneten morgens
 nach kurzer Blühdauer, blühen
 nachmittags, öffnen sich
 einmal tags (dann).

F (zu 4415) Hof. de Baumkatzentanz
 nach unten, palisadenartig dicht
 und zu einer Haut verschoben,
 gering nach innen geneigt, nach
 den Enden frei und goldgelb, diese
 Haut oder Lamelle läßt sich hängen-
 artig an der oberen v. abheben, gedon-
 sind also nur die angewachsenen
 als schließende Haut der Lamm-
 gegen sich selbst. (Vergleichung nach
 Lamm, die Nadeln der Lamm) innen,
 aber die Nadeln sind wie bei
 Kob. nympha (34, 1964) nur
 mit der Spitze nicht hervorst. weil die
 St. nicht stehen, die Nadeln. Die der
 Lamm aufsteigend, die Nadeln nicht
 über den Lamm hinaus.)

4418
 Woffig nach Lucanas von
 Eugenio aus, 17. IX. 64.

- 1) Cylindropuntia
- 2) " strepens, gelblich, haarig,
mächtig
- 3) Cylindropuntia, 7. weichen
Knoten

- 4) Trichocereus, verbreiteter (FR 1558)
 dick 8-Rippen, oberste 7
 4419
 5) Trichocereus quadrangulatus
 mit 8 R. Beginn, selten Bl.
 zuweilen rüpe und über-
 rüpe und verbleibende 8,
 Rippen 4-5 zuweilen 6. F (unter)
 7. (siehe 4420)
 6) Lobelia, Agelera, FR 145
 In gelb bis braun, nur 1 klein
 Knospe gesehen. T

F Frucht bleibend grün kuglig,
 2-3 1/2 cm lang, 3-3 1/2 cm
 oberer Prolester hell mit ver-
 nachlassender Schuppe, meist
 harter oberer Teil abfällig rund
 schwarz ohne Haare, oberer
 schwarzer glänzender Teil von
 weißer mit bis 1 cm, 2 mm Ø,

4479 Lucanas
meist $\frac{1}{2}$ - 1 cm entfernt, >>

Fkn Linspor. vorige S.)

50 Blüthen morgens früh noch offen,
stark aufged. zeitlich blüht
zum Scheitern, an der Sonnenseite
14-16 cm lang, etwa 8-10 cm weit
offen wobei die unteren Kronblätter
schon ausgebreitet sind als die oberen.
Blüte im Bereiche der N-K etwas
nach oben gebogen, Öffnungswand
rund, indem Unterteile der Blüte
etw. weicher zusammengeklappt als Oberseite
und untere Kronbl. etw. ausgebreitet.

Fkn. 17-21 mm lang, 21-22 mm dick
höckerig, flach in der Mitte grüne
3-6 mm lange fleischige Schuppen
ausstehend, nicht schwarz, oder
fast schwarze Wollhaare.

N-K tubisch, sehr eng, mit wenig
Nektar, in ganzer Länge gleichweit
mit ca $\frac{1}{2}$ mm Spitzraum v. u. u. u.

22-25 mm lang, Blat. gefaltet,
durchs. durch Haut,
Röhre darüber schnell fröhlich.

55-58 mm lang oben u. unten
etw. gleichlang, oben 2-2 $\frac{1}{2}$ cm
weit, innen fleischig, tiefen grün
wie Fkn, Wollhaare gleichartig
Schuppen übero, nur größer oben
bis 2 cm lang aufliegend. Über-
gänge in Kronbl. in Mitte grün
hard d. Rändern rotbraun

4480
Haut, Blat. gelb, nach unten bläulich
untere 6-7 cm, oberste 3-3 $\frac{1}{2}$
cm. Beutel bräunlich, seine
ca 3 mm lang, Länge 2 $\frac{1}{2}$ -3 cm.
Im spitzen Nektar zw. den un-
teren Beuteln; diese halb aus-
gebreitet, meist bräunlich 8 $\frac{1}{2}$ -10
cm lang, wovon 15-20 mm
auf die kleineren 17-20
Nektarlappen.

Kronbl. weiß, 48-62 x 22-30 mm,
stark gebogen, unter ca $\frac{1}{3}$ Breite,
bei $\frac{2}{3}$ - $\frac{3}{4}$ Länge am Nektar
oben gerundet, mit aufgesetzter
Spitze (außer den äußeren)
als erste linealiter, grün,
schmal, mäßig verzweigt
oft etwas rotbraun.

4481 Lucanas
(Zu Lucanas S. 4478) quadrangularis
2 Blüthen einer Pflanze, etwas
aufent. tags offener, abends
schließend, Zeit bis oben
weit ausgebreitet, ausgebreitet 4 cm
lang, 5-5 $\frac{1}{2}$ cm weit.

Fkn. grün 20-22 mm lang,
13 mm dick, oberes Ende 10 mm
Boden der N-K 6-7 mm dick, da Fkn
auf mehrere mm mit R. vermischt
Fkn d. R. nach unten bis in die Mitte
der Linsung anlagen ist goldgelb, nach
unten in bläuliche Blüthen
grün, stark erhöht von Valla
N-K ist so gebildet wie der

#421 Lecanias
 sehr schön über die Wege Panza-
 Jachabamba. M-K. noch kriechen-
 d. nicht sehr selbständig
 eng, aber mit Nektar, Basis
 des junger Haupt. Blüten eine
 Wall. Ring. M-K. ca 1 mm hoch
 Blap. die Blätter der gelbe Kanten
 auf die Kanten. - daher
 gehen junger Kanten. Färbung
 von halb so tief als die Tiefe
 der M-K. ist.

Röhre kriechend 10-12 mm lang,
 oben ca 1 1/2 cm weit, innen
 orange bis purpur, außen orange
 mit glatten langen Haaren. In
 der obersten obersten obersten
 gelblich orangefarbene dreieckige
 von voll gelb ca 5/6 abwärts
 graue Wollhaare sind oben
 einige schwarze verbogene Dornen
 über. in Kanten. grün mit gelb
 oder purpur. sehr leicht
 leicht und stumpf.

Erkranke grün mit dicken
 grünen, dreieckigen, gelb gelbte
 von 2-3 mm langen dicken
 grauen Wollhaaren mit
 wachsenden hellen Markelchen.

Blüte. Kriechend (6) bis Zierker (4)
 unterste (um 1/2) 7 mm die oberste
 3-5 mm oberste 7-10 mm
 Zierker (um 1/2) 1/2-3/4 mm. A. cremel
 Inset dick gelb. Zierker nach unten
 von Kanten. Farbe 2 mm
 freier Teil 18 mm, wovon

#422
 ca 4 mm auf die Blätter
 etw. gepresst 10-13 Lappen
 nicht hervorragend, nur d. Blätter
Kronbl., weit ausgebr., radförmig
 linear, seidenartig, 18-20 x 5-7 mm Basis
 unregelmäßig, oben sehr stumpf
 mit Kerbe in Mitte. Farbe
 dunkelgold (3) Lapp. 5-6
 Dunkelstufe ca 1 Stunde
 nach Kanten. Basis (auch
 bei gelben Blüten) purpur.

4427

Nördl. Chala Vieja an Straße,
Übergang der Vegetationszone in die
Wüste 20. IX 64

- 1) Lumulo mit wohl ger. Linsen.
~~(Blattstängel)~~ (Blattstängel)
geweckten Blau. Frucht.
Blüte (Hohl) geruchlos, $3\frac{1}{2}$ cm lang,
über 4 cm weit offen.
Frucht grün nur 6 mm lang, im
Boden der Pflanze. K. 17 mm
dick, oberer Teil über $\frac{2}{3}$ ist
braunf. mit 2 mm und
oben etwas weißer.
Häutchen hellbraun, glänzend,
oberer Teil mit kleineren
gerundeten Schuppen von rötlich
gelb, unterer Teil des eigentlichen
Fruchtkörpers.
Blatt mit kleinen, fächerförmig
2 mm lang, $\frac{1}{2}$ mm weit am Gr.
gelblich.
Blüte fächerförmig, 9 mm lang oben
14 mm weit, innen blaf, außen
gelblich.
Blatt orangegelb, ziemlich blaf,
unterer Teil 3 mm, oberer 8 mm
4 mm, nach 5 mm am Ende
4 mm, Basis 2 mm, über 3 mm
Gr. 23 mm lang, wobei 4 mm auf
die 25-gliedrige, orangegelbe 10 Lappige
Krone, goldgelb, Lappig 6-6 $\frac{1}{2}$ mm breit ist.
Die äußere Seite etwas kleeblattförmig

4428

nach oben; Kronen 24 x 6 - 7 mm
spatelförmig, stehen nur wenig
hervor, aber, bei ca. $\frac{3}{4}$ Länge
am Ende des Stängels
mit 10-12 Kelchbl.
Blüte grün, oval, Pollenschlauch
durch Blüte orangefarbig,
Pollenbeutel rotbraun, $2\frac{1}{2}$ -3
cm, Blatt 2-2 $\frac{1}{4}$ cm lang,
mit ganzem sehr tiefen Kopf.
Bedeckung wie Fruchtblatt.
Kammern klein, kegelförmig, ohne Laft.
Lauren mit offenem schwarzen
braunem Mabel.

- 2) Kageozer der Kulturen und
aufeinander auch chalaian

4429

Von Chala bis nördl. Camaná
Alles ohne Kn. Bl. Fr.

Camaná 21. IX 64

- 1.) Haageocere. derumbens chuckkelt
- 2.) " chalaensis ohne Kn. Bl. Fr.
- 3.) Locanthoser. camanensis wurde entlang Straße vom Fundplatz der Salina brevicylindrica bis ins hohe Kaktusgebiet nicht wieder gefunden.
1969 in hohen Lagen 20. mit Euphorbia. gefund.
- 4.) Euphorbia. blaus. sehr reichlich kleine Knospen
- 5.) Salaya brevicylindrica ohne Kn. Bl. Fr.
- 6.) Salaya divaricatiflora, oft als Kn., selten Frucht.

4430

Südlich über 21. IX 64

- 1.) Corygocactus brachycephalus, nur selten Kn., selbst Frucht
N-K. frischer, mehrere ganz lang geschlossen, aber Knospen
Keine Ausbildung der Bl. Fr.
- 2.) Moraimondia orequipa? ohne Kn. Bl. Fr.
- 3.) Trichoser. glaucus, die meisten Triebe vertrocknet, nur wenige Kn.-Beginne.
- 4.) Weberbauerocereus cybaloma-rostribas. Kn.-Beginne
- 5.) Haageocere. chalaensis chuckkelt
- 6.) Locanthoser? setosissimus Kn.-Beginne
- 7.) Salaya islayensis var. minor
Fr. Kn. Bl. in runderen Fr. Camaná
keine Fr. Blüte nicht
Pach 54 Nr 29+30.

4431 (ca 7-8 km südlich Chañaral)
Baralosa Bargino (Küste)
 30. IX 64 Dürrejahr

1) *Eulychnia longipinna* var.
 ohne Kn Bl Fr.

2) *Copiapoa cinerascens*
 ohne Kn Bl Fr.

3) *Roderiaxiphila* ~~la~~ *megacarpa*
 abgrenzende bis große Knospen
 + Blüten (in gutt. Komposition)
 selten verblühte Blüte.

Blüte fast gr. 30. IX 64 Nach 54 Nr 31/32.
 geruchlos, Kelch offen, nachschles-
 send, ihm der Scheitel 30 mm
 lang & 1 1/2-2 cm weit offen, bei
 nahen parallelen Kronblättern.
Fr. grüngrün mit dicht steken-
 den, sehr schmal dreieckigen,
 hell grüngrünen Schuppen von
 3-4 mm Länge u. dicken weißen
 Wollflocken. Grün lang oben
 9 mm breit, etwa halbkuglig.
U.-K. etwa rubinrosa, tubus-
 bis trichterig 2 1/2 mm lang u.
 breit, mit Kelch fast offen.

Röhre trichterig, Stumm lang, oba
 ca 10 mm weit innen etwa
 rubinrosa, aufa grünlichrotbraun,
 mit spiral. dreieckigen, ca 5 mm
 lang, bräunlichen Schuppen,
 dicken weißen Wollflocken und

4432

4) *Milaorebutia malleolata*
 var. *solitaria* ohne Kn Bl Fr.

Fr. steifen, aufrechten, geraden
 orangegelben Stielen.

Blüte etwa rubinrosa 7-9 mm
 die Längsachse oben, Dientel hell
 gelblich, 3/4 mm lang, Dientel
 bis 2 mm unterhalb Längs.

Fr. mit etw. überrag. Narben
 19 mm lang, wovon ca 6 mm
 auf die gelblichen etw. ge-
 spalteten ca 15 Narbenlappen.

Kronbl. etwa rubinrosa
 ca 15 x 3-4 mm, unter
 schmalen, oben fingerförmig
 purpurn, fast glb bis 3
 Ränder bräunlichgelb.

4433 ca 8 km nördl. Flamenca
ca 2,5 km südlich Chanaral
wo Schlucht einmündet südlich
lines Bergvorsprunges 30. IX 64.

- 1) *Cumulop. beckeri*, nur unten.
- 2) *Eulychnia* ~~*longipinna*~~ ^{*breviflora*} ohne Blü.
- 3) ^{FR 1316} *Lepidopora* sp. ~~*caederata*~~ ^{*var. pinnoceros*} ~~*caederata*~~ ^{*var. pinnoceros*}
in cinerascens; einzeln oder
wenig zusammen, bis 10-11 cm Ø
des Scheitels bis oben auf Länge
erreichend u. dann fast bis zum
etw. hellgrüngrün, dicke Rippe
mit rötlichem Glanz. Rippen
meist 11-13 ~~11-14~~ ¹¹⁻¹⁴ bis 16, selten 9 der Blühbarkeit.
selten ~~Blü~~ verblühte Blüte hellgelb;
selten innerer Frucht. bläulich,
unten und oben.
- 4) *Eulychnia* ^{*pubellus*} ~~*longipinna*~~ ^{*pubellus*}
auf halber Höhe, da immer
selbstschneid. spärlich. selten
km. - Segm. Rippen ca 12-13.

5) *Chilcorebutia* ^{*longirapa*} ~~*longirapa*~~ FR 1321, 4434
Einzeln Größe wie *malleolata*,
Kormische Reihe von ca 18-27 cm
Länge. Ohne Kulz Dr. Nabege den-
gehtet durch Isel oder Fiegen.
Man findet fast nur Leichreste.
Frucht u. Pflanzest mit reichlicher
weißer Woll, und absteigenden
feinen rötlichgelben wischen Rostern.
Auf der Sohle des Talgrundes im
Land ~~in der Höhe~~ ^{in der Höhe} ca 30 bis 40 m
von der Straße landeinwärts.

ca 8 km weiter südlich; Flamenca
Küstenvorland.

Nichts an Kakteen; zu trocken.

ca 10 und 20 km südlich von Flamenca
Küstenvorland an Straße

- 1) *Eulychnia longipinna* var.
Nicht richtig, wohl wegen
starker Landverwehungen.

4435

28 km süd. Flamenaco,

Reguapung an Kiboto.

30. IX. 64.

- 1) *Lepiostachya lankei* (f.) *calderana*
 Stämmchen sehr hoch, gabel-
 förmig bis über 1/2 m lang,
 mit 10-14 geraden stark
 gegliederten Rippen.
 Blüthenstände korymböse
 Ähre mit verengtem
 Hals, zuweilen Bl. oder
 unreif Frucht.

Tallera 2. X. 64.

1) *Chilomenis durigulpa*.

Von 9 gefundenen Exemplaren
 hatte nur eins eine kleine
 Knospe. Reguapung Jahr

4436

Trapipe 3. X. 64

Reguapung Jahr

- 1) *Lamulop. berteri* Kn Bl Fr
- 2) *Cylindrop. miquelii*, öfters
 Kn u. mit Kn, unreife oder
 reife Fr, selten Blüte.
- 3) *Tyrchoch. peregrinus*; typisch.
 Ohne Kn Bl Fr.
- 4) *Eulophia acida*; öfters Kn
- 5) *Lepiostachya pseudosalsburgiana*
 Kn Bl, unreife Fr. Starke Blüte
 bis spät im Leben.
- 6) *Tyrchoch. zinglans*; viele
 Blüthenstände, zuweilen
 unreife Fr. oft Knospen,
 zuweilen Blüte!
- 7) *Tyrchoch. fuscus* v. *trapipe*?
 zuweilen Knospenbeginn.

4437

Cerro de Cuesta de
Sanos Aires. 3. X. 64

- 1) *Cumulop. berteri*
- 2) *Phylidrop. miquelii*
- 3) *Trichoc. streptanthus*
typisch.
- 4) *Trichoc. spirulicarpus*
typisch, weniger häufig.
X Foto von zusammen-
wachsenden Nr 3 und 4
sollte gemacht werden.
- 5) *Eulophia longispina*,
gemein.

30 km nördl. La Cerna, El Burro P. El Soldado.
3. X. 64.

- 1) *Neoportia wagenknechtii*, nur
durch wenige Früchte!
Frucht dunkelgrün bedeckt wie Ficus.

4438

5 1/2 km nördl. Puente Limari,
kleine Schlucht, die nach
San Jorge führt; schluchthal
wärts:

- 1) *Cumulop. berteri*
- 2) *Eulophia acida*
- 3) *Trichoc. skotsbergii*,
sehr häufig; K + Bl.
- 4) *Trichoc. nigricans* var.
rötlichen Knospen; häufig.
- 5) *Eriopyge ipohyanae*.
Kn. Beginn zu sehen
wie sonst.

4439

Kristenwucherung nördlich
von Los Vilos 5. X. 64

- 1) *Eulychnia cavanagii* Kunt + Bth
häufig
- 2) *Trichocereus litorealis* wie
Los Vilos Kn Bth, verblüht Bth.
häufig
- 3) *Neororteria* ~~mit gelben~~ *litorealis*
~~Var. *schottlandensis* (Benth.)~~ Blüten
27-45 mm lang; massenhaft
offen. Knospen bis reife Früchte.
4) *Echinocactus* ~~*schottlandensis*~~ *var.*
typicus Bth weiß ~~unkult.~~
Knochenhülle. Nur auf
der Ebene der Höhe.

4440

Naturhalle Lagos, Dep. Tarija,
30. X. 64.

Christyella ~~*Reiter*~~

FR 756 *Rebutia* ~~*Reiter*~~ *Rebutia*
Lagoa, gataja Grande, Blüte:
geruchlos, nur Knospen offnend.
Auf an der Pflanze sitzen
Knospen entgegend, auch eine fast
offnend. Der widerstandsbrechende
Kn 3/4 cm weit abflachend, etwas
nach aufwärts gebogen (wie
im Foto).
Knochen. Innere prägenet (5) Lähne
5 bis 7. Innere etwa 10, äußere
hellgrün (10-10 1/2) außen Lähne
ca 2. Innere wie in der Kn.
Bl. etwas geruchlos mit purpurnen
Knochen. ca 45 x 4-5 mm. Hohl-
förmig oben stumpf mit
langgestrecktem Knospen.
Frucht. ca 4 x 4 mm rötlich braun,
oben rötliche dreieckige Schuppe.
Länge 1/3 mm Länge der rötlichen weißen
Knospen verbogene, darüber rötliche
und oben mit Nadeln ver-
wachsen 2 1/2 mm dick.
Darüber 11-K. Knospenformig
weiß, geruchlos 1 mm lang mit rötlichen
Darüber rötliche Knospen 9 mm lang
oben 6 mm weit, in der Mitte
oben rötliche, wenige Schuppe.

4441

nach oben länger, weiße Blättchen, wenige weiße Dornen.
 Hauptblattzell 5-7 mm, Bockel
 rund, gelb. Grünfarn! dichter
 Ring um Ausgang N-K, nach oben
 niedrigspitzlich bis bogenförmig.
 keine Lücke.
 Lf. etwa schwefelgelb, Längl. 3-4
 cm, 14 mm, wobei 3 mm lang
 die obersten 1/2 bis 1/3 gelblich
 (Längl. 4) rügenspitzlich &
 nach oben.

4442

Arail do Cabo 2./3. Nov. 1964

- 1) *Platygon vulgense* auf dem
 Gelbfeld, der großen Palmrik;
 in Blüte.
- 2) *Brazilia brasiliensis* von
 Km. bis tiefen Frucht
- 3) *Ptychosiphis grandiflora*
~~als~~ nicht
 mit Sicherheit festgestellt.
- 4) *Lepism cruciformis* stark
 verästelt.
- 5) *Mediocractus coccineus* cf.
 eigentlich kleiner Km. bis
 sehr unreife Fr. Früchte mit
 warzenförmigen Spacheln; Fr.
 stark verästelt.
- 6) *Piptanthus* abnorm
 sehr reife Fr. oder offene
 v. verästelte Blätter!
- 7) *Piptocereus arabisiae* mitten
 in Fruchtzeit; offene Km.
 oder Blätter. Blätter noch
 einige Stunden bei Stellen
 offen.

4443

- 8) *Pilozocarpus* sp. K. bis reife Früchte. Blüthenmorgens bereits viele noch einige Stunden off.
- 9) *Glocephalum humigenum* ohne K. in Blüthen. In Frucht reife. Zuweilen reife Frucht oft unreife. Kann etwa bis Ende Sept. oder höchstens bis Mitte Oktober Blüthen gehabt haben. D. h. nur selten eine Frucht ausgewachsen war. Kann es wohl vor August keine Blüthen gegeben haben.

- 10) *Melocactus* sp. ist bekannt als "Caborade freire", soll nur in den "Ebenen" wachsen, nicht auf den Bergen. Etwas südlich wohl im Gebiet der großen Tabrik.

Montes Claros, 5. Nov. 1964

4444

- 1) *Medioractis* sp. Nur die beiden größten Pflanzen mit bereits sehr dickem Trieb und ungenutzten Grasse. Die bereits von Vögeln völlig angeknabbert waren. Fr. 8-9 cm lang 6 cm dick. unten stumpf, oben zugespitzt auf ca. $2\frac{1}{2}$ cm dicke Wandung 1-1 $\frac{1}{2}$ cm dick, nicht hyaline Fr. außen mit starken Höckern und die Oberseite mit gerundeten Breiten. Die obersten bis 1 cm lang. Schuppe. Breiten 3-5 mm D. und sehr weichen. Felt mit stehenden nadelartigen braunweißen 1/2 cm langen ca 8-12 Stacheln. Fleisch weiß, saftig. Höhe ca 1/2 cm hoch.
- 2) *Ptilipodis* sp. scheint *carantha* zu sein, auf einem hohen Baum, unerschütterbar. (Siehe Karte 4495)
- 3) *Pleurostylis* sp. Fr. 1035, reifet unreife Fr. Blüten u. grüne Knospen. 1 Blüte folgt 13.1.64, blüht nachts, geruchlos ca 3 cm lang u. weit. Fremden

4449
Moritz Ayal (Tort.)

Kraule 14-17 mm lang, 8-9 mm
 breit, rundförmig, fingerförmig, Basis
 etwas hervorstehend, bei weitem
 etwas Länge am breitesten; Innere
 weiß oder gering rötlich angelaucht,
 Mittelkreis grünlich, auf der
 mehr grünlich mit fast weißen
 Rändern in rotbraunen Spitzen.

2) Peireskia sp. in nachblühende
 mit karminen Blüten. Aylere
 Bonen FR 1251 in Kn. u. Blüten.

3) Piptanthus ? janacorn, Knospe

4) Brasilicereus sp. ohne Kn. Bl. Fr.
 Rippen 9-12.

5) Grusidia rhodantha var. minima
 in Knospe, Knospe ohne Knospe, Knospe
 Blüte fächerförmig am S. X 64 Film 55 Nr 29
Blüte öffnet morgens mit dem hellen
 werden und schließt vor Sonnen-
 untergang, erscheint nach Tag zu öffnen.
Blüte i. ger. Bl. 40 mm lang.

Blüte 5 mm lang, 5 mm breit, rot =
 oben am breitesten, unten gerundet.
 Bonen N. - K. 1 mm dick im Durchmesser
 Bonen leicht zu zerbrechen, außen F.

4450

6) Platyop in Ampere, offener Frucht,
 alten Blüte, FR 1252.

7) Silvocranus splendidus ohne Kn. Bl. Fr.

8) Silvocranus oceros ohne Kn. Bl. Fr.

Mimantia (unpubliziert)

9) Platyop sp. FR 1274. Knospe
 mittl. Knospe, große Kn. Blüte, un-
 reife Fr., reife Fr. u. aufplatzt Frucht
 fächerförmig, aber ohne den Kern in Samen.
Frucht 2 1/2 - 3 cm lang, 3 - 3 1/2 cm dick
 nahe oben am breitesten, Basis
 kurz fingerförmig, fällt bei der Reife
 nicht ab, platzt oft mit einigen
 großen Lappen auf, die auf 4-5 cm
 in ihrer Länge auseinandergehen
 derart den Inhalt der Vagel präsentieren.
 Fr. nach unten platzt, nach oben zu
 wächst dunkelgrün, zuletzt rötlich,
 Fleisch saftig, weiß, keine Hyaline.
 Fr. glatt, glänzend, mit wenigen
 Wirteln, schwach dreieckig, hellen
 Schuppen. Boden der Vagel ist
 durch Wandung nach oben hin 4-5 mm
 dick, Wandung an Fruchtbasis etwa
 halbe Dicke des Bodens.
Blüte fächerförmig (Film 55 Nr 27/28)
Blüte lebend öffnet, mit

4451

Norke (Forts.)

Hellwerden nallispind, $5\frac{1}{2}$ cm lang, Kroudh ausgebleicht.
Erknt 11 mm lang, oben 13 mm breit, nach unten spitz, 7. mm gekielt kegelförmig, im Bereiche des Blühstems, leuchtend an der Basis. Erknt sehr bläulichgrün, glänzend, sehr wenige winzige, nural dreieckige weißliche Schuppchen.
N.-K. 6 mm lang, 10 mm weit, innen gerieft, weißlich. Nekt. spärlich, am ober. Ende etwas eng, durch Wandverdickung, geschlossen durch weißes Saftpfadgema. Lichtstauden durch Verwachsen der Rassen der inneren Staubfäden, schräg nach oben gehend in in Hof-Ring angelenkt.

Röhre etwa kubisch 22 mm lang, 14 mm weit, innen weiß, außen blaß grünlich, glänzend, Schuppen nach oben an Spitze konisch, bis auf ca 10 mm in Länge u. 8 mm Breite, nach oben blaß gerundet, spindelförmig, oben abgerundet.
Staubf. weiß, die unteren ca 12 mm lang, darüber auf ca 6 mm Hof mit Wandung verwachsen, dann Hof von ca 12 mm nach oben aufsteigend abnehmend, die Dichte zunehmend, also außer unterem Brinze der Wand anliegend,

4452

Nie über den Staubblätter am Stamme 3-4 mm lang, darunter sind die Beutel auf ca 5 mm Rohrlänge ohne Fäden direkt der Wand anliegend, Beutel cremefarben, oval.

Ute sehr bläulich mit gleichfarb. Warben, ca $3\frac{1}{2}$ mm lang, 8-10 mm breit, auf die 45-60° geneigten, ca 11 Narkotischen.

Kroudblätter, innere weiß, 13-15 x 7-8 mm, nahe unter der Basis am breitesten, oben kurz zugespitzt oder gerundet, mittlere ca $1\frac{1}{2}$ x 2 mm, mit 1/2 mm Mittelrippe und Enden an der Basis stärker rot.
Rippen bis ca 32. (je nach Breite)

Frau (Hagadax 4449)

N.-K. 9 mm lang, 4-5 mm weit, innen weiß, außen weiß, oben gelblich, geringe gestrichelte konische, fast abgerundete durch Kroudh, die an ihrer Basis in einer Röhre von 10 mm sind, außen schuppiglos.
Röhre darüber fast kubisch, geringe, 3 mm breit, fast 5 mm weit, innen blaß, außen weiß, hell gelblich, oder rot, nur obere Röhre mit Schuppen, die unteren winzig, nach oben größer werdend, vom Stamme ab, sondern flachen Kroudblätter

Monte Zed (Fort) 4453

aber bräunlich u. schmal, anliegend,
Farbe wie Rote, in Krenell. übergehend.
Blaufl. weiß, ohne Lücke 7-8 mm, in
die rufen ca 12 mm, nach oben
kurzer, die, stehen ca 6 mm
Bündel goldgelb, oval, ca 2 mm lang
by weiß, mit den Härn an ihnen
ant. d. Bunde in 28 mm lang,
wovon 3 mm auf die 9 sehr bläß
gelben, halb geradlos, Verhakenlappen.
Krautblätter von innen nach
außen an Länge zunehmend,
die äußeren beinahe flach, auf-
recht, ca 7 mm x 2 1/2 mm, oben
haben ungerippt; die inneren
ca 4 mm lang, 3 mm breit, dünn,
sinnig, die inneren ebenfalls,
die, die, von allen etwas abfällig,
alle purpurrot u. mit rötlich
purpurrotem schmalen Rande.))

10) Leucosia Bakeri F.R. 1231.
Zuweilen reife oder unreife Pr.
oder beginnende bis mittelgroße
Knospen.
Frucht, wenn ausgerippt rubinrot,
mit feinstöckiger Oberfläche
1 1/2 - 2 1/2 cm lang, 1/2 cm dick,
ruhen dünn, oben auf 1 oder
mehrere Knospen verläuft, auf
ca 1/2 cm dicke mit Längsfalten
die schmalen Schlitzen
F (daher nach 10-12 mm)

4454
Frucht u. abfällig, die
braunen, ca 1 mm, 8-10 mm,
mit vielen schwarzen bis bläß-
gelben kaum spitzend.
weiche, feine 3-5 mm lange
absteigenden Thallus, selten
nicht bei Reife ab. Fleisch
purpurrot, sehr, Bitterkeit aufsteigend
Bitterkeit 2-3 mm dick.

11) Cereus F.R. 1232
Seltener mit reifen Früchten. Diese
kannst du den Teller ringen
2 Pflanzen hatten neben einigen
reifen Früchten zahlreiche be-
stehende rote Blüthenknospen.
Tausend gemacht war bei.
Frucht eine, Beere, etwa kuglig,
5-12 mm lang, 7-10 mm dick,
zunächst mit unregelmäßigen
dicken Wülsten, besonders oben
die sich bei der Fruchtvergrößerung
beim Reifen auflösen,
mit Ausnahme von kleinen
überbleibseln zum Thallus.
Durch oben dünn, die Wand
grünlich, etwas rötlich, in der Mitte
der H-K, weit nach unten
ruhen, halt den weichen Blüthen-
rost fest, keine dicken Wandung
nach Reife sehr verdünnt, mit
Ausnahme der oberen Partie
der Kappe. Nacht 1-2 mm tief, ruhen
ca 5 mm weit, oben auf ca die
Blüthe erzeugt, Boden d. Hays ca 14 mm
dick, Fr. schappalos, nach unten
wenig, nach oben etwa 10 mm

Blauk. Aul. (Fock) 4455

oder rubin. Flirsch saftig,
weiß von geringen Geraden
Blaukrist nur ca 6 mm lang
mit winzigen Blaukristallen

12) Lepismium FR 1247

Blauk. saftig, Flirsch
Reife ist angefallen Drücker
Diese reift, ca 5 mm lang, in
breit oben stumpfer als unten,
nur die Nahe einer wachsenden
sich darstellt. Die halbkugelförmige
in einem kleinen Blaukristall von
ca 6 mm Durchmesser

4456

Licimio de Almeida M. 9. II 64
Nabe Ortschaft mit Flirsch saftig

An Flirsch saftig Flirsch saftig
überdies mit weißen Flirsch

1) Flirsch saftig Flirsch saftig

2) Flirsch saftig Flirsch saftig

3) Flirsch saftig Flirsch saftig

gelblich, Flirsch saftig Flirsch saftig

meist nur 1 mittlerer nach oben
alle Flirsch saftig Flirsch saftig

Flirsch saftig Flirsch saftig

4) Flirsch saftig Flirsch saftig

oder nur von Flirsch saftig

prozent, Flirsch saftig Flirsch saftig

18-26 Flirsch saftig Flirsch saftig

Flirsch saftig Flirsch saftig

ist sehr gut, daher meist
nur Flirsch saftig Flirsch saftig

Flirsch saftig Flirsch saftig

Flirsch saftig Flirsch saftig

Flirsch saftig Flirsch saftig

[illegible]

[illegible]

1) gottliche Fremdkörper 4 cm dick, grün
 goldsch. Kopf, 4. 16 Rippen
 eig. schwarzer Schmelz
 2) Wasserschnecke 2.5 cm
 die obere Kriechung (unvollständig)
 3) Kunstschnecke durch die Falt
 von 11.27. abenda 8 XI 64 12.7 Nk
 ohne Kopf, ohne Schmelz, 1 cm dick
 4) Kunstschnecke. Kopf wie oben, ohne Schmelz
 5) Kunstschnecke 6.72 abenda 18. Kriechung + Kriechung
 6) Kunstschnecke 22. 11.27 abenda
 7) Kunstschnecke 5 cm lang, 11.27 abenda
 8) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 9) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 10) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 11) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 12) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 13) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 14) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 15) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 16) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 17) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 18) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 19) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 20) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 21) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 22) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 23) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 24) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 25) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 26) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 27) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 28) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 29) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 30) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 31) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 32) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 33) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 34) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 35) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 36) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 37) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 38) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 39) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 40) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 41) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 42) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 43) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 44) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 45) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 46) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 47) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 48) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 49) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 50) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 51) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 52) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 53) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 54) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 55) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 56) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 57) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 58) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 59) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 60) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 61) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 62) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 63) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 64) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 65) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 66) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 67) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 68) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 69) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 70) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 71) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 72) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 73) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 74) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 75) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 76) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 77) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 78) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 79) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 80) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 81) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 82) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 83) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 84) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 85) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 86) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 87) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 88) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 89) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 90) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 91) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 92) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 93) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 94) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 95) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 96) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 97) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 98) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 99) Kunstschnecke durch 11.27 abenda
 100) Kunstschnecke durch 11.27 abenda

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

12. *Macropus* (sp.)
 13. *Macropus* (sp.)
 14. *Macropus* (sp.)
 15. *Macropus* (sp.)
 16. *Macropus* (sp.)
 17. *Macropus* (sp.)
 18. *Macropus* (sp.)
 19. *Macropus* (sp.)
 20. *Macropus* (sp.)
 21. *Macropus* (sp.)
 22. *Macropus* (sp.)
 23. *Macropus* (sp.)
 24. *Macropus* (sp.)
 25. *Macropus* (sp.)
 26. *Macropus* (sp.)
 27. *Macropus* (sp.)
 28. *Macropus* (sp.)
 29. *Macropus* (sp.)
 30. *Macropus* (sp.)
 31. *Macropus* (sp.)
 32. *Macropus* (sp.)
 33. *Macropus* (sp.)
 34. *Macropus* (sp.)
 35. *Macropus* (sp.)
 36. *Macropus* (sp.)
 37. *Macropus* (sp.)
 38. *Macropus* (sp.)
 39. *Macropus* (sp.)
 40. *Macropus* (sp.)
 41. *Macropus* (sp.)
 42. *Macropus* (sp.)
 43. *Macropus* (sp.)
 44. *Macropus* (sp.)
 45. *Macropus* (sp.)
 46. *Macropus* (sp.)
 47. *Macropus* (sp.)
 48. *Macropus* (sp.)
 49. *Macropus* (sp.)
 50. *Macropus* (sp.)
 51. *Macropus* (sp.)
 52. *Macropus* (sp.)
 53. *Macropus* (sp.)
 54. *Macropus* (sp.)
 55. *Macropus* (sp.)
 56. *Macropus* (sp.)
 57. *Macropus* (sp.)
 58. *Macropus* (sp.)
 59. *Macropus* (sp.)
 60. *Macropus* (sp.)
 61. *Macropus* (sp.)
 62. *Macropus* (sp.)
 63. *Macropus* (sp.)
 64. *Macropus* (sp.)
 65. *Macropus* (sp.)
 66. *Macropus* (sp.)
 67. *Macropus* (sp.)
 68. *Macropus* (sp.)
 69. *Macropus* (sp.)
 70. *Macropus* (sp.)
 71. *Macropus* (sp.)
 72. *Macropus* (sp.)
 73. *Macropus* (sp.)
 74. *Macropus* (sp.)
 75. *Macropus* (sp.)
 76. *Macropus* (sp.)
 77. *Macropus* (sp.)
 78. *Macropus* (sp.)
 79. *Macropus* (sp.)
 80. *Macropus* (sp.)
 81. *Macropus* (sp.)
 82. *Macropus* (sp.)
 83. *Macropus* (sp.)
 84. *Macropus* (sp.)
 85. *Macropus* (sp.)
 86. *Macropus* (sp.)
 87. *Macropus* (sp.)
 88. *Macropus* (sp.)
 89. *Macropus* (sp.)
 90. *Macropus* (sp.)
 91. *Macropus* (sp.)
 92. *Macropus* (sp.)
 93. *Macropus* (sp.)
 94. *Macropus* (sp.)
 95. *Macropus* (sp.)
 96. *Macropus* (sp.)
 97. *Macropus* (sp.)
 98. *Macropus* (sp.)
 99. *Macropus* (sp.)
 100. *Macropus* (sp.)

[illegible][illegible]

Handwritten: #23 art + photo we can see
don't need to take

500 ft. low 54
 1000 ft. low 100
 1500 ft. low 150
 2000 ft. low 200
 2500 ft. low 250
 3000 ft. low 300
 3500 ft. low 350
 4000 ft. low 400
 4500 ft. low 450
 5000 ft. low 500
 5500 ft. low 550
 6000 ft. low 600
 6500 ft. low 650
 7000 ft. low 700
 7500 ft. low 750
 8000 ft. low 800
 8500 ft. low 850
 9000 ft. low 900
 9500 ft. low 950
 10000 ft. low 1000

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

male

357 Pakete der gleichen Charge
abgegeben. Kind. Datum: München

Strength Training with Steve

Dr. J. H. Brown, Jr.

Shirley Jackson, *Dark Summer*, 1945

Kilmer, J. H. and J. W. Stender

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

Bring it over with you now please.

and 3 other m. 1st. 1st. 1st.

[illegible]

5-5 1/2 lb in nest. Forks 7.5

~~Q.6. What are the~~
~~stages of~~

100

3) Welche von diesen Aussagen sind richtig?

Noted. 10/10/10

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

...the ...

Section 1. General Provisions.

Stemmed Cliff Roads ~~will destroy a lot~~

Chert Fort - N. Pine & D - Bridges

10/20/2020 (X-2020) (X-2020) (X-2020)

Kind 9, 5 m. ~~Kind 9, 5 m.~~

$\frac{1}{2}$ lb. Right to him 18

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Melvin and Wilma (Boyle) 4/9-50

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

11. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

...the ...

[illegible]

[illegible][illegible]

2.2.) *Leptocarpus* im Kump-
schritt. Wie wir oben nach
Mitteln 1000. Blende 2. 4% Blk.
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.3.) *Leptocarpus* von Villa
Blende 1000 - 1000. Blende 2. 4% Blk.
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.4.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.5.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.6.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.7.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.8.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.9.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.10.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.11.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.12.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.13.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.14.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.15.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.16.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.17.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.18.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.19.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.20.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.1.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.2.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.3.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.4.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.5.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.6.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.7.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.8.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.9.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.10.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.11.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.12.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.13.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.14.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.15.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.16.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.17.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.18.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.19.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

2.20.) *Leptocarpus* durch die Blende
Blende 2. 4% Blk. ^{gut}

St. Louis, Mo. in wife's handwriting 53
My 28. 1880. 1880. 1880.
Mother of 1880. 1880. 1880.
1880. 1880. 1880.

Blonde 22 1/2 lb

[illegible]

Handwritten text: *Handwritten text, possibly a signature or name, written in cursive.*

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

RA 16.214 03.11.2010 x.2. 3.2.2.2

85. 1/2 inch in diameter at base of trunk
36. 1/2 inch in diameter at base of trunk

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

2011/9/2 2011/9/2 2011/9/2

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

1. 10. 1923

Feb 22 2 1/2 2 1/2 Feb

...the ...

Ischnura elegans L.
Larven 30 Stück 22. August
in Teiche Kühle - 7. 9. 28. 9. 95.
In entfalteter Form 1965.
36 Individuen 24 x 36 mm
(Fruh. 128. meider)

Leptocarpus

every other year. 1871

[illegible]

Balsam 11 1/2. With fresh milk

2019-2020

$\frac{1}{2}$ cup 1% milk

6.186 + 3/4 1/4 in

[illegible]

Labrador Duck. 4/5 skinned.

1942 29.8.23 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067

St. Louis, Mo. (Mon) Dec 22 1891

Chloride B.P. ca 75 mg/l + 100 mg/l

U-5 rolling abgezeichnet mit
Madame MacKenzie
Gleimthal, Westküste B.R.G.

17) Wissenschaften von Dittus
18) Grundkenntnisse 4. IX. 64 97/64

Deborah Annand Jones Wash. State

~~n = 6 - Fisher's exact test~~

4 1/2 x 1 1/2 in. (6 1/2 x 1 1/2 in.)
Osteon 2.2.
1st 1/2 covered with in natural position.
The 1st 1/2 of the 1st 1/2 is 1/2 in. (6 1/2 x 1 1/2 in.)
The 1st 1/2 of the 1st 1/2 is 1/2 in. (6 1/2 x 1 1/2 in.)

2. 1/2 cm. root of the plant

Wachstum: $\frac{dN}{dt} = rN$ (exponential)
 Kaphut: $\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$ (logistic)
 Kaphut: $\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - \frac{N^2}{K^2}$ (logistic with density dependence)

19. *Phlox pilularis* (L.) Rostk Schmidt

Hydroxide) u. Drogenverderbnis

...the ...
...the ...
...the ...

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

13. 500 yd. 3/2000
 14. 500 yd. 3/2000
 15. 500 yd. 3/2000
 16. 500 yd. 3/2000
 17. 500 yd. 3/2000
 18. 500 yd. 3/2000
 19. 500 yd. 3/2000
 20. 500 yd. 3/2000
 21. 500 yd. 3/2000
 22. 500 yd. 3/2000
 23. 500 yd. 3/2000
 24. 500 yd. 3/2000
 25. 500 yd. 3/2000
 26. 500 yd. 3/2000
 27. 500 yd. 3/2000
 28. 500 yd. 3/2000
 29. 500 yd. 3/2000
 30. 500 yd. 3/2000
 31. 500 yd. 3/2000
 32. 500 yd. 3/2000
 33. 500 yd. 3/2000
 34. 500 yd. 3/2000
 35. 500 yd. 3/2000
 36. 500 yd. 3/2000
 37. 500 yd. 3/2000
 38. 500 yd. 3/2000
 39. 500 yd. 3/2000
 40. 500 yd. 3/2000
 41. 500 yd. 3/2000
 42. 500 yd. 3/2000
 43. 500 yd. 3/2000
 44. 500 yd. 3/2000
 45. 500 yd. 3/2000
 46. 500 yd. 3/2000
 47. 500 yd. 3/2000
 48. 500 yd. 3/2000
 49. 500 yd. 3/2000
 50. 500 yd. 3/2000
 51. 500 yd. 3/2000
 52. 500 yd. 3/2000
 53. 500 yd. 3/2000
 54. 500 yd. 3/2000
 55. 500 yd. 3/2000
 56. 500 yd. 3/2000
 57. 500 yd. 3/2000
 58. 500 yd. 3/2000
 59. 500 yd. 3/2000
 60. 500 yd. 3/2000
 61. 500 yd. 3/2000
 62. 500 yd. 3/2000
 63. 500 yd. 3/2000
 64. 500 yd. 3/2000
 65. 500 yd. 3/2000
 66. 500 yd. 3/2000
 67. 500 yd. 3/2000
 68. 500 yd. 3/2000
 69. 500 yd. 3/2000
 70. 500 yd. 3/2000
 71. 500 yd. 3/2000
 72. 500 yd. 3/2000
 73. 500 yd. 3/2000
 74. 500 yd. 3/2000
 75. 500 yd. 3/2000
 76. 500 yd. 3/2000
 77. 500 yd. 3/2000
 78. 500 yd. 3/2000
 79. 500 yd. 3/2000
 80. 500 yd. 3/2000
 81. 500 yd. 3/2000
 82. 500 yd. 3/2000
 83. 500 yd. 3/2000
 84. 500 yd. 3/2000
 85. 500 yd. 3/2000
 86. 500 yd. 3/2000
 87. 500 yd. 3/2000
 88. 500 yd. 3/2000
 89. 500 yd. 3/2000
 90. 500 yd. 3/2000
 91. 500 yd. 3/2000
 92. 500 yd. 3/2000
 93. 500 yd. 3/2000
 94. 500 yd. 3/2000
 95. 500 yd. 3/2000
 96. 500 yd. 3/2000
 97. 500 yd. 3/2000
 98. 500 yd. 3/2000
 99. 500 yd. 3/2000
 100. 500 yd. 3/2000

Bottle 53
Bottle & 1 other bottle goldgl.
(also bottle) 1 green stone
limestone 2 ft cm red stone
river kind as was used
Mason used neither (2 others)
before offering. Double sample.

15) *Alfonsus* *hymn* *von* *Alfonsus*

Stamm und nadeln, glänzend
Kleiner, mit, harter, stromant -

Wieder, ca. 7.300 m, Kommt V-Feld
Tafelberg ca. 2.500 m, Eifel G.R. 6. 1910

$\bar{x} = 95$, $s^2 = 22$

34. $\frac{1}{2}$ of the whole is $\frac{1}{2}$ of the whole.

Little yellowish above, beneath
marked with reddish brown lines

16) *Alfaro, Rene von Klavins*
Berkley Calif # 15 aug 1969 -

greatest. Water in stream
at bottom of road 1.45 m, 9 1/2 ft.

3 mm. large when hatched.

[illegible][illegible]

[illegible]

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

[illegible]

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.