

Friedrich Ritter

Tagebuch 68



Ritters Bezeichnung: Heft 68

Seiten: 4680–4711 (+ 1 leere Seite + 5 nicht nummerierte Seiten
persönliche Notizen)

Land: Brasilien, Uruguay, Bolivien

Zeitraum: 23. März 1965 – 16. April 1965

Bemerkungen: ---



ca 5 km von Jaguari in Richtung Urina 4680 -
 Barragem (Urina) von Jaguari bei 36 km
 4680 - Langa de Arreia 4681 - L. San-
 tiago und Cerro Chapote 4682 - Cerro Branco
 4683 - Westl. Cerro Branco 4685 -
 ca 1 km vom Fluss nach nordwest, den
 Straße von Branco - Santiago bei 36 km 4686 -
 Ebenla bei 14 und 2.3 km 4686 - 3 km 4688 -
 San Francisco de Assis 4688 - 15 km von
 San Francisco de Assis 4689 - Ebenla
 da 15 km 4690 - ca 25 km westl. Alegrete -
 Jacuina 4691 - 12 km westl. Alegrete 4692 -
 7 u. 7 km südwestl. Harauquile 4692 -
 Ebenla 16 km 4693 - 15 km w. Alegrete
 4693 - 25 km von Paso del Norte - 25 km
 von Cuaraí 4696 - Ebenla 15 km von
 Cuaraí 4697 - 25 km nördl. Cuaraí 4697 -
 Gebirge 30 km nördl. Cuaraí 4698 -
 Passo da Gnapla 4699 - 50 km von
 Passo da Gnapla in Richt. Livramento 4702 -
 ca 75 km Ebenla - 20 km 4703 - Livla -
 mado 4705 - Livra. Seite Uruguaí 4707 -
 15 km westl. Livra. 4709 - Chamberlain
 4710 - Augusto de Villamonte 4710 -

4680
 ca 25 km von Jaguari in Richtung
 Barragem (Urina) von Jaguari, 23. III. 65.

- 1) *Diptanthocercus alacrigor* cf. FR 1026
- 2) *Notocactus linkii* cf. selten in K. auf
 Pfl. groß, mit 12-14 Rippen wohl Art
 von nordwestl. San Antonio de Hoa Vista
 Seite 4634, oben Nr. 1.

Barragem (Urina) von Jaguari am
 Jaguari-Fluss (ca 36 km nordost
 von Jaguari) 23. III. 65.

- 1) *Diptanthocercus alacrigor* cf. FR 1390
- 2) *Notocactus* sp. ^{nov} *linkii*, Art
 von Tledade. ohne K. Bl. etc.
 12-15 Rippen. Pfl. etw. kleiner
 als oben Nr. 2. St. zahlreicher als
 oben Nr. 2.

4681

Langa de arveja ~~III~~ III 65.

- 1.) *Notocactus laetivirens* mit geraden
Mittelsarkeln, Leffen Kuppe
Rippen 10-14 Bl. $4\frac{1}{2}$ cm lang,
goldgelb, in d. Tiefe rot. Narbe rot.

- 2.) *Notocactus muricatus* cf.
Ohne Kn Bl Fr wenig Knöllchen.

- 3.) *Piptanthocereus alacriport* Bl bis Fr.

- 4.) *Rhipsalis loefgrenii*

nabe) (südlich)
Santiago 24. III. 65. ca 550-xm.

- 1.) *Notocactus* sp. nov. - 10 FR 1375 FR 1377 a
var. nov. FR 1372
Fr. Mäntelichgrün, Rippen mit
L. 4664. Ohne Kn Bl Fr. Zwirnen
Reinen auf Flachstein, Wurzel mit
(Lorost n. h. h.) Knöllchen
Siehe auch L 4664 - 4667 FR 1375

4682

westlich Santiago östlich vom
Cerro Chato. 25. III. 65 (Bei Bauernhof)

- 1.) *Platyrrhynchus* sp. wie Porto Alegre, nahe der
Stadt.

- 2.) *Piptanthocereus* { *peruvianus*?
alacriport? cf.?

- 3.) *Rhipsalis loefgrenii*

- 4.) *Notocactus* sp. nov. cf. *Notocactus*
wie L. 4680 aber Nr 2. aber Thruhr
Wurzel immergrün, schliegend,
alt mehr absteigend u. viel länger;
ohne Kn Bl Fr. 12-13 Rippen.

- 5.) *Notocactus* sp. nov. ähnlich
L. 4681 unter Nr 1. selten mit
unreif. Frucht v. d. Kuppe.
Geringer Mäntelich 8-12 Rippen; Backeln
Frucht. randside selber. (siehe L. 4664)
Rippen 12-13 cm
entfernt. Rippen 3/4 - 1 1/2
cm breit Rippen sp. gehöckert zw.
d. Rippen, mit schmalem, aber nicht
schaffen Kanten. Rippen in d. Kerben.
Wurzel Leichter, spärlich. F. (L. 4699)

4683

Cerro Branco, westl. vom Cerro
Chato 257-III 65. ^{st. pegunt?}

- 1) Piptanthus, glacyportakrin? in Blüte.
- 2) Notoc. n. n. wie vorige S. 125; mehr
selten.
- 3) Notoc. ~~fi. officinalis~~ ^{officinalis} var. ~~officinalis~~ ^{officinalis} FR 1266. ^{rotlich, dicht bedeckt mit brauner}
u. ^{rotbrauner} Borde. Kanten scharf.
- 4) Notoc. ^{manumuloz} ^{off.} 1. Stelle
auf der Höhe. Chuk. Bl. Fr.
Wurzeln ohne Knöllchen.
- 5) Notoc. spec. nov. ^{FR 1381} ^{ähnlich muricata},
aber mit nur ca 13-16 Rippen.
selten Frucht ^{Rand gelb} bei 1. Baum
war Rand gelb. ^{FR 1381} ^{16. 1381}
- 6) Echinos ^{ähnlich} der ^{Wurzeln} ^{von} ^{Lincoy de Legredo}, aber mit
mehr Handsackeln ^{by weilen}
unreife od. reife Fr. od. kleinere Kn.
Frucht grün, ^{ca 1/2 cm} ^{klein}. ^T
- 7) Echinos ^{ähnlich} voriger, aber
mit längeren, dünneren
Häutchen; selten u. wohl mit
6 hybridisiert. Frucht etwa
wie bei 126.

7 ohne Knöllchen)

8) Frailea n. nov. ^{FR 1367} ^{var. von 1364} ⁴⁶⁸⁴
Felswand gegen Osten, spärlich
auf Felsen mit etwas Erde.
Ohne Kn. Bl. Fr.

Trindelförmig, oben Ende $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ cm
dick. Weiße Wollflockchen, zu-
weilen dazw. noch eine schwarze
Borde. Schnipchen vertrocknet, drei-
eckig, ca 1 cm lang)

Frucht grün mit rotbraun, fast
kuglig, ausgefüllt, Fr. fleisch wenig
saftig, weich)

4684
3) *Notoc.* sp. n. wie L 4682 Nr 5
sehr selten. FR 1376.

4) *Notocactus*? (bei km 23) sehr selten;
3 winzige Exemplare beisammen
neben den Trailea; mit einer
mundlichen $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ cm Ø Knolle
im halboffen. Fasern-Wurzel dar-
unter und knoll. bis lang. Hals dar-
unter mit Fasern-Wurzel oben.
Exemplare grün kuglig 1-1 $\frac{1}{2}$ cm Ø,
mit 7-8 Rippen; die flach. stumpf.
auf die Hälfte gekrümmt, mit dem
Knoten auf den Höckern; Areolen
winzig weißförmig, ca 2 mm entfernt
Randst. wenig sehr gelockt, bis zum
mehreren mm ch 8; mittlere
mit nadelst. etwa über dem
Ordnung mehrmals, kleinlich
gerade absteigend.
Viellicht nur Ausrieb aus den
Knöllchen eines Exemplars von
oliger Nr 3 (wahrscheinlich).

Ebenfalls selbst km 12

1) *Notoc.* sp. FR 1426 (1 Exemplar)
(in Pflanzung)

4685
Laõ Francisco de S. Jois, Straße
nach Santiago, bei ca 5 km vom Aus-
gang der Wertschalt. 26. VII. 65

- 1) *Trichocereus* ~~*trichocereus*~~ *trichocereus* sp. in Blüte.
- 2) *Notocactus* *offensis* var. FR 1266
zuweilen Km. unreife od. reife Fr.
offensiv lang. Rippen ca 10-12
St. mittel lang. Areolen einer Klein. Pfl.
mit $\frac{3}{4}$ cm lang, goldgelb. Leuchten
in der Höhe 1. Halbe rot. Kanten stark
- 3) *Echpr.* ~~*trichocereus*~~ *trichocereus*
Km. bis Fr. Bl. rosa wie bei Nr 4
und von gleicher Größe, blüht
gleichzeitig.
- 4) *Echpr.* ~~*trichocereus*~~ *trichocereus*, normal
Km. bis Fr.

5) *Notoc.* spec. FR 1378 von 1376 (L 4682)
ähnlich *offensis*; St. gerade,
weniger, sehr dünn. Rippen 10-12
höher als *offensis*. Areolen entfernt.
St. länger. Zuweilen Hybrid mit
offensis. Ähnlich L 4682 Nr 5,
spärlich u. zerstreut. Diese Km. bis Fr.

4689

FR 1379

6) *Notocactus* sp. nov. cf. nyr
 an einer Stelle (ca 5 km rechts
 von der Straße ca 10-20 m von
 der Straße über Felswand
 einzeln st. rötlich-purpurn,
 Meelen sehr gedrückt.
 Pfl. kugelig. Stellen noch Frucht,
Frucht grün, ca 3/4 cm lang 1/2 cm dick,
 weiße Wollflockchen, Schuppen ver-
 schwindend klein, bläß ohne Borsten,
 Blauweiß und rötlichen Borsten-
 Pfl. ca 19-21 Rippen.
Wurzeln ohne Knöllchen

F war offenbar nicht ausgeriff. Die ausge-
 reifte Fr etwa vom Aussehen der
Notoc. mairii - Früchte 18-25 mm
 lang, bläulichweiß auf der Fruchthaut.
 oben 10-12 mm dick, olivgrün, der untere
 Teil der Fr. verdünnt und rötlich.
 Basis mit sehr weitem runden Loch
 öffnend. Bedeckg. wie Fruchthaut. Fr. imma-
 hohl, trocknend. Samenorange
 nur im oberen geraden Teil der Fr.)

4690

ca 15 (?) km von São Francisco
 in Richtung nach Alegrete 26 III 65
Notoc. wie vorige Seite Nrb.
 auf Klaffstein. FR 1379.

ca 18 km von São Francisco in
 Richtung nach Alegrete 26 III 65.

- 1) *Notoc. affinis* wie São Francisco
 nördlich
- 2) *Notoc. linkii* FR 1026 ~~ca~~ ~~FR 1026~~
 nördlich wie 4689 ~~ca~~ ~~FR 1026~~
 "harbuerot" (FR 1379)
- 3) *Notoc. sp.* var. von P. 4689 Nrb.
 Pfl. größer bis 12 cm Ø, 18-23 Rippen.
 Muskeln dicker, die mittleren dicker
 u. länger, ca doppelt so lang. Rippen
 der Hüfte st. stark hervorstehend
 ohne Kn. Best., Wurzeln ohne Knöllchen
- 4) *Psilanthus* ~~repens~~ ~~sp.~~ ~~ca~~ ~~FR 1026~~
 "ca" ~~FR 1026~~
- 5) *Platyopuntia* sp.

4693

~~an~~ (wie) ^{27. III 65.}
~~an~~ voriger Platz; bei km 16.

- 1) *Notoc. mammosus*, selten
- 2) *Erailea* ~~(Karyocarpus)~~ ^{sehr selten},
 in Blüte,

- 3) *Notoc.* ~~spec. nov.~~ ^{ohne Kribsl.} selten.

FR 1414 ~~an~~ ^{ohne Kribsl.} ~~an~~ ^{FR 1396}
~~[1396 - nicht Bunte für km 13 1/2]~~

ca 15 km west. Hegrete an Straße
 27. III 65.

- 1) *Notoc?* spec. wie I. H. 88 Nr. 5.
 selten. FR 1378

FR 1364

- T (*Erailea* ^{FR 1364} ~~spec. nov.~~ ⁴⁶⁹²) (3 Blüten) 4694
 am Spätnachmittag. Blühen. grün
 4-5 mm lang, oben 3 1/2-5 mm dick,
 halb bedeckt mit weiß. Wollflocken.
 eine weiße bis rotbraune Spitze.
 Eine schmale spitze rotbraune Schuppe.
 1/3-1/2 mm lang. N.-K. u. Nekt. fehlt
 Inset bis zur Nekt. Drüse
 Röhre kürzer als 3 1/2-5 mm lang
 oben etwa ebenso ^{schwach} ~~schwach~~
 gelblich grün, oben ~~schwach~~ ^{schwach}
 dr. Drüsen, Schuppen an Größe ^{schwach}
 zunehmend grün mit rot, ^{schwach} ~~schwach~~
 verlängert. Spitze. Blf. von
 Kronblattfarbe, ebenfalls ^{schwach} ~~schwach~~
 4-8 mm lang, die krümmen oben
 Ep. u. Nekt. weiß, Ep. 9-12 mm, Nekt.
 weit seibl. ausgedehnt u. ^{schwach} ~~schwach~~
 gebogen. 5-6 (9) etwa 2-3 mm ^{schwach} ~~schwach~~
 Kronbl. voll goldgelb 11-17 x 2 1/2 mm
 unten sehr schmal, oben ^{schwach} ~~schwach~~
 Übergänge in Kronbl. gelb mit ^{schwach} ~~schwach~~
 Inset ^{schwach} ~~schwach~~ (oberen ca. 2 mm)
- F Eine Blüte eines Exemplars von
 ebenda in Cajon (Kr. hatte einen
 roten Schlund nur ganz tief
 ebenfalls goldgelbe Kronblätter
 aber 4-6 mm breit)

4695

(Forts. ~~ca 49 km~~ ^{ca 49 km} ~~4692~~ ⁴⁶⁹²
 unten) *Erailea cataphracta* 4692
 nierenförmig oder gering
 bedeckt, nach oben völlig bedeckt
 N-K sehr stark bis unten
 Röhre kirschrot, 7-8 mm lang oben
 etwa ebenso weit, innen blaf-
 gelb, außen graugrünlich, oft mit
 rot decken; bedeckt wie Fäden.
 Schuppen wiegen dreieckig, ca 1-2 mm
 lang. Haut sehr blafgelb, fast weiß,
 1/2-1 cm die kleineren oben,
 Beutel goldgelb. Fersen fehlen
 obere 3-4 mm.
 T die unteren 2 mm innen können
 auch purpur sein
 1/2 sehr blaf, fast weiß, 12-14 mm
 Narbe sehr dunkel, dick u. unge-
 bogen, sehr blaf 3-4 mm, 4-5.
 Korb hellgelb 14-16 x 2-3 mm
 unten sehr schmal, oben für
 gerichtet, die altpurpur mit etwas
 rot und stumpf, mehrlinealisch,
 obere im Korb, kleine stumpf
 mit aufgesetzter Spitze.
 ca 8-11 Rippen.)

Harrnburg 4696

ca 52 km südwest Harrnburg an
 Straße nach Quaras. Hängel,
 2.4. III 65. nur 25 von Oberg.
 1) *Nepa namensis* 4 mm
 Höcker nur schwach entwickelt.

- 2) *Antozia* FR 1361.
~~*Antozia spec. 1*~~
 ohne K. Bl. Fr. rötlich, häufig.
 wächst bis 1 m H. von Quaras.
 Haut hellgelb, Mittelst. rot.
 3) *Erailea* sp. sehr selten, ca 1-2 cm
 kugelig, ca 14 sehr aufgetriebene Rippen.
 nicht sehr ausgeflachte Höcker.
 Beutel fast nicht auf, ca 1 mm lang,
 1/2 mm breit, auf den Höckern
 ca 2 mm entfernt, H. nur 1 mm
 1-2 mm lang, ca 10 anliegend,
 weißlich mit dunklen Punkten.
 ohne K. Bl. Fr. Wurzel etw. kräftig.

T nördl. der Straße, nahe gegen Westen
 von einem Hügel mit 2 H. (ca 25 km
 25 km auch von Sandovalguera)

4697
ca 59 km südwestl. ~~von~~ ^{Yarumona} ~~an~~
Waste nach Quaraí, blackfelsen.
= 18 km von Quaraí 27. III. 65.

1.) *Notoc. mamulorum*.

2.) *Gymnocalyx* ⁱⁿ ~~sp~~ wie T. 4692

3.) *Notoc.* ~~offensis~~ ^{wie T. 4693, FR 1414}
~~ist n. thoms.~~ FR 1414

ca 6-12 km östl. u. nördl. von Quaraí

1.) *Platyop.* ^{(Lachyia) 29. III. 65.} ~~wie~~ Paraguay, dickblättrig
mit ein. röt. FR 1414

2.) *Piptanthrac.* ~~lagasana~~ ^{peruvianus} cf. (4700)

3.) *Gymnocalyx* wie oben, selten BET

4.) *Dracila* ^{FR 1386} var. von T. 4692 Nr 4 aber
13-15 Rippen; St. kleiner, am
liegender Stamm in Jugend. spärlich
selten Frucht Blüte sehr oft 42 Leit. (a)

5.) *Macrocaryx* ^{FR 1387 a} ~~Macroniavapnare~~
13-19 Rippen (Cluster); wird sehr
groß (siehe T. 4699)

6.) *Notoc² offensis*; normal
ca 8-12 Rippen. Ähnliche Blüte.

7.) *Notoc. mamulorum*.

Gebirge ca 30 km nördl. Quaraí 29. III. 65.

1.) *Platyop.* wie vorige T.

2.) *Piptanthrac.* ~~lagasana~~ ^{peruvianus} cf.

3.) *Echinopsis* ~~sp.~~ sehr kurzstachelig,
Basis glänzend, Außen etc. grün
(2 Beispielen)

4.) *Notoc. offensis* wie oben.

5.) *Dracila* ^{FR 1386} ~~sp.~~ klein länglich
wurzelst. ^{FR 1386} 13-17 deutliche
aber sehr flache Rippen mit warren-
Macheln hellgelb. Randliche ca 10
mittl. fehlend oder bis mehrere 12
kurz hellbr. od. röt. braun. Alle
wenig vorhanden. Meist. weiß od. braun.

14699

4699 abuekn Altr. Spärlich am
Bergange.

6) Platz schmal, klein, im Gebiet von Craig
unter, FR144, FR401, 5D Re no von Ge

Passo da Guarda - 30 km no Vale
West, 1000 m. 30.11.65

2) *Fraila* sp. wie 1.4692 Nr 3.

2) *Urtica muriculus*.

3. *Notocallis*.

4) Malacopora are Diderian.

F 70 Bl. ² 680 in tr. yellow white F
Blk. 59 y ew. unbind, 53 1/4 cm

46. Kopf, caput weiß, oft mit bräunlich
gelbem bei dunkler Färbung.

Die Bl. grün, ca 10 mm lang 9 mm dick,

kleine verflochtene dreieckige
Fahnenwerke weiße Wollflocken

leichte verwitterte rotbraune Böden

II - K. Laub und lang mit schwarz
grünem Nektarium mit Nektar

Ball geschloß durch Hoff

Wäre möglich, dann laß über 15
min. Zeit, ihnen goldgelb, auf den

granatener Wollkardisch
Bom. 1782 F. K. Schumacher

Boeken wie die: wapen-geschiede

dreieckig oben bis $\frac{1}{2}$ cm lang
zu Kränzl übergehend.

Hb. schön goldgelb. 12-15 mm,
die mittl. am längsten. Beutel creme

Insert no other

Glyptothorax 22 spec. from 4 runs
and the 18 cm. larvae from said

Aug. 15. 1881. Kappen, on Squaw
Kronk hell goldgelb. Atzkerde.

mit roth. Spitze 2 1/4 - 3 cm hoch
in oberer. Röhre, unten "

schürfen, sehr sehr linear

Fr. Rinde/Latex 50 g. per 100 g. 49 mm

+ 1 Huhn (foto 398) gelblich + braun
lang 3 cm weiß Huhn Felle weiß E

quinn laug pben ~~frun~~ dick,

districte white Velle schilt 7-1
E nach oben 102) nun Lage d. Linsen

gelbliche mitke Schuppen, stark oberseits
mit braun. Fühl. nur die 1. 2.

Körper und Augenbrauen lang

Stett. märlich, Röbre 1 cm lang.

oben 7 mm weit, außer den oberen 2 mm voll verknüpft.

oben unten rosa u. bl. oben bl. u. gelb
mit dicker weißer. wolle

Thuppen das mit braun. Spitze oben
bis 1025 mm. lang. Rund. der

bis ca. 5 km landwärts, nördlich, unter-
halb Übergang zum Knochenschäfer,
10.5 km von Bad Homburg, 10.5 km.

He + brande Goethe was it love.

-Gesellschaft e. V.

Gesellschaft e. V.

-Gesellschaft e. V.

-Gesellschaft e. V.

-Gesellschaft e. V.

-Gesellschaft e. V.

4701

Blf. voll goldgelb; mit Dornen.
 Stiele, Warb. innen 6-7 mm
 alle Nadeln gleichlang. Inset
 bis 1 oder fast 2 mm unter Nadeln.
 Blf. blaf, Dornen überragend 22 mm
 davon 22 mm auf die etwas
 gerippten Nadeln. Nadeln
 beiläufig.
 Kronscheibe ausgebreitet, goldgelb
 16-18 mm x 13 1/2-5 mm, die Kronscheibe
 innen u. schmalen innen,
 oben gerundet od. kurz kegelförmig.
 Dornen nur ganz oben.
 bei 2/3 Länge am breitesten.
 Nadeln in Schuppen mit braun. Spitzen.
 Laust keine Rot aus Kronblätter.
 Frucht rot, oberes Ende auch graugrün,
 etwa 1 cm lang u. 4/3 cm breit; bedeckt
 wie Blf. (supra - unten)

FR 1414

F. Fr. L. 4699 Platyon. m. Frucht birnenförmig
 3 1/4 cm lang, 2 cm dick bei 2/3 Länge.
 Nahe wenig vertieft. Nadeln 2 mm
 D. mit weißer Wolle und kurzen
 gelben Geißeln, 1/2 cm entfernt.
 Fr. dunkelrot, Fleisch grün, wenig
 saftig. Samen in dicke Walle gehüllt.
 Fleisch nicht scharf, sondern süß.)

4702

50 km von Passo da Guarda
 Richtung nach Livramento
 nach links. 30. III 65.

- 1) Noth. mamulosus.
- 2) Frailea sp. 4696 Nr 2
 ohne Kn Bl Lk
- 3) Frailea sp. wie L. 4692 Nr 3. FR 1385.
- 4) Frailea sp. nov. (alt L. 4696
 Nr 3) sehr selten. gelbe Frucht.
 Rippen stark aufgetrieben. Höcker sehr
 niedrig. etwa 17 Keilz. (aufgetriebene
 Rippen) wenige fein hat abste-
 hende braune Stachelchen.

14703

75 km. Passo da Guarda (gegenüber
Lager von Otaer) = ca. 15 km n. Lixa-
mundo) 30. III. 65. 15.2

1.) *Piptanthocere bogeanus* cf. *dicher*
als *peruv.*, 9-12 Rippen. Krebse-
gedächter. Blüte kleiner,
außen meist rot, innen weiß
Dunkel rot.

2.) *Gymnocalyx* sp. wie *Quarai* häufig.

3.) *Malacocarpus* sp. wie *Quarai* häufig.

4.) *Noloe*? *officinalis* wie *Quarai* häufig.

5.) *Noloe*? *magnulobus*. Best. ziemlich
schwach mäßig.

6.) *Noloe* sp. wie *São Francisco*
Nr 6. Varietät mäßig. FR 1364
Otaer bei Bl. Fr. T. 13792

7.) *Frailea* sp. wie F. 4692 Nr 3. selten

7a) *Frailea* sp. var. Bl. größer, Bl. weißer,
auscheinend rübenförmig, selten.

TEr. in Lagen gr. etwa ebenso wie F. 4689))
FR 1364 a.

FR 1385 c 4704

8.) *Frailea* sp. ~~sp.~~ F. 4702 Nr 4.
Nur stellenweise auf flacherem
erdigerem Boden. Ohne K. Bl. Fr.

T (zu *Gymnocalyx* F. 4694)

1 Blüte Foto Nr. 59, 9 + P. 7. Foto, am
Scheitel gering duftend, 4 cm
lang, weit offnend.

Fr. grün 10 mm lang oben 6 mm breit,
nach unten verengt, mit ge-
rundeten, rötlichen, breit weiß gelan-
deten Schuppen mit wirrigem auf-
gesetztem Holzbrenn, Spitzchen, Schuppe
breit 3-4 mm breit, 1 1/2-2 mm lang.

N-K. röhrenförmig, 1 1/2 mm lang, fast offn.
weißgrünlich mit sehr wenig Nektar.

Röhre röhrenförmig, ca 8 mm lang
oben 4 mm weit innen bläulich.

Außen wie Fr. Schuppen länger
oben allmählich in Kröte übergehend.

Farbe wie von Fr. aber mehr grün.
nach unten weißer, fast weiß.
oben rötliche Spitzchen.

Haar hellgrün, die oben nach oben
nach gelblich, Bartel klein, zuckel.

5-6 mm, oben 5-8 mm, mitte ca 3 mm
besonders unten und am Saume.

Röhre nach oben weniger zuckel.
hell grünlich gelb, 1 mm, wovon

4705 1 Fr. platzt seitlich auf, Flügeln weiß
 3 mm auf die 6 Fr. - geringelt
 hellgelben Rippen hat den Perikarp.
 Kroubl. hell sitrongelt. 18x5-6 mm
 Sporn nur 1 mm, glatt, stumpf
 -wa im Mitte am breitesten, zieml.
 spindelförmig, verschmälert
 nach der Basis gleichförmig;
 äußere 20-22x6-8 mm linealisch,
 Sporn breiter hellgelb, nach der Ende
 mehr rotbraun (siehe auch Blüten-
 angaben in Heft 69 & 29a). Frucht grün
 und mit etw. Rotbraun, 2 am lang 1 3/4 cm, 1
 und oben verdünnt, bräunl. weiß gerandete,
 dreieckig geschnitten, ca 5 mm breit, 2 mm lang, klein, ledrig
 Liramide 31. III. 65

- 1) *Siphonanthus vagans* c
- 2) *Malacocarpus* n. wie *Quarzi*
- 3) *Notoc. (Cylindropuntia)* Behoobung FR 1415
 gering, mittelst. sehr klein, zueh.
 gerade, verbreitet, nördlich, kantig, stark
- 4) *Notoc. linkii*, Behoobung, alle etc.
 eine Stelle nahe bei der Stadt, FR 1402
- 5) *Notoc. marginata* - Behoobung gering
 H. 4-6 cm, kurz
- 6) *Notoc. herpessii* ohne Knobl. Fr.
 Blüte auf ab. ca 4 cm, nördl. (FR 1402)
 Scheitel nicht schief, Wurzeln
 ohne Knöllchen, nur einzeln.

4706 Blüten im Kranz rings um
 den Scheitel, Rippen blühbarer
 Exemplare 16-20. Jugend- und
 Altersformen sehr verschieden.
 In Jugend Areolen sehr gedrängt,
 glöckerförmig, gering, feine Bestäubung.
 Alt glöckerförmig, sehr stark, Areolen
 fern, Mittelst. sehr fein, pfriemlich
 braun. Kugelig, in Scheitel
 Lage verlängert. Blüten noch reife Fr.
 Frucht ganz in weiche Wölle gehüllt, bläuh.
 mit wenigen dazwischen verstreuten
 Schuppen, schuppig. Blüte glatt, Fr. platzt auf
 weit auf, in 2 Lappen.
 7) *Freilea* n. wie [S. 4704 Nr. 3] FR 1415
 Elsenberg gegen Norden (mit Bewöl-
 deten, die Weiden, = 1385 m) Kän-
 fig links der Straße nach Rio Arrio, Elsen-
 berg bei ca 12-15 km, nördlich, FR 1385
 8) *Freilea* n. wie [H. 92 Nr. 3] nördl.
 FR 1364 b. weisse zw. Gebirgs-
 zum Ringplatz, FR 1364 b
- 9) *Freilea* n. wie *Freilea de Agudo* (2)
 auf einem Elsenberg etwa 12 km
 nördlich. globularis FR 1385
 9) *Notoc.?* n. ähnl. *offonis* aber Rippen sehr
 niedrig, 12. Areolen sehr gedrängt,
 Mittelst. rotbraun, sehr kurz, ab gebogen.
 (= Forts. 4705)

4707

Uruguay ^{bei Rivera} an der Grenzlinie
gegen Brasil bei Livramento
1. IV 65.

- 1) *Piptanthus* *bagianus* cf.
- 2) *Notox. (Lottowia)* wie Livramento
od. *Arachnoides* & selten
- 3) *Notox. maculatus* wie 4705
- 3) *Notox.* sp. wie São Paulo #6 vor
wie 4703 #6. FR 13796
- 4) *Notox. (Lottowia)* ~~wie 4706 #9~~
~~aber Mittelst. Körper~~
~~gebogen, dunkel rotbraun~~
~~Rücken meist gelblich~~
~~gerahmter Rücken gelblicher~~
~~als obige Nr. 2, sehr niedrig~~
- 5) *Fraxilea* ~~sp. wie 4706 Nr. 2, oder~~
~~Rimón de Segredo cf. Thue Ku De Ex~~
~~FR 1392~~
- 6) *Malacocarpus* sp. wie *Ararai*.

4708

F Livramento / Fort. São Paulo (4706)

- 10) *Notox.* ~~sp. wie 4706~~ ^{ähnlich vorigem}
aber St. weniger, Areolen auf
ferneren Stücken sehr gering. Pfl.
flacher. Links der Straße nach
Felsenberg ca 12-15 km
Entfernung auf Weideland
mit #7 häufig. Rinnen sehr
flach. St. klein. ~~FR 13795, 13796, 13797~~
- 11) *Fraxilea* sp. ~~ähnlich Nr. 7~~ aber
sehr dicke St. mehrere Kurven
rotbraune Mittelstücken. FR 1391
ca 12 km nordöstl. Livramento
in Landschaften 1 Exemplar
an Fußspitze eines Höhenrückens
nördl. der Straße nach Rosário
Fraxilea antioquiensis pallidior.
- 12) *Fraxilea* ~~sp. wie 4706~~ sehr ähnlich Nr. 7
vom Felsenberg der Nr. 7 der dritte
Felsenberg etw. gegen Nordwesten nahe
südlich einer Nebenstraße. Spärlich oben.
Bestand dichter. Pfl. länger.
Fraxilea albicolummaris R. [Bestandweise
etw. 3 km entfernt von FR 1385 b]

4711

untere Hälfte nahezu tubig, obere
 schmal trichterig. Blap. außen orange,
 Blöckchen grau, mit rötlichen Flecken,
 schwach. Schuppen schmal dreieckig,
 wenig nach den Enden rotbraun, rötlich,
 oberseits 2-3 cm lang. Übergang in Kronbl.
 Haupt. Blap. oberseits fast weiß 4-6 cm,
 die Längeren rötlich; am Saum 2 cm.
 Frz. - Länge 2 1/2 cm. Dornen keine.
 Gr. Kelchen 1 5/2 cm. überlag. Nabe auf
 welche 22 mm entfallen, mit 10 grün-
 gelben, 4-5-geweiht. Lappen.
 Kronbl. innere schneeweiß 4 1/2 - 5 cm
 x 1 1/2 - 2 cm etwa lanzettlich, rötlich
 sehr schmal, oben lang zugespitzt, Trichter-
 ausgeformt, bei 2/3 Länge am breitesten,
 außen 4-6 1/2 cm lang, die bei 1/3
 zu einer 4-8 mm weit linealischen,
 lang zugespitzt, Kelchen rötlich rotbraun,
 mittlere in der Mitte, Größe u. Farbe zw. beiden.

Kleiner Ring n. 60 cm Ø Ende 22
 4 Lk. Ø 7 cm Ø, Halsring
 und mit 10 cm. Kanten
 1 cm Ø. 1 cm Ø
 Gefälle 6-6,5 cm weit oben
 Ende mit 10 cm Ø. Breite
 10 cm
 3) Halsring n. 60 cm Ø Ende 22
 38. III 651 40344 Mm 4/3 Lk
 Ende mit 10 cm Ø. Breite
 10 cm
 Gefälle 6-6,5 cm weit oben
 Ende mit 10 cm Ø. Breite
 10 cm
 4) Halsring n. 60 cm Ø Ende 22
 38. III 651 40344 Mm 4/3 Lk
 Ende mit 10 cm Ø. Breite
 10 cm
 Gefälle 6-6,5 cm weit oben
 Ende mit 10 cm Ø. Breite
 10 cm

[illegible]

9 D R ppe - 9

