

Friedrich Ritter

Tagebuch 76




Ritters Bezeichnung: Notizen über Kakteen 1929/1933

Seiten: nicht paginiert

Land: Mexiko

Zeitraum: ---

Bemerkungen: ---



Am 10. V. 1933. Notizen über Kaktusen
1929/1933.

Lamencarnamen
von No. 1 bis No. 655.
und von No. 701 bis No. 703.
Die Nummern über 700
reserviert für Namen von
Guerrero.

Julian Garcia,
 Ortega #5 Fortuna #8
 Guernavaca

Nr. Agave.
 106. *Ferdinandi regis.*

(falsch) *lechuilla* Paep (= *lophanthe*)

410. *Victoria reginae.*

284. *Verschaffeltii* (Breitblätter)

107. *colymus.*

109. (Kulturort Saltillo.)

283. *marmorata* (von Tehuacán,
 gross, schmal, starkstachel.)

397. (klein, gepunktet mit Knollen v.
 von Saltillo.)

(Agave)

VII.

398. (grün; gelb gestreift. Saltillo)

400. schmalblättr., palmenartig,
von Est. Caballo.278. macropantha (schwarz Stoll.
von Tehuac. bis Tomellin.)

295. Agave stricta (Tehuacán.)

291. Kerchover^(Lem.) (Tehuacán, Lechugilla)

490. bracteosa (Monterrey.)

Arequipa520. leucotricha. klein, dick, dicht grün
best. XII 30. [vielleicht noch Agave im III.]
große leuchtend rote Blüthen. [35.000 ft. v.
V. 31.]Ariscarpus

169. fissuratus.

170. Kosschubeyanus.

3. retusus.

91. scapherosthus.

7. trigonus.

Nr. Asiophytum.
204. asterias.

46. capricorne major (Rinconada)
(Monclova)

47. capricorne major, Sackellw.

44. capricorne minor (Leguin)

*
44. capricorne aurea. (Yucatan)

45. myriostigma, 4- und 5-rippig.

271. myriostigma tamaulip. 5-ripp.

Nr.

272. myriostigma tamaulip. 4-ripp.

492. myriostigma coahuilensis.

213. ornatum.

214. ornatum wirbelii

491. capricorne senilis (Mexico)

492. capricorne clavispinus (4 Lienega)

Astechium
85. Ritterii. (blüht Ende Mai)

Cephalocereus.
126. sevilis.

294. chrysomallus (= Pachycer)
(Berger: Enblea n. Dax.)

281. columna-trajani.
(= tetetro.) (= Pachycer) (Berger:
Enblea n. Dax.)

296. Hoppensstedtii. (Laxton)

298. macrocephalus. (führt in Berger)
(W. S.) (von Schwarz angeboten)

254. Cereus
bavosus (= *hollianus*) (= Lemaireoc.)
 (Tehuacan) (Lemaireoc.)

277. *cardelabrum* (= Heberi) (= Lemaireoc.)
 (Berggr. Sue. + Oacc.) (Lemaireoc.)

294. *chende* (= Lemaireoc.) (Tehuac.)

292. *chichipe* (= Lemaireoc.) (Tehuac.)

275. *chiotilla* (= Escontria) (Indimurko)

282. *deficiens* (= Escontria)
 (Nabul. chiotilla)

182. *Lumortierii* (= Lemaireoc.)
 (Agst. (22. mit Epith. similis))

(Cereus)
 Nr. 27. *pruinulosus*
~~*chameus*~~ (= *griseus*) (= Lemaireoc.)

351. *Emoryi* (= Bergerocactus)
 (Calif. + 103. - 8.)

25. *geometricus* (= Myrtilloc.)

656. *giganteus* (= Carnegiea)

318. *grandis* (= Pachycer.) (Foll. in
 Berger) [110. 319 mm. Durchmesser, 319 mm. Breite]

209. *Greggii* (= Peniocereus) (Kordunsa)

90. *marginatus* (= Pachycer.)

332. *parkeri* (= Pachycer.)
 (Ch. C. u. angust. Mexiko)

(Cereus)

- Nr.
 334. *Pringlei* (Schyzer) (Lan. + B. G.)
 315. *gueretensis* (Lemaireoc.)
 (fehlt in Berger)
 379. *Schenkii* (Mytillocactus).
 (Lue. + Oax.)
 179. *spinulosus* (Selenicereus).
 (Berger; Mexiko.)
 244. *stellatus* (Lemaireoc.) (Tehuacan)
 293. *undatus* (Glylocer) (Berger; West-
 indien; sonst kultiviert)
 287. *viperinus* (Wilcoxia) (m. dl.)
 (Puebla)
 312. *leptophis* (= *Aporocactus*) (Berger;
 Mexiko)
 317. *Neueit* (vielrippiger Säulen k. von
 Puebla) = *Lemaireocer*.

(Cereus)

Nr.

180. *basaniensis* (= *acutangulus*)
 (= *Acanthocereus*) no. 2. [Berger 8-125]
 181. *ahul. spinulosus* (Victoria; Tan.)
 (= *Selenicer*)
 392. *tuberosus* (= *Wilcoxia*)
 (Lan.)
 345. *cochal* (= *Mytilloc.*) (B. G.)
 367. *eruca* (= *Machaereoc*)
 333. *gummosus* (= *Machaereoc*)
 375. *gummosus cristate*.
 331. *occidentalis* (= *Acanthocer*)
 (fehlt in Berger) [329. *gummosus* 330. *Machaerian*,
 alt 332. 13-8.]

(Cereus)

Nr.

335. Schottii (Lophocerc.)

377. Neuheit ähnl. Schottii (viele Rippen)
(= Lophocerc.)

336. Thurberi (= Lemaireocerc.) (Lem. + Rib.)

346. Thurberi = Zwerghform (Lemaire.)

374. Thurberi cristata.

376. striatus (= Miconia) (B. &.)

507. ^{Pseudomorpho melanostala} ~~lanatus~~ (= Exostoa) St. goldgelb
[XII 1930 [+ Märk.] [II J. 8 + 11 + 15]508. candelaris (= Brownia) XII 1930
[später kein weiter. Same. Märk.]509. brachypetalus (= Loryocactus) riesige rote
St., baumförmig XII 1930 [kein Same III.]
[Areguipa [II J. 18]510. [laetus (= Lemaireoc.) baumförmig,
gegliedert [kein Same III.] XII 1930:
= Lemaireocercus [heißt im Berger]
[II J. 13 + 15] = mahuacensis

(Cereus)

Nr.

511. arvens (= meyeri) (Erdisia)
Peru. ^{schlank, buschig, lang best., gelbbl.}
[II J. 34] [30.000 H. v. I. 31.] [II J. 18] [Areguipa]512. squarrosus (Erdisia) kl. 8-rippig
Peru. ^{tree III. 1930 [wahrnehm. noch im III.]}
[Areguipa [II J. 19]513. fascicularis (Trichocerc.) gelbst. dickt,
Peru. ^{XII 1930 [Same noch im III.] sehr schön.}
[1500 H. v. I. 31.] [II J. 16] [Areguipa]514. acanthurus (Borricactus) XII 1930.
Peru. [III u. IV noch Same.] [= doelenhorst]515. aurivillus (cf. Lima) (Borric.) gold-
Peru. ^{gelb hart best.} XII 1930. [III. noch Same.]516. melanostele (= Pinguicula) St.
Peru. ^{dickt gelb best. oft mit wala (färbt er emorgi);} XII 1930. [III. + IV. noch Same.]517. acanthus (Pinguicula) stark
Peru. ^{bewehrt; St. hell} XII 1930. [III noch Same.]
[II 15] [Lima + Mahuacana]518. macrostela (Neoraimondia)
Peru. ^{schlank, grüne St.} XII 1930 [III noch
Same.] [schl. lange St. [60.000 H. v. I. 31.] [II J. 18]519. Neuheit (art. Miconia v. Gath.)
Peru. (Muster 5) sehr selten XII 30. [kein Same III.]520. Neuheit (Piptanthocerc. Argue) (Muster 8)
baumförmig, wenig best. 5-8 Rippen
[600 H. v. I. 31.] [später noch Same?]
[Areguipa [II J. 18]521. melanostichus (Loryocactus) rot
Peru. ^{stehend} [60.000 H. v. I. 31.]

(Cereus)

Nr.

530. *pasacana* (Trichoc. Form Boliv.)
 Bol. jungkräftig best. [250.000 H. vom I. 31.]

586. *pasacana cristata*. rötlich. Var.
 Boliv. [5000 H. III. 31.]

587. *pasacana* (vetra Villavén.) geht schon
 Bol. in die Kletterform mit grüneresp.
 Blüten. Blüht schon jung, rot. [35000 H. vom
 III. 31.]

599. *pasacana*-ähnl. (von Volcán.) kräft. Var.
 ohne Kletterform, mit wenig gelb. Kacheln,
 weißblüh. [20.000 H. v. III. 31.]

531. *bridgesii* (Trichoc.) [80.000 H. vom
 Boliv. II. 31.]

532. *tarijensis* (Trichoc.) riesige weiße
 Boliv. Blüten. [18.000 H. v. III. 31.]

533. Neuheit ähnl. *tarijensis* (von Loc. 2)
 Bol. (Muster 9) Trichoc. 7000 H. vom I. 31. mehr
 noch Lame? 13-16 Rippen. halbliegend

534. *Chaiarus lanuginosior* (Oreoc.)
 Bol. gelb. St. + lange weiße Haare [kein weit. Lame]
 [100.000 H. v. II. 31.] Bolivien

535. *Trollii* (Oreoc.) (Muster 10) gelb-rot. orange
 Bol. bis rotbraun best. 4000 m. Höhe dichtwellig
 [220.000 H. v. II. 31.] [kein weit. Lame]

536. ähnl. *Trollii* (von Potosí) (Oreoc.) rotbraun
 Bol. (Muster 11) Brunnennov. [kein weit. Lame]
 [400.000 H. vom I. 31.] auf 4000 m. hoch.

554. wie 536, aber vornieg. gelb. + lange weiße
 Bol. Haare [200.000 H. v. II. 31.] kein weiter Lame

(Cereus)

Nr.

537. Neuheit (ähnl. *Argisensis* von
 Bol. Argue, Bol.) (Eliostocactus) Best. d. H.
 Blüht rot, zahlr. [4000 H. v. I. 31.] [größer
 wohl mehr Lame.]

552. Neuheit (9-ripp. *Tupiza*) (Trichoc.)
 Bol. (Muster 15) baumförmig [50.000 H. vom
 II. 31.] 2000-3400 m. hoch. Blüht weiß, groß
 Boliv.

553. Neuheit (15-ripp. *Tupiza*) (Trichoc.)
 Bol. (Muster 16) baumförmig [40.000 H. vom
 III. 31.] blüht weiß, zahlr. 1900-3400 m.

555. *tupizensis* (Eliostocactus) dicht
 Boliv. gelblich od. bräunl. best. buschig, rot blüh.
 [60.000 H. v. II. 31.] [kein weiter. Lame.]

588. *Spreusii* (Eliostoc.) [1000 H. vom
 Boliv. III. 31. kein weiter. Lame]

589. Neuheit (von Curque) (Erdoria)
 Boliv. (Muster 18) [100.000 H. v. III. 31.] kein weiter. L.
 6-8-rippig in Längen, stark dachf.

566. *chalybeus* (Piptanthoc.) baumf.
 Argentin. bläul. dachgrün [90.000 H. v. III. 31.]

567. *conyne* (Idesoma) [1000 H. v.
 II. 31.] [wohl kein weiter. L.]
 Argent. [130.000 H. v. II. 31.]

568. *Teysscherii* (Trichoc.) große
 Argent. [kein weiter. Lame] [20.000
 H. v. III. 31.]

569. *Bouplandii* (Eriocer.) (= *Harrina*)
 4-6-rippig, halblieg., rotbraun; große
 weiße Bl.

(Cereus)

Nr.

570. Baumannii columbinus (Cleistoc.)
Arg. schlank, vielrippig, dicht u. zart best., mit
lang. rot. gebog. Rippen. [400 K. v. II. 31.]
608. Baumannii flavipinus (Cleistoc.)
Arg. goldgelb, dichtst. schlank [8000 K. v. II. 31.]
609. Baumannii (plisse var.) (Cleistoc.)
Argent. [20.000 K. v. II. 31.]
571. smaragdiflorus (Cleistoc.) (ähnlich
Baumannii) [8000 K. v. III. 31.] [kein weiterer L.]
Argent.
598. Neu? (niedrig von Volcán) Trichoc.
(Muster 14.) (ähnlich Lampochloa) kräft. Wuchs
[1000 K. v. II. 31.] [kein weiterer Name]
600. hyalocanthus (Volcán) (Cleistoc.) (nahe
verwandt Cer. praecox, fast weissperl.
mit gelb. Zylinderst. [30.000 K. v. III. 31.] [kein
weiterer L.]
610. portaiensis (Eriocer.) schlange-
artig mit groß. weip. Blüthen [12.000 K. v.
II. 31.]
611. coeruleus (Piptanthoc.) blaugrün
Arg. schlank. [= Cer. actinopsis?] [3000 K. v. II. 31.]
612. coeruleus melanocantha (Pipt.)
Arg. pechschwarz st. glänzend. [20.000 K. v. II. 31.]
613. validus (Piptanthoc.) [Form von
Cer. Jamarum] lange gelbst. blaugrün
kräftig. [60.000 K. v. II. 31.]
614. candidus (Trichoc.) buschig,
mit kräft. gelb. Nadeln. [5000 K. v. II.
31.]

(Cereus)

Nr.

615. strigosus (Trichoc.) buschig,
Arg. dicht gelbbraun best.; große Blüth. [10.000 K.
v. II. 31.]
616. thelegoroides (Trichoc.) kräftig,
Arg. baumförm., starke gelbst. [60.000 K. v. II. 31.]
617. erythrocephalus (Denmorea) kugl.
Arg. rot best. [3000 K. v. II. 31.] (Londreg)
625. melanostele (hartst. var. von Lima)
(Binghamia) [10.000 K. v. I. 31.]
schl.
575. corethroides (von Lautub. d. Cebres
Arg. ähnl. Echinocact.) (Trichoc.) busch.
(falschlich 40% werd.) (Bog. 50%) lang dicht
best. weisse bis gelbe u. hellbraune varie-
gation. Blüth. 1/2 m. groß dunkelrot
[160.000 K. v. II. 31.] [kein weiterer L.]
546. (wie 575, aber rotbraun best.)
Arg. [50.000 K. v. II. 31.]
464. serpentinus (Tellospan) (Nygoc.)
654. Cereus Ocampois (Guerrera) (Gyloc.)
701. Cereus maculatus Weing. 1932 (Guerrera)
Kanthoc.
702. Cereus, ähnl. tuberosus, sehr klein (Guerrera)
S. Wilc. Schmollig in II S. 22.

(Cereus)

m.

657. *Cereus grandiflorus irradiatus*

Lochneria
338. *Poselgeri*.

M. Coryphantha.
31. valida. (blüht April)

32. Palmeri.

100.) scolymoides (Ramus & Nees)

101.) difficilis (Hipolito)

102.) ahul. difficilis (Leguin)

103. Vaupeliana.

105.) macromenis

M. (Coryphantha)

128. Tamarensis.

130. pseudoclinus. (Hipolito)

131. Bergeriana.

132. Andreae. (Hasegawa)

133. cornifera.

134. radians.

135. macrochele (Curo)

136. macrochele (schwarz, Tamaulipas)

Nr. (Coryphantha)

153. Herdermannii.

154. Nickelsiae. (Paredon, Pau. striate,
Rinconada, digueros.)

155. gladiospina.

161. erecta. (Queretaro)

163. (Boed. Nr. 126) (Chul. Nickelsiae; 4 Cieneg.)

164. speciosa (Sardinas.)

227. Roederiana.

231. Durangensis.

Nr. (Coryphantha)

251. Chul. difficilis (Leguin) cristata

259.) Ottomii (Boed. #143) Gto + Zno.

260. strobiliformis ^{Neolloydii?} durispina cristata

33. strobiliformis durispina.

x
156. strobiliformis rufispina.

98. (Boed. Nr. 60) Chul. conoidea (Rayon)

99.) conoidea. ^(Neolloydia) (blüht Anf. - Mitte April)

225. ceratites. (Neolloydia)

104. Chaffeyi. (Cieneg.)

(Coryphantha)

- Nr.
129) grandiflora (Zammarini)
- 165) (Boed. Nr. 5 + Nr. 131. ähnl. Runyonii)
(von der Paila, Yucatan, Aufels, Reata, Monclara
Gebirgsart, Loah.) (Blüte April.)
176. asperispina (Neuberger, Argentina)
206. Runyonii ^{Econobrya} (Ebene, Tiefland) (N. L.) (blüht
etwa Mitte April.)
207. Lloydii (Neueit Est. Calallo, Euphratgeb.)
(Boed. 130 + 180.) = ~~Zilziana~~ Boed. 1930.
236. conoidea (Var. mit 1 Zentralst.
von Nuevo-León.)
239. conoidea tulensis.
301. pallida. (Tehuacán.)
235. odorata, (neu) (hakige von Tacacoles)

(Coryphantha)

- Nr.
409. ~~(ähnl. strobilif. Virens)~~ (strobili-
formis durioquina von Virens)
451. echinoides.
452. Georgii.
453. ähnl. erecta (weiss) Gt. Boed. 259. ~~schwarz~~
454. raphidacantha (hakig.)
455. raphidacantha radicansiformis.
(geradesackl. S. L. P.)
478. echinus (4 lieuegas)
480. (von Toluca, hakig. Boed. Nr. 260) asterias.
479. Boed. 274. (San Pedro.) (= Neueit.)
487. ~~Labi~~ Dyckiana (Chihnahua.)

(Coryphantha)Nr.

498. *neomexicana* (Lordsburg)
 648. *recurvata* (Nogales)
 499. *dasycaantha* (Enobarria Lordsburg)
 625. *elephantiden.* (Guerrero)
 703. *elephantiden cristata* (Guerrero)

Dasylicion

108. *quincifolium*.

Echeveria

191. (gewöhnliche von Saltillo)

322. (Art von Real del Monte)

388. (Mehlige Rosario) *puberulenta*.

389. (Rosario, grosse) (Muster 58)

390. (Rosario, kleine gruppige) (Muster 59)

Nr. 404. (von Estanque Caballo.)

405. (gerühblättr. von Saltillo)

421. (grosse, rotandige von Mexico)

422. (dickblättr., sechszipfliche von Queretaro)

Nr.*Echinocactus*

16. *uncinatus* (Fero)

14. *Likierii* (Amistec)

18. *megarrhizus* ^(aus Mex.) (blüht d. 2. - Febr.) (Gr. ab II.)

19. *longikamatus* ^(Ramapocactus) *crassispinus*.

20. *longikamatus* *sinuatus*
 (Monte Rey) (Ernte bei Monte Rey. etwa Nov. Febr.)

21. *texensis*. (*Homalocophala*)

88. *longikamatus* *papyraceanthus*
 (von Jaumave)

110. *longikam.* *crassisp.* (Coete Leguin)

(Echinocactus)

Nr.

124. corniger (rot.) (Teroc.)

252 corniger flavipinus.

188. brevikermatus. (Amistec.)

14. horizontalis. (Cephalocact.)

15. ^{ingens} ~~Sattillensis~~ (ingens palmeri) (Cephalocact.)

50 pilosus. = pringlei (Teroc.)

86. ingens platyacanthus.

122. ingens (Hidalgo.)

(Echinocactus)

Nr.

222. grandis.

121. gussonii. (Cephalocact.)

220. pilosus (extra von Est. Lebello.)

87. echidna ^(Teroc.) (braun, Victoria)

208. echidna (gelb Hidalgo.)

192. electracanthus. (Teroc.)

223. robustus. (Teroc.) (Tehuac.)

250. recurvus. (Teroc.) (Tehuac.)

253. flavovirens. (Teroc.) (Tehuac.)

(Echinocactus)

Nr.
22. multicosatus (Saltillo)

23. phyllacanthus (Saltillo)

142. Lloydii.

194. cottonogonus.

196. Vaupelianus (Hemec.; östl. Quer.)

263. multicosatus cristata.

189. Schmiedickeanus. (Hrombo)

195 turbiniformis. (Hrombo)

(Echinocactus)

Nr.
8. lophothele261. lophothele longispinus (Rembo
Tiebla)

262. lophoth. longisp. cristata.

273. ~~lophoth.~~ rimcondensis.274. (angeblich Macdonellii, aber
Lame wie der von heteridrophorus)

9. Beguinii (Neollöydia)

264. Beguinii cristata.

265. Beguinii senilis.

Nr. (Echinocactus.)

10. *Maddovellii*. (Echinocactus)

11. *durangensis*. (gelblich blüh. Var.)
(Same bei Reata etwa 20. April)

168. *durangensis* (rot blüh., kräft. Tetilla)

12. *bicolor*. (Theloc.)

13. *bicolor* (von Paredón.) (Same etwa Ende April,

55. *bicolor*, (flach von Encantada)

56 *bicolor montemorelensis*. (= *hetero-*
chromus) nach Böd. (cf.)

224. *bicolor bicolor*.

44. *Büchii* (Rayones)

Nr.

125 *Büchii* (Ascension)

57. *Lauerii*. (*Neolloydia*)
(blüht bei Zaunmure [Cerro
Troxado bei Karoma] Ende März)

82. *Wagnerianus* (rot und gelb.)

194. *Wagnerianus* (rot.)

83. *Roseanus*. = *Endl. roseana*.

84. *phyma Anthelos*. (Pereyra, Salte)

123. *leucacanthus*. (Theloc.)

(Echinocactus)

Nr.
171. *ridiculus*.

190. *Laussierii*.

210. *horripilus*. (Neolloydia)

211. ~~*Styl. lauscaranthus*~~ *ehrenbergii* (Quer.)

212. *fossulatus*. (N.-L.)

240. *hesaëdriophorus*. (Bocas)

243. *tulensis*.

299. *haematacanthus*. (Puebla)

300. *macrodiscus*.

(Echinocactus)

Nr.
256. *Valdezianus* (= *Telecyphora*
plumosa) (Same Indl III Dis IV.)

366. ~~*covillei*~~ *Guaymas* (Emory)

371. *fordii*. (Rancho Queretaro)

364. *horridus* (Böd. 248.)

369. *Orcuttii*. (Hamilton Ranch)

348. *peninsulæ* (Böd. 253)

368. *rectispinus*.

365 *santa-rosalia* (Rancho Ball)

370. *viridescens*.

372. *californicus* (Böd 249) (Yaraguan)

(Echinocactus)

N^o.
373. neu! (Bödd 251) (bläulichrot)
(Paraguay)

521. peruvianus (Drage) weiße, gold-
gelbe u. rotbraune Varietäten. XII 30. [noch
Lame im Frühjahr.] [II 4. 16]

522. Haynei (Matucana) große rote Blüten
[keine Lame im III.] XII. 30. [II 4. 16]

523. islayensis (Mollendo) XII. 30. [Kein
Lame im III.] rhöne Blüte.
[150 K. v. 5. 31.] [II 4. 11]

549. Vorwerkii (Neoverdermannia) sehr selten;
Poliv. roter Hakenst. [kein weis. Lame.] [190 K.
v. I. 31.] [II 4. 13]

550. Maasi (Parodia) rhöne Art rotblüh.
[40.000 K. v. III. 31.] [kein weis. Lame.]

595. Neuheit a. h. Maasi (von Cuzco) Poliv.
(- Bödd 524) große Art mit rötlich laugen, fle-
cken, halbgelben St. [4000 K. v. III. 31.]

578. micropermus gigantea (P. Tastil) a. h. l.
immer, aber größ. mit Hakenst. u. gelb.
Blät. [35000 K. v. II. 31.] [kein weis. L.]

577. Trimeri (cf.) (P. Tastil, kleine) (Bödd. 510)
(a. h. microperma) St. gerade, klein;
Blät. dunkelrot [20.000 K. v. II. 31.] [kein weis. L.]

579. Fröhlichianus K. Sch. (P. Tastil) (Bödd. 511)
[= curvianus] groß, weiß. Malagocarpus.
[50.000 K. v. II. 31.] [kein weis. Lame.]

580. Inezaxinii (= loricatus) (Bödd. 512) (Gym-
nocaulis) flach, rötlich. Antilegand
Arg. best. [3000 K. v. II. 31.] [kein weis. L.]

(Echinocactus)

N^o.
602. villosus (cf.) (Volcan, kahig) (Bödd. 520)
a. h. Nr. 578; jung mit Hakenst.; gelbrote Bl.
[3000 K. v. III. 31.] [kein weis. L.]

603. chrysacanthion (von Volcan) (gegen-
über Mahuap.) [170.000--200.000 K.] (kein
weis. L.) [v. III. 31.]

619. gibbosus (Gymnocaulis) St. samt
Arg. stark rot, gelb, schwarz [20.000 K. v.
II. 31.]

620. Peruvianus (Pyrrhocactus) sehr
Arg. kräft. u. lang bereitet [2.500 K. v. III. 31.]

621. ceratistes (Eriosyce) jung schwarz
Chile später gelb [100.000 K. v. II. 31.]

622. curvianus (Pyrrhoc.) dick
Chile. best. [1000 K. v. II. 31.]

414. crassicaule (W.) (= Mathesonii Berg.)
(= Feroc. Br. & Rose.)

456. anfractuosis. (Tultenango, Mexico) Bödd. 255.
obvallatus P. L. C. (nach Bödd.)

457. hestatus. (Tlaxcoapan, Cardonal, Caducanth)

458. violaciflorus (Canada Quer.)

459. setispinus (Victoria) (Lamalocant.)

(Echinocactus)

Nr.

460. Bodeker 254. (Querosen) (ähnl. Ehrenbergii)
kastiger Bod. u. Händ.

461. glaucescens (= Pfeifferi)

475. bicolor Bolanderi.

495. Winkleri.

496. Heranthemoides (Chihuahua)

493. Lecontei (Sonora)

626. Art zwischen Orcuttii u. californicus (Aquila)

645. Rosii (Alasca)

646 polycephalus (Wüste Sonora)

647 Art zwischen hornidas u. californicus (Punta Prieta)

Nb. Echinocereus

26. pectinatus tamaulipensis.

27. rigidissimus (verschiedenfarb.)

184. rigidissimus (rostrat.)

266. rigidissimus (violett.)

28. scopulorum.

51. pectinatus (Paradiestel.)

185. pectinatus Thilomus

Nr. (Echinocereus)
202. caespitosus (Paila.)

29. Blankii.

30. Ritterii (Zaunhauer.)

42. sarisophorus. (blüht Anf. April)

152. Ahnl. sarisophorus (Ech. Calabro)

43. conglomeratus. (blüht Anf. April)

52. leonensis.

53. Knippelianus.

Nr. (Echinocereus)

54. De Lactii. (blüht Ende April; Same
Ende Juni)

89. dubius (Rayones.)

127. glycinophus.

186. armatus.

187. amoenus.

394. Ahnl. stramineus (Zartweiss,
von Fraile.)

343. stramineus (Ech. Calabro)

337. brandegei (Sch. Lucas) (gelb)

Nr. (Echinocereus)

378. (äthulisch Brandegeei von
La Magdalena-Bucht.)

380. Engelmannii

379. maritimus.

344. scirrus. (Lindero.)

413. pectinatus (var. von Lardia.)

415. rigidissimus (grünlich) (Saltillo)

462. pulchellus.

463. cinerascens (nicht glycyrrhophus) Canada.

473. Botteri (San Pedro.)

474. äthul. sarissonhous mit
zahlr. hellen Kacheln San Pedro.

Nr. (Echinocereus)

477. Merkeri (Saltillo.)

644. Brandegeei (braun, Porro Aleman)

658. coccineus

Nr. Echinopsis

547. huottii. rötliche weiße Blüten [35.000 H.
Boliv. v. I. 31.]

548. bridgesii. rötliche weiße Blüten [100.000 H.
Boliv. vom I. 31.]

590. Fiebrigii. flach, Stachel. [5000 H. vom
III. 31.] [kein weiser. S.]

591. Neuheit vielripp. von Tarija (Bödd. 514)
Ritteri Bödd. groß vielrippig, weiß best.
rötliche weißer Stachel. [270.000 H. v. III. 31.]

581. sylvestrii. (von Talta Bödd. 514) kugeln.
weißdackel. [2500 H. v. III. 31.] [kein weiser. S.]

618. leucantha. lange gebog. St., rötliche
Arg. Blüten [20.000 H. v. IV. 31.]

Nr. Encephalocarpus.

147. strobiliformis.

Epithelantha.

34. micromeris greggii.

193. microm. greggii cristata.

150. micromeris lutea (Liqueras)

258. microm. lutea cristata.

183. microm. fungifera.

391. micromeris typ (Saltillo)

441. micromeris typ cristata (Saltillo)

M.
446. *Euphrelantha* (Böd. 282) *Monderreg. var. unguispina.* (Böd. 1932.)

M. *Lerchenbergia*
178. *principis.*

Lobivia

540. *fervida* wild best. jung meist kakenst.
542. [45000 K. v. I. 31.]
540 = *Boliv.* 542 = *Argentina.* [kein weiter. L.]
541. *boliviana*, lang dcht best. [35000 K. v. I. 31.]
Boliv.

542. *peritlandii*, schwach best. [25000 K. v. I. 31.] [wohl kein weiter. Same.]
Boliv.

543. *lateritia*, [9000 K. v. I. 31.] [wohl kein weiter. Same.]
Boliv.

544. *lateritia cristata.*

545. neu! *Asocha-Tupiza*, (schwarz, jung lakig, Blüte gelb) Böd. 501 nicht *boliviana*, lang best. [1500 K. v. II. 31.] [kein weiter. Same.]

546. neu! *Porgo*, (Böed. 502 nicht *lateritia*)
Boliv. glänzend grün *Siegeli* [60.000 K. v. II. 31.]

548. *longispina* (Lugue), dcht best., schlackig, rotlich. [25000 K. v. III. 31.] [kein weiter. Same.]

(*Lobivia*)

M.

593. *Rozii* (Boedeker) neu (Villazon) *Boliv.*
(= Böd. 518.) [1000 K. v. III. 31.] [kein weiter. L.]

543. *thionanthus* (Winn. P. Tastil), große gelbe Bl. schwarze H. [10000 K. v. II. 31.] [kein weiter. Same.]

544. *thionanthus* (P. Tastil), wie vorige; große gelbe Blüten. ohne Zentrabst. [8000 K. v. II. 31.] [kein weiter. Same.]

Nr. Lophophora
59. Williamsonii (blüht Anf. April)

249. Williamsonii cristata.

Melocactus
524 Townsendii. XII 30. [im Frühj. noch
Lamm.]

Nr. Mammillaria
144. sphaerica. (Dolichotheca)

145. longimanua. (Dolichotheca)

37. hemisphaerica (Jaumea)
(Erflecht von N. L. u. Coak.)

38. applanata (Monterey). triebte
Dez. - Febr.)

39. Ritteriana. (Ligueros, Südseite)

40. macracantha.

41. melanocentra.

M. (Mamillaria)

60. meiacantha. (Same Inf. Juli)

61. Winteriae. (Pereyra)

92. chionocephala.

116. Zahniana. (Pereyra bei Saltillo.)

316. compressa (= cirrhifera) (Hemiquila)

138. compressa longispina.

139. rosea (Cardonal) (= Boed. 153)

140. rhodantha crassispina
(Real del Monte.)

M. (Mamillaria)

141. magnimanua.

142. sempervivi.

143. roseoalba. (Gammart-Victoria)

157. meiacantha (var. von
Rancho Nuevo.) (Boed. 139.)

158. Heyderii (grosse Var. Est. Labella)

159. Heyderii (Zwergform von Rancho
(= Boed. 142.)

162. Winteriae (Form von Placeres)

166. ähnlich chionocephala
(von Providencia)

Nr. (Mamillaria)

174. Parkinsonii

(fehlt) Parkinsonii cristata.

175. pseudoperbella.

201. bicolor (gewöhnl. Form)

215. uncinata.

216. Leliana.

217. Flammiana.

218. bicolor (langstachel.)

Nr. (Mamillaria)

219. tetracantha (statt kewensis)

230. Heyderi-Abul. (Durango)
(= Poed. 186.)

237. Lloydii (Boca)

237. elegans (runde var.) [Siehe II 132]

(fehlt) ~~Pödeker~~ ^(S. L. Mori.) 238. (cucigera) (Hübner-Lera)

270. Klissingiana.

^{sehr schön} 35. leoria (blüht Ende März)
(reift bei Fraile Anfang Juli)

97. pilispina.

Nr. (Mamillaria)

36. plurursa.

93. candida. ^{Mamillorhiza} (Rayones - Saltillo,
7. J. rosea.)

146. candida. ^(Mamillorhiza) (Jaume.)

94. pusilla + pusilla multiceps.
(Erichm. Dec. - Febr.)

95. lasiocantha (Olipolito) [+ Liencas]

143. denudata (Monclova) (Ext. d. Caballo)

96. Viereckii

137. ~~H~~ephyranthoides.

Nr. (Mamillaria)

147. ^{(Leptocladia) pr. echinata} elongata (gen. d. h. Forum.)

148. bocasana.

149. decipiens (Bocas) (Pseudomamilla)

198. Schiedeana.

199. pygmaea (Caderagta)

200. Humboldtii. (d. h. candida, Hg.)

226. lenta.

229. sphacelata.

232. longiflora. (Urainia) [II S. 45]

Nr. (Mamillaria)

233. mercadensis.

245. Neu (Bödd 189.) (Mexcala Gro.) ^{ihuk. occident.}
~~guerreroensis~~

269. albicoma.

268 Baumii. (Delichothela)

267. campyloche. (Pseudomamillaria)

303 carnea.

324 couxattii

289. elegans (Langebrecht + Grappig) ^[siehe II, S. 32]

313. Ferrerae.

304 Karwinskiana

Nr. (Mamillaria)

305 Karwinskiana cristata

280. microthela (Grense Das. Puebla)

290. mystae (Puebla) (= mutabilis)

308. Nunezii.

311. perbella (Toliman)

307. polyedra (Oax.)

323. viperina (Tehuacán)

325 rhodantha sulphurea.

329. Painterii (Queretaro + Jalisco)

328 Pringlei (Oax. Mexico)

Nr. (Mamillaria)

340. *armillata*. (Bödd. 224.) (hakig,
Santiago-San Lucas)362. *brandegeeii*. (Bödd. 246.) (hakig,
~~hart, Mulege~~) (Galact. calmalli.)339. *ceratloba*. (Bödd. 221.) (braun,
La Paz.) (hakig)358. *dioica*. (Bödd. 237+238.) (Nosthieste)356. *goodridgei*. (Bödd. 231.) (hakig,
Zart, Mulege)330. *matatlanensis*344. *peninsularis* (Bödd. 247)363. *petrophila*. (Galact. La Paz.)361. *Sheldonii* (Bödd. 242)341. *Schumannii* (Bödd. 218.)~~535~~
353. neu! ähnl. *Schumannii*
(Bödd. 219.)

(Mamillaria)

Nr.

342. (Bödd. 227.) (San Bartolo, ähnl. occident.)

354. (Bödd. 226.) (ähnl. 342, hakig, Novilla)

355. (Bödd. 225.) (ähnl. *armillata*, Laramiebulb.)

357. (Bödd. 236.) (hakig, Alaska)

359. (Bödd. 239.) (hakig, Johnson Ranch, gr.)

368. (Bödd. 240.) (hakig, auf Granit Mezquite)
Blomfeldiana Bödd. 31.

350. (Bödd. 229.) (Eruptingst. Comondú, hakig)

92 a. *chionocphala* (v. der Paila
mit blauem Zentralschkel.)407. *Mam. Gassieriana*.408. *Mam. Waltheri*.

(Mamillaria)

Nr.

419. Mam. pusilla (gelb)
 416. Mam. Kluvingiana cristata.
 414. Mam. Leboiana potosina.
 418. Mam. (ähnl. crinita N. Léon) = Nr. 238.
 423. microphelia. (Leptocladia)
 424. cephalophora.
 425. longicoma.
 426. = Boed. 261. (kurzkehige L.L.P.) trichacantha.
 427. = Boed. 262. (langkehige L.L.P.) ^{exochlamata} Kunkiana?
 428. = Boed. 264. (kehige Bernal)
 429. = Boed. 265. (kehige Canada)

(Mamillaria)

Nr.

430. = Boed. 266. (kehige Didores Hgo)
 431. = Boed. 267. (kehige Socumitu)
 432. = Boedekeriana.
 432a. Boedekeriana? Georgi Nr. 27. (Zaliscana?)
 432b. Boedekeriana? Georgi Nr. 30. (San Felipe)
 Retigiana (nach Boed.)
 433. Rettingiana? Georgi Nr. ? (Sierra Guenajuata)
 434. erythroperma.
 435. (Georgi 3+5) Fr. Miguel Allende, kefig.
 436. densispina gelb + braun schchl. (Leptocladia)
 437. densispina. goldgelb. (Leptocladia)
 438. densispina. weiss. (Leptocladia)

Mammillaria

Nr.

439. *Neckerei Spitziggo Michuettlan.*
(nicht zuzulassen) nach Boed. wohl neu
655. *Mam. Boedeker No. 502. von Teotihuacan Guerrero.*
440. *Mam. rhodantha. (var? von Bayer, L.L.P.)*
653. " *Halimaria, stark haarige,*
441. " *rhodantha chrysacantha*
652. " *perbella cristata.*
442. " *Boed. 268. (rubripina) Hammetonhag tea.*
629. " *solisii (Guerrero)*
443. " *caput medusae. (Guerrero)*
651. " *phelloperma (= Phellop. tetraantha) (Hama)*
444. " *chionocephala cristata.*
650. " *oliviae (Magdalena, Sonora)*
445. " *ähnl. crucigera von Tula, Tamps. Boed. 271.*
649. " *macdougalii (Nogales)*
446. " *ähnl. crucigera (= pseudoperbella) Villar, L.L.P. Boed. 270.*
494. " *fasciculata (Sonora)*
447. " *ähnlich Lloydii. Villa de Reyes. Boed. 273.*
448. " *Gleesiana, kurzstachel.*
449. " *Orcuttii, langstachel.*
450. " *Galeottii (= tetraantha Galeottii)*
481. " *melgareca. (Lobithothela)*
482. " *trichacantha, gelb.*
483. " *trichacantha, braun.*

Nr.

484. *Mam. ähnl. domidata (San Pedro) Boed. 275)*
485. " *ähn. Walteri (Viesca) (Boed. 283.)*
500. " *microcarpa (= frederici) (Landsburg)*
659. " *ähnlich*

Nopalea6. *dejecta (Victoria)*309. *Suberi (Daseara)*Oregonia58. *Deregrii.*

Nr. Opuntia.
1. truncata.

2. carduacea-Lloydii (Pursh) cf

4. imbricata.

5. leptocaulis badia (Zimmerer)

114. leptocaulis vaginata (lang-
stachel. Leguin)

115. leptocaulis brevispina (kurz-
stachel. Leguin)

113. obtuscula (Leguin) zwischen lept-
caulis u. imbricata, neu.

(Opuntia)
Nr.
79. perrita. (rosa, ähnl. truncata)

81. bulbospina (Loeb.)

164. ähnl. imbricata (bäumchen-
artig, kleine Früchte, Ros. Stippe)

205. Neueit (Berg 46) von
Esp. Laballo (Zylinder-)
wohl agglomerata Berg. 1929.

242. vilis. (grünst., ähnl. truncata)
(Kaktus, Loeb.)

276. purpura (Lacaze)

393. Moelleri Berger.

Nr. (Opuntia)

80. cereiformis (= gymnomia)
 254. cereif. cristata.
 382. Bigelovii
 381. invicta. (Lanzenop. ähnl. Echreus)
 383. molesta.
 384. prolifera, lachsfarben.
 386. tesajo.
 385. Thunberi.
 384. neu! ähnl. arbuscula. Niederhölz.
 352. aurea spina (La Pot.)

Nr. (Opuntia)

501. cylindrica. groß, gelbtachl., gefel-
 derte Triebe. XII. 1930. [+ Frühjahr]
 4. Form = 1 ft.
 502. floccosa. Rasen; dicke Wolle; gelbe
 Stacheln. XII. 1930. [+ Frühjahr]
 3.5. Form = 1 ft.
 503. floccosa denudata. fast ohne
 Wolle. XII. 1930.
 504 = 624 (kleine Cylindrop. von
 Arizona.) (klein Muster)
 Pentlandii? XII. 1930. [100 K. v. I. 31.]
 lange braune Stacheln.
 505. neu? (Cylindrop. von Chocoma)
 (Muster 1.) XII. 1930.
 525. Pentlandii (schnee weiß)
 kugelig [300 Korn von II. 31. kein Same später]
 Boliv.
 526. Pentlandii (gelb) [4000 Korn
 von III. 31. später vielleicht noch]
 Boliv. [2500 K. v. I. 31.]
 583. Pentlandii (stachellos) mit
 Boliv. gelb. Glockidenbüscheln; (winterhart?) [3000 K.
 von II. 31.] [kein weisser Same.]
 527. vestida. kl. oval- abgeflachte Trie-
 be; weisse St. [1000 Korn von I. 31. später
 Boliv. wohl kein Same.]
 582. neu. (Kugelop. von Cuzco)
 (Muster 19) [2500 K. v. III. 31.] [kein weisser S.]
 ca 3400 mm hoch. Pfl. unter Sporn, ca. 30 mm

Nr. (Opuntia)

584. (schwarze von Villazon) ^{Poliv.} Kugelig,
(Muster 21) [1500 K. v. III. 31.] [Kein weisser L.]
^{abst. oberer bei Mancos u. bei Puertatambillo}
558. Kaupiana, ^{Argentinien} lange, helle, gerundene
^{II. 31.]} Kugelpuntie. [2000 K. v. III. 31.]
559. (einstachl. von Abra Pampa) Kugelop.
(braun) (=Muster 6) ^{einsteckl. mit 1-2 Braun.}
[1400 K. v. III. 31.] + ^{Poliv. Kuglig.}
596. (neu?) Kugelop. wollig ^{Poliv. Kuglig.} Valcén
(Muster 20) [800 K. v. III. 31.] [Kein weisser L.]
^{bei 2 Worn. (ähnl. Nr. 582)}
604. abracantha (San Juan) ^{Poliv. Kuglig.} rissige
^{schwarze etc., kugl. [1000 K. v. III. 31.]}
605. ähnl. aorac. (Marán) lange blaue St.
[10.000 K. v. III. 31.] [1000 K. v. III. 31.]
606. strobiliformis. wie Tannenzapfen. [1000 K. v. III. 31.]
607. (Turpinii?) (Marán) zahlr. ^(Berge) niedrige,
^{breite, blattart. Bergamantack. [50.000 K. v. III. 31.]}
487. grahamii (cf.) (La Mojada, langstachelige)
630. spinosior (Lordsburg, Nogales)
489. clavata (cf.) (La Mojada, Ebene)
627. ramosissima (ähnl. Est. Calallo, Wüste Sonora)
(=terreolata)
632. fulgida, weiss (Sonora)

Nr. (Opuntia)

48. ähnl. arizonica ^(nahe Ortschaft.) (Brennstrüpe)
62. Lindheimeri (Zammarc.)
63. Lindheimeri (Loak. gelb)
64. utilis (groß, wein, ungleich-
blättrig, Nuckeinoch)
65. stenopetala (Zammarc.) ^{hängeh.}
66. stenopetala (extra Fraile)
67. (Berger 28) von Patagallana
Blattop. 1 Stach. abwärts)
68. (von Pereyra, liegende)
^{napacada etc.} ~~Engelmannii~~, var.
69. (von Pereyra, halbaufsteckend)
^{napacada etc.} ~~Engelmannii~~, var.

Nr. *Opuntia*.

70. *cantabrigiensis* (gelbe,
aufrechte von Encantada.)
71. (von Pereyre; aufrechte mit
rundlich. Blättern.) *phyllocantha*, var.
engelmannii
72. *procumbens* (weisse, lie-
gende Wüstenop.)
73. *ficus Indica*.
74. *microdesys major* (Pereyre)
75. *microdesys pallidior* (Jaume)
76. *microdesys rufida* (rot.)
77. *calochlora* (Hybrid *microdesys* und
Lindheimeri, Pereyre)

Nr. (*Opuntia*)

78. (von Ram. Hitze, wie nieder-
liegende von Pereyre, aber
bräunlichgelbblüthig.) *phyllocantha*
engelmannii
- * 112. (Art von *Peragallana*)
(reife Larven)
114. *streptacantha*.
118. *hyptiacantha*.
119. *leucotricha* (Var. *Cardonae*)
120. *leucotricha* (Var. *Jaumei*)
221. (Esbare von *Cardonae*)
241. *lasiocantha* (starkig
weissblüthig)
245. *Murangensis*

Nr. (Opuntia)
246. Blutrot best. Blattp.
(V. A. Calabro.)

247. Ritterii (Vom. d. Oro.)
(ähnl. Scheerii.)

286) pilifera (Vasaca)

326) candelabriformis
(~~orange~~, ^{weiss} Zentralplatten)

328) crinifera. (orange gold-
gell, dicke Stacheln, Zentralplatten,
(= senilis)

327) Dillenii (Veracruz)

310) robusta (graugrün, dicke,
runde Blätter, hellgell.) (Zentralplat.)

321) Scheerii (zart, gell.)

(Opuntia)
Nr.
349. pyrenacantha (La Paz)

585. ♂ neu. (gelbe Blattp. ^{Boliv.} ~~Guayana~~)
^{niedrige, gewundene gelbe St. [3000 H. v. II. 31.]}

563. sulphurea (Guayana) ^{röthl.}
^{best. niedrige Blattp. [4500 H. v. II. 31.]}

551. ähnl. sulphurea (Tupiza)
(Muster 23) ^{niedrige, lang weiß, stark. Blattp.}
^{op. gell. St. [2500 H. v. II. 31.]} ^{weiter kein}

564. ^{grünlich.} ^{grünlich.} ^{wenige lange St.; große}
^{Blattp. [2500 H. v. II. 31.]}

560. (kleinblüth. ^{niedrig} goldgell.)
(San Antonio Col.) (Muster 22)
[3000 H. v. II. 31.]

561. [wie 560, weiss P. Tast.]
[2000 H. v. II. 31.]

562. (wie 560 rotbraun ^{grünlich.} ^{grünlich.})
(Muster 22) [3000 H. v. II. 31.]

594. [wie 560, rose, ^{grünlich.} ^{grünlich.} Quiraca]
[1000 H. v. II. 31.]

623. (wie 560, bräunlichgell.)
Boliv. ^{Guayana} [4500 H. v. II. 31.]

(Opuntia)

- Nr.
306. klein, schmalblättr., weiss-
sackl. von Michuettlan, Pue.
465. amygdacea. (große von Salvatierra.)
466. spinulifera.
467. velutina. (Salvatierra)
468. tomentosa (Pateo, Mich. säuerlich.)
469. megacantha (Mich.)
470. tomentella. (Pateo, Früchte gelb, glöckig.)
472. ~~Engelmannii~~ ^{phaeocantha} var. von Figueroa.
488. Engelmannii typ. (Est. Caballo.)
635. basilaris (Nogales etc.)
636. littoralis (gelbe Blätter. Ensenada.)

(Opuntia)

- Nr.
638. covillei cf. (halbliegende Sonora)
637. occidentalis (braun. Blätterstacheln)
640. prolifera, (braun stechl. Rosario)
642. Stanleyi (= emorgii) (Hauptort. Son.)
641. prolifera (gelb, San Ignacio)
643. calmalliana (cf.) (ähnl. molesta)
633. cholla (braun, silberglänzt. Rosario)
634. cholla (goldgelb.)
639. arbuscula (Sonora)
631. vivipara cf. (ähnl. Thurberii Lordburg.)

Mt. Telecyphora.
(glumosa siehe Ect.)

420. Telecyphora arelliformis.

Pireskia.
556. sacharosa (Guemes)
Argent. ^{Beblätterte Sämling.} [4000 H. v. III. 31.]

Pfeiffera.
565. ianthomela. (zwischen Cerus
und Rhysalis, epiphytisch)
[25.000 H. v. III. 31.] (wohl kein weiterer St.)

Nr. Pilocereus
 203. Palmeri (fehlt in Berger) (Victoria)
 228.

228. chrysacanthus. (Berger: Enbl. n. Dase.)

314. polylophus. (Quer.)

302. ruficeps. (Tehuacán) (fehlt in Berger)

319. cartoriansus (V.-Cruz) (Berger: Peruvien
 Veracruz in Galapagos)

486. eupharbioides. (Tamp.)

Nr. Porfiria
 160. Schradtzi (= Maullaria)

Quilbentia
 554. Flavica (Belenia) [15 H. v.
 III. 31.] (ähnl. Peirokia)
Argent.

Rebutia
 538. pygmaea. winzig. [kein weibl. Bl.]
 Boliv. [1500 H. v. I. 31.] [Nach Backl. Lobivia]
 539. kleinmannii. etw. größer
 Boliv. [kein weibl. Same.] [7000 H. v. I. 31.] [Nach
 Backl. Lobivia] [II. 4.]
 594. Peru. (Escayache ähnl.
 Boliv. kleinmannii) (Böhl. 521)
 [1900 H. v. III. 31.] [kein weibl. Same.]
 681. muscula. kleine, fast gelbe
 Argent. weibl. best. Köpfe. [2500 H. v. III. 31.]

Rhipsalis (N. Gatt. *Eurhipsalis*)
506. *cassutha*. XII. 1938.

Lolisia.
285. *pectinata.*

Yukha.
151. (von Agua Nueva)

401. (Blätter lang und schmaler)
(von Zabali)

402. yukkaartig von *Lignera*,
großer aufrechter Blüten-
schaft

Nr. (Yukka)

403. (ähnlich 402.) (von Est. Ceballo.)


406. yukka, bes. Art mit kleinen
Blättern; gross, von Figueroa.

Nicht bestimmte Gattungen
255. Zotol.

396. Orchideenartiges Gewächs,
aus dürren Gegenden, ein-
jährig, mit schön. Blüten.

395. huapilla v. der Paia, rot fleckig.

399. Agavenartig, von Hipolito, in
Haufen, mit Knollenwurzeln.



278.
279.
280.
281.
282.
283. Mam. furnana (ähnl. vatteri) Visca.
284. Mam. Galachol. 3 Prieta. Mederkeel.
285. " habig. Ha. Rivahia. nach Böt. idionia sp.
286. " Galachol. Overetaro, 2 dunde Tenkrabst. viel Nolle, ähnl. chionwa.
287. Ets. ähnl. californicus + 2 Kaker. wiste brura.
288 = 504 Mam. nicht. occident. nach Böt. d. d. d.
289 = 502 Mam. Telobagan, nach Böt. wohl neu
503 Cen. pergonimus (sp.) guero. (Nychter.)
504 Seloncer. vagans guero.

265.
266.
267. Mam. Wingartiana
268. Mam. Hamiltonhayter.
269.
270. Mam. ähnl. cruciger + pseudoniger (bly) Villan (P.P.)
271. " ähnl. cruciger v. Tula (bly)
272.
273. Mam. ähnl. Lloydii, Villan do Rega
274. Coryph. nen. 2^{te} Pedro.
275. Mam. roseocentra Böt. neu (San Pedro) (ähnl. demidata)
276.
277.

253. B.-C. *Ceto. peninsularis*.

254.

255.

256.

257.

258.

259. *Cer. Schwarzii* (*abul. exata*) (ulip. Gto.)

260. *Cer. aserian.* (Sakig. Toluca.)

261.

262.

263.

264.

241. B.-C.

242. *Sonora. M. sheldoni*

243. *Sonora. M. swinglei.*

244. *M. subcadensis* (Durango.)

245. B.-C. *Galactoch.*

246. B.-C. *Galactoch.*

247. B.-C. *M. peninsularis*

248. B.-C. *Feroc. horridus.*

249. B.-C. *Feroc.*

250. B.-C. *Feroc.*

251. B.-C. *Feroc. nenu. bläulichrot.*

252. B.-C. *Feroc. Rostii.*

229. B.-C.
 230. B.-C.
 231. B.-C.
 232. B.-C.
 233. B.-C.
 234. B.-C.
 235. B.-C.
 236. B.-C.
 237. B.-C.
 238. B.-C.
 239. B.-C.
 240. B.-C.

246. Mam. Ahul. deinsip. Quer: vill. deustopine. (Leptocladia)
 247. Mam., lakig, auf Granit, Bales: op. n. balsonors Bod. (Dehmer)
 248. Cato San Lucas: M. Schummeini.
 249. San Pedro bei La Paz; ähnl. Schum.
 250. Santiago, M. zwischen 248 u. 249.
 251. Str. M. cervalwa; La Paz
 252. Nied.-Calif.
 253. Baja-Cal.
 254. B.-C.
 255. B.-C.
 256. B.-C.
 257. B.-C.
 258. B.-C.

204. Theloc. Beg. Saktillo Hohenform (mex. var. conuli)
 205. Tricolosa = Blumen Op. cereif
 206. Gebirge bei Monterrey; Cocob. etwa wie Nr. 133: abwarten.
 207. ähnl. Baurii, gruppig bei Monterrey, Tiefland; scheint Neuheit.
 208. Theloc. ähnl. Tulensis, Gebirge über Piguera wohl nicht conothello.
 209. Jernware: Dolichothele melaleuca.
 210. meiacantha, 4 = stachel. Saktillo.
 211. Soliman; Theloc. Ehrenbergii (rotlich)
 212. (Cuebla) Ets. haenkeana thos.
 213. ähnl. elegans Ignacia Mejia (Dase): vill. microthele.
 214. hakig. Nam. Cadoreya: wohl echte xerophanthoides.
 215. hakig, Vaccinioides, Pue.: wie 214?

190. Tula: Ets. (Theloc. tulum.
 191. Hoya de pino Theloc. 21-stippig: vill. sp. n.
 192. Tehuacan. Cor. pallida Rose.
 193. Gto. + Zac: Cor. Ottonis.
 194. Quer. Cor. erecta.
 195. Caracoles, Tam. 2 rinken hemisph. + meiacantha: abwarten.
 196. Quer. M. letoiana (Coleomphar mit lang. Haaren): Letoiana.
 197. Caracoles: M. allisonae.
 198. Bolas + Chilpancingo: M. Monensis.
 199. Ram. Arizpe-Atsage: Ets. Valdeixianus (= Telecyp. plumosa)
 200. ähnl. Lanerii, Villar: Theloc. Knuthianus Bld. (Neolloydia)
 201. ähnl. rhodantha, 2 var. Bolas: M. denoioquina.
 202. Villar: Stenoc. albatu.
 203. Theloc. Beguninii, ganzhnl. v. von Saktillo.

147. Sandsteingebirge bei Saltillo; wie Esc. chaffeyi, aber gelb. nicht erhalten.
148. Sandsteingebirge bei Saltillo; wie Esc. chaffeyi, aber ganz rotbraun nicht erhalten.
149. Quer, soll. Gebiete: Hermos. Vauqueliniana.
150. wohl Form von Nr. 130, Gelb. Caballo, Schieferknigel: *Eulporiana* Bdd.
151. Bicolor murekenorelanaus. nach Bdd. Ets. heterochroma.
152. Ets. echedna, gelb. Hidalgo.
153. Victoria: Con. Bonwiggii Bupp.
154. Gelb. Caballo: Con. Palmeri mit 3 Fleckenst.
155. Gelb. Caballo: Con. pseudochroma mit mehr. Zentralst.
156. Haydeni-artig. Durango. abwerten.
157. Varacoles, Tam: Con. odorata Bdd.
158. *Neolloydia convida* Tulensis (Tula)
159. *M. chil. occidentalis*, Morcala + Balsas: sp. n., abwerten. *quadrivittata*

164. Quer: *M. pseudonoveboracensis*.

165. *M. Aquissapalica*, Tiefland von N.-León + Coah. (Enrichte zimocherrot da unter der Bild. 142 auch Folien von *hemipylus* sein. konnten so werden. Die 166 (= 142) Zwergform von *Legden* von *Campeche*. Enrichte violettrot.)

167. Fels Sandstein. Saltillo; Anastrotrac. brevicausta. (Anastrotrac.)

168. Anastrotrac. Lichen: Saltillo.

169. Hidalgo Sierra templada: *Theloc. hemipylus*.

170. Argentiniana: *Neolepsya asperipylus*.

171. Hidalgo: Mam. Kumboldtii. (Ähnl. candida)

172. Hgo. wirgurea Zone: wird wohl *M. bicolor* sein, nach Bdd. aber *M. Colosiana* var. *potosina* 1724.

173. Hgo.: *M. Lichidea* n. sp.

174. Quer: *M. Colosiana* var. *potosina*.

175. Quer. M. Herrerae.

176. Quer. *M. parkinsoniana*, abweichendes Geocomplex.
Nach Bdd. *Colosiana* *potosina*.

152. *M. magnimanima* (Hauptstadt)
 153. *M. rosea* (Witt. Cordonal)
 154. *M. rhodantha* (Real d. Monte)
 155. Hg. + Quer: *M. heneris* (= besser wohl *tetracantha*)
 156. *M. rosealba* (Victoria)
 157. *M. crucigera* (M-León)
 158. *M. vrid. Galeana*: *M. sempervivi*.
 159. *M. vontrambleri*: wohl *sempervivi*.
 160. hahige von *semiquilpan*: *M. pubisquina* Böd.
 161. *M. pygmaea*. (Caderoyta)
 162. *Cor. scalyrnoides* (würtl. Nuevo-León + Coah.)
 163. *Spicata*. *Deloc. nidularia*.

140. *M. melanocentra* (Viguera)
 141. *M. heyderi* (St. Laballe) echt.
 142. Zwergform *M. heyderi* von Ocampo. nach Böd. *applanata*.
 143. *Sorfixia* Schwartzii.
 144. viell. *Nam. Delaetiana*.
 145. *Ch. Andrae* (Blascoapan)
 146. *Ch. echidna* (Hgo.)
 147. *Pachnca*, kählig: *Sten. tricuspidatus*.
 148. *Pachnca*, kählig: *Sten. tetracephalus*.
 149. *semiquilpan*: *Sten. pentacanthus*.
 150. *Blascoapan*, Cordonal, Caderoyta: *Sten. laetatus*.
 151. *M. compressa* (semiquilpan)

128. *Cor. schirrus* (cf.) (4 Lienegas)
 129. *Escob. strabilif. rufiopina.*
 130. *Escob.* Fruchtstängel *Cor. Caballo*, *El Estero*
 131. *Escob. Gebirg* *Bdd. Monclova* (= Nr. 5): abwarten.
 132. *Cor. Runyonii* (Tiefl. N.-León)
 133. etwa wie 132; gelbstachel. (*Mouderrey*): abwarten.
 134. *Ham. lenta* (4 Lienegas)
 135. *M. lasiacantha* (4 Lienegas)
 136. *M. denudata* (*Monclova*)
 137. *M.* (westl. *Monclova*, Schiefer.)
 138. *M. meiac.*, *Saltillo*.
 139. *äbul. meiac.* (*Rancho Nuevo, Coah.*): Blüte abwarten.

145. *Thel. phymatoschelus* (*Pereyra*)
 146. *Thel. rinconadensis* (*Rinconada*)
 147. *Thel. lophostele* (*San José*)
 148. *Äbul. M. rufiopinus* *rinconensis* [*Barrutillas*] *Jos. H. Langst.*
 149. *Äbul. M. Schereri* von *Lampazos*.
 150. *capric. mayori* (*Monclova*)
 151. *Cor. valida* (4 Lienegas)
 152. *Sardinas*: *Cor. speciosa* *Bdd.*
 153. *Lampazos*; *Cor. obscura* *Bdd.*
 154. *Cor. verdemarum*
 155. *Cor.* von *Cor. Caballo*, 2 Exempl. *äbul. Mich.* *Bdd.* *beobachten*.
 156. *Cor.* von 4 Lienegas, *äbul. Mich.* *Nickelsoiae* (nahe *Stadt*): neu.
 157. *Cor. pladiopina* (*Campo*)

102. *Mim. Kotschub. Hidalgo.*
103. *Theloc. Kotschub. Boca.*
104. *Theloc. Kotschub. forculatus, N. León.*
105. *Cor. Knitzig von Caderoyta + Knitzigulpan: clara.*
106. *Cor. Knitzig von Claocopan, Hgo: macrothela.*
107. *Cor. Claocopan: cornifera.*
108. *Cor. radians. Hgo. + Quer.*
109. *Mam. Winteriae (Gebirge Paradiestol): Winteriae.*
110. *Mam. macracantha-Form. (Boca)*
111. *Echrens. armatus.*
112. *Theloc. durang. Hipolito.*
113. *Theloc. durang. Est. Saltillo de Hillo.*
114. *Theloc. Socorro bei San Frisco, Coah.: unguisipinus ad. nuda.*

89. *Yucatan: capricorne aurea.*
90. *capric. maym (Rincon) + minor (Seguin).*
91. *Cor. Palmeri (Saltillo).*
92. *Cor. Januarenis, nach Béd. = Palmeri (Januana).*
93. *Cor. Roederiana (Saltillo).*
94. *Cor. zwischen 91 und 93, Argentina: C. Palmeri.*
95. *Cor. von Busamante, Tam.: macrothela.*
96. *Cor. macroneris.*
97. *Noll. dahl. conoidea, einschabl. von Ascención N. L.: mehr grandiflora.*
98. *Noll. conoidea von Brambieri, N. L.: conoidea.*
99. *Thel. Béd. von Ascención, N. L.*
100. *M. decipiens, Boca. Scleromamillaria*
101. *M. Kotschub. N. León.*

74.

78. *Cr. scalyuoides* (Ramm. Krißpe.)79. *Cr. difficilis* (Hippelids.)80. *Cr. a. h. difficilis* (Seguin) neu.81. *Cr. pseudochinus.*82. *Cr. Nichelsoiae* (Pardoll.)83. *Cr. Nichelsoiae*, ohne Zentralst. (Ramm. Krißpe.)84. *Cr. Nichelsoia*, ohne Zentralst., dicktsackl. (Ramm. Krißpe.)85. *Menocactus* von Tucantada.86. *Maruyil*, Jac.: *Sten. Röckermanus* Berger.87. *Menoc. multicastratus*: Saltillo.88. *Conc. del Oro*, Mann. Lloydii, nach Bod. *semperviv.*

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61. *Humanae. Col. Vampeliana.*

62.
63.
64.

38.
39. *Higuera. Ep. micromeres lutea.*

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

26.
 27.
 28.
 29.
 30. Juvenile. *Ech. echidna*. später eingegangen.
 31. Juvenile. *Theloc. Saueri*
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37. *Ech. von Rayones. Theloc. Buehii*.

14.
 15. *Eligueras. M. Ritteriana*.
 16. *Saltillo. M. chionocphala*.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22. *Ech. Roelans. Bdd. = "mexicana"*
 23.
 24.
 25.

Mr. Bestimmungsvorleser am Brädeker

1

2 Nam. Kalmiana. (Peru)

3

4

5 Yoc. Alh. Rungorui, Alipolito, Yucatan, St. La Salle, Sandoz.

6

7

8


9

10

11

12

13.





Coryphantha pseudochinensis Böd. 1929 (Parla)
Echinium Ritterii Böd. 1928/29 (Payson)
Mamillaria roseoalba Böd. 1929 (Tampico)
 " *Winteriae* Böd. 1929 (N.-L.)
 " *Zahniana* Böd. u. Ritter 1929 (Tampico)
Coryphantha Roederiana Böd. 1929 (Tampico)
 " *Werdermannii* Böd. 1929 (Tampico)
Mamillaria Ritteriana Böd. 1929 (Tampico)
Coryphantha Bergeriana Böd. 1929 (Tampico)
 " *Asperispina* " " (Tampico)
Porfiria coahuilensis Böd. 1927 (Tampico)
Coryphantha Vanpeltiana Böd. 1928 (Tampico)
Echinocactus (Thelocactus) Schmeidlerianus
 Böd. 1928 (Miquihuan, Tampico)
Ets. (Thelocactus) Lauerii Böd. 1928 (Tampico)
 (Ahuil. Beguinii)
Ets. (Thelocactus) Roseanus Böd. 1928 (Tampico)
 (Ahuil. Beguinii)
Ets. (Thelocactus) Munthianus Böd. 1930
 (Ahuil. Beguinii)
Mam. Blossfeldiana Böd. 1927 (Ahuil.)
Coryphantha Mühlbaueriana Böd. 1930
 (Zaunlaube, Tirock)

Coryphantha speciosa Böd. 1930 (Monclova, Coah.)
Coryphantha obscura Böd. 1930 (Tampico, Coah.)
Ariocarpus scapharotus Böd. 1930 (Payson)
Mamillaria pulvispina Böd. 1930 (Tampico)
Ets. (Thelocactus) plumosus Böd. u. Ritter
 (Tampico, 1930)
Coryphantha colorata Böd. 1930 (sehr selten, selten, La Paz, Coah.)
Coryphantha filifera Böd. 1930 (Tampico)
Mam. Balsasensis Böd. 1931 (Granit, Coah.)
Mam. Blossfeldiana Böd. 1931 (Tampico)
 (Ahuil. Beguinii)
Ets. (Thelocactus) Lauerii Böd. 1932 (Tampico)
 (Ahuil. Beguinii)
Ets. (Thelocactus) Munthianus Böd. 1932 (Tampico)
 (Ahuil. Beguinii)
Mam. (Hydrochilus) Neugartiana Böd. 1932
 (Ahuil. Beguinii)