Friedrich Ritter Tagebuch 86

Ritters Bezeichnung:	FR-Nummern-Verzeichnis mit Angaben Samenversand an Firma Winter Buch II
Seiten:	1–282 (einzelne Seite nicht beschrieben)
Land:	---
Zeitraum:	---
Bemerkungen:	Liste der Samen, die an die Fa. Winter versandt wurden + Beilage (FR-Nummern Brasilien + Gegenüberstellung FR – HU-Nummern).

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.



© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR-Nummern-Verzeichnis mit Angaben
Samenversand an Firma Winter Buch II

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR#

774 Sulcorebutia ~~cymosa~~ candidae sp. n. (Sta. Rosa #12 + Abtrieb Tiquipaya #1)

775 Sulcorebutia sp. n. (Rio Sta. Rosa, Mittellauf) mentosesii Cardenas

334 a Lobivia [schieliana] var.? (Oberh. Lt. Kabel)

(Echinopsis ~~Lobivia Haageana (?)~~)
360 a ~~Echinacantha~~ v. minor v. n.

(Echinopsis ~~Lobivia Haageana (?)~~)
360 b ~~Echinacantha~~ v. spinosior v. n.

776 Echinopsis ~~(cardenasiana Hoffm. & Backb.)~~ ~~var.~~ (Mapas #7) 400 K II.63;
350 b [Liste: Forma des Dpart. Tarija, siehe auch 350 b] cellecanthoblachia Card.

777 Echinopsis ~~oblaqueata~~ tapecuana R. (Narvaez + Tapecua) ~~(Sando)~~ 50 K I.63;
777 a (S. 252)

778 Echinopsis (cf.) sp. (Tapajtala #3) ~~(Tomaquapa #1?)~~
(778 a S. 202)

779 Echinopsis (non illoja var.) orozasana sp. n. (Orozas unterh. Padcaya) ca. 24.000 K
III 58

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR# 202

780 Echinopsis (mamillosa var) ~~Hamboensis~~ sp. n. (Narvais) ca 800 K. IV. 58
25,000 K. I. 63;

781 Echinopsis sp. n. (~~Argentina~~) (Capajtela # 23)
(1205)

782 Echinopsis silvatica (Tacuarandi) ca 2.800 K. IV. 58; ~~48000 K. I. 63~~;

783 Echinopsis rhodotricha var. (~~minor Ritter~~) ~~[illegible]~~ (Palmar Grande) ca 5.400 K. IV. 58; ~~17000 K. I. 63~~;
(783 a) S. 252) = 783
(783 b) S. 263)
(1205)

777 a. Echinopsis boyuibensis Ritter) ~~sp.~~ (Paso Blanco ~~Fuerte~~ Boyuibe).
(= 784)

478 a Echinopsis sp. n. (Comarapa # 14) [hervorgegangen durch Vermischung FR 378 (rg. sui) X 350 b (gebindgeb. var.) ? Name verschieden von 378.]

785 Echinopsis ~~oxygona~~ (Sta. Rosa # 13)

(786) Echps. comarapana (Su Fridro + Sipiraz Marguza) XII. 54
= 376 b ? ca 11.000 K (unter Nr 376 b als Echps. knottii var.).

786 a Echps. comarapana ? (Gegenüber Cotomayor u. Capajtela)

203

787 Echinopsis sp. n. (Abstieg von Palmar # 22)

788 Echinopsis sp. n. (Perez # 16)

789 Echinopsis sp. n. (Junta del Rio Mirgue # 5)

[790 Echinopsis sp. (Pulané, Millares, S. Inez)]
= 377 " knottii v. longispina.

791 Echinopsis sp. (Tomina)

792 Echinopsis sp. n. (Capachuy Nr 4)

(793) Lobivia ~~sp. n.~~ = ferox typ. (Sipiza # 7 Nach Westen, jenseits roter Berge)
= 98.

[794 Lobivia sp. (Velilles Nr 3) ~~[illegible]~~ ~~lobiviensis~~ = Nr 104]

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

204

#

(795) Lobivia sp. (Pap. Vdro-Culpina #11, ~~[illegible]~~) 490K II 63 –
(977)

796 Lobivia sp. (Salitre Nr 12)

797 Lobivia culpinensis R. (Culpina #10) ca 11.500K XII 58. III 62 ca 4.500K, –
4.200K XI 62 – 110K I 63 –

798 Lobivia ~~campicola Ritter~~ (Culpina #16) (+ #197)

799 Lobivia sp. (Culpina #17)

800 Lobivia ~~hardeniana Boed.~~ ~~[illegible]~~ (Vda. Rossini #11)

801 Lobivia sp. (Yamparaez #4)

802 Lobivia sp. (Yamparaez #5)

205

#

803 Lobivia sp. (Tarabuco)

804 Lobivia sp. (Tarvita #8)

805 Lobivia sp. (Pap. nördl. Sta. Fe) (siehe Nr 405)

781a Echinopsis spvar (Ingenasi #5)

806 ~~Echinopsis hystrichoides~~ ~~Lobivia sp. (Culpina~~ ~~[illegible]~~ ~~sp. (Culpina~~ #12 a. Cuva,)
(806 a S. 277)

807. Echinopsis sp. (Salitre #13)

808 Lobivia sp. cf. caespitosa (Cuillarillo #9)

809 ~~Echps (mucrosa)~~ ayopayana Ritt. cf. Rausch ~~Lobivia sp.~~ (Pap. Tiquipaya-Independencia #1) ca 1600K
VI 58.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

(810) 82b. Lobivia sp. n. (Torata # 14)
(Var. von nr 882?)
(Var. von nr 383?)

811 Weingartia cumingii v. d. (nicht Hoy.) (Cancapa)

811a Weing. cumingii var. (Laipina)

812 Weingartia (erinacea) sp. n. (Oruroga)

812a Weingartia sp. n. var. (Catacire)

813 Weingartia (riograndensis) ~~sp. n.~~ (Ste. Arce # 15) ca 2500 K XII 58 –

~~Lobivia ~~[illegible]~~ pulvinosa~~ lanata R. (nördl.)
814 (= 371) Weingartia ~~sp. n.~~ (Ste. Arce # 14 + Chuquichuquini + Potosi-Cayes)
ca 7300 K VIII 58 – ca 650 K XII 58 –

815 Weingartia (cumingii) sp. (Ste. Arce # 16) 220 K VII. 58. ca 1300 K XII 58 –

816 Weingartia sp. n. (Capajtala # 16)

817. Weingartia ~~fechelmiana~~ (Millero) ca 3500 K XII 58 –

373a Weingartia cinnamomea Ostl. Puente La Pedro.

818. Weingartia ~~spec.~~ vestii (Lulpina Lid.) ca 2300 K XII 58 –

819 Gymnocalycium ~~[illegible]~~ lamatum ~~[illegible]~~ (Palo Blanco) ca 22000 K. IV. 58 –
82.000 K II 63 –

820 Cleistocactus ~~[illegible]~~ jujuyensis ~~[illegible]~~ (Bolivien)
(La Merced + unterh. Alto España) 45.000 K II. 63

603 Cleisto c. lanicaulis ~~pluvinosa Backb.~~ (K. Sch.) (Agopaya) ca 17.000 K. VI 58.
603a
S. 171

353b. Cleistocactus (Hypsochlorus Cl. ayacucheensis Card. + Cl. Vorwinianus Card.) Cleichenii v. ayacucheensis (Hl. de Resini)

353c Cleistocactus Cleichenii v. (nov.) (Kuscochiki) (Atzig nach Potosi-Cayes)

321 Cleistocactus mungrinensis (Mugrina) ca 2700 K. VII. 58.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

#

822 Cleistocactus sp. n. (Oberh. Materal #6)

823 Cleistocactus fusiflorus (cf) (Tomarapa – Perez) 500 K VII 58.

(824) Cleistocactus luchtenii forma. ~~oligogonus~~ (Sidl. Lotmayor) ca 6.000 K.
=353c VIII. 58.

825 Cleistocactus sp (Millares) pilcomayoensis Rit.
ca 7.000 K XII 58 –

826 Cleistocactus tominensis (Tomina)

~~827~~

827 Cleistocactus chrysacanthus (Sopachuy)

827 a Cleistocactus chrysacanthus v. multiareolatus (Tarija)

828 Cleistocactus sp. n. capadalensis Rit. (Capastala)

[859 = 67 tupizensis Cleistocactus ~~lilliegardiae~~ sp. n. (Lamblayllico #8)

#

829 Cleistocactus ~~spotianus~~ (crassicaulis Cort. Zipa bei Morgarita) (Villamontes) ca 7.000 K IV. 58. –
87.000 K I 63 –

829 a Cleistocactus ~~spotianus~~ (crassicaulis Cort.) v. pancispinus (Rit. Volpana) – 105.000 K
II 63 –

830 Cleistocactus microgalus (Angostura d'Lomispiri)
ca 80.000 K III. 58. – 174.000 K I. 63 –

831 Cleistocactus (smaragdiflorus var.) roysi (Rit. Lara) (Entre Rios) 19.000 K I. 63 –
(1146)

112 a Cleistocactus glaucus v. plurispinus (Mirdg. Caracato).

832 Cleistocactus luribayensis (Caracato) ca 3.700 K VIII 58.

833 Cleistocactus sp. n. (H.de Rossini, finsterblige)

834 Cleistocactus ayopayamus (Puente Pilatos) ca 22.000 K
VI. 58.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

835 Cleistocactus sp. n. (Hoken bei La Cabel) pallaugensis v. camachoinsis cf.

836 Cleistocactus ~~sp. n.~~ ~~azerensis Card 1961.~~ (Duarte Acero) ~~parapetensis var?~~

837 Cleistocactus sp. n. (Yacuiba)

838 Vatricenia guenthori (Marquesa)

839 Bolivicereus sp. ~~(also Cleistocactus)~~ brevicaulis Ritter (Mairana) 130K III 59.–

840 Bolivicereus ~~sp.~~ (Ste. Acero) 300K. VIII. 58.

~~841~~ Cleistocactus ~~bonnesii v. dolichinus (O) Rice~~ charoanus Ritt. ~~Bolivicereus charoanus~~ (Villamontes) ca 40.000K. IV. 58. ca 14.000 K II 59 (von ~~Dr. Ritter~~ Argent.) – 98.000K I. 63 –

(842) ~~Cleistocactus~~ ~~Bolivicereus~~ ~~charoanus var~~ charoanus forma. ~~Bolivicereus~~ (Margarita) ca 17.000K IV 58. – 7.800K I 63 =841

842 × 829 ~~Cleist. charoan.~~ ~~Bolivic. charoan.~~ × Cleistoc. ~~chagoicaulis~~ (Palos Blancos) Hybrid (Samenprob.)

843 Castellanosia cainena Card. (Villamontes + Juntas am Rio Pilcomayo) ca 77.000K. IV. 58. – 83.000 I 63 –

844 Monvillea chacoana R. (Villamontes + Palmar Grande) ca 800K. IV 58. – 7.800K I 63 –

845 Monvillea sp. n. (Palos Blancos)

846 ~~Monvillea~~ Hildewintera aureispina (Agua Clara) 350K VII. 58 ca 5.000K III 59 –

847 ~~Monvillea~~ Cleistocactus vulpis-cauda (Ste. Acero)

848 Eriocereus ~~sp. n.~~ (bonplandii ~~var.~~ ~~forma mit 4 kreuzf. gestellt. Mst.~~) cruciferus (Villamontes) ca 29.000K. IV. 58. =257

849 Eriocereus sp. n. (Marquesa #14)

850 Trichocereus ~~terscheckii~~ (typ.) + Erzgacht (oberh. Cienegillas) ca 17.000K IV 58. – ca 23.000K XII 58 – #15

714

212

#

851 Trichocereus (Cariçoensis var) Totorillensis (Lienguilla #5)
ca 37.000 K. II. 58. – ca 17.000 K I 59 – IV 62 ca 310.000 K.
26.000 K II. 63 –

852 Trichocer. sp. (Totorensis ined) (Yamparaez # 10)
(siehe 990)

853 Trichocer. ~~cryptocladus~~ ~~(S. Augusto (bei Tarija))~~ 3000 K II 63
(= 615)

854 Trichocer. sp. (Lopachuy #2)

855 Trichocer. sp. (Unter Pelnar #8 + über Mergusa # 27)

856 Trichocer. sp. (Ceionizpensis Ritter sp. n.) (Chuquilla # 9) – 860 K XII 58 –

857 Trichocer. sp. n. (Puente Pilatos # 1)

858 Trichocereus sp. (Cascabel # 8)

[859 = ~~tupizensis~~ 867.
siehe 1,208]

213

#

860 Trichocer. vollianus (Cochabamba)
~~(875)~~

861 tunariensis ~~Card~~ ~~1959~~ Trichocer. ~~sp. n.~~ (~~Umlacata, bei Lagu~~) 150 K VI 58.

862 Trichocer. sp. n. (Paß nördl. Sta. Ana)

863 Trichocer. sp. n. (Yamparaez # 7)

863a Trichocer. sp. n. var. (Tarvita) (+ ~~Yapajiaka # 2~~)

863b Trichocer. sp. n. var. (chuquisacensis) (Cueva # 7) 2.500 K II. 63 –

864 (= 745) Trichocereus sp. n. (Comarapa # 18)

865 Trichocereus sp. n. (Yamparaez # 6)

866 Trichocereus ~~pachanoi~~ (Samizipinnus var pajonalensis) (Mairaez # 1) 245.000 K I. 63 –
616

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

(867) =616. Trichocer.? lemnispinus sp. nov. (Tarija # 13 von 1958 + Tarija # 1)

868 Trichocereus ~~sp. n.~~ (Tarija # 10 von 1958) ~~(Andalgalá, Pilcao)~~

869 Trichocereus (cajasensis) ~~sp. n.~~ (Alto España # 9) 133.000 K. II. 63 –

870 Trichocereus sp. n. (Colpana # 11; Hollamarca # 3)

(871) =866 Trichocereus sp. (Narvais # 9)

[872 =15 Hetronia ~~tolburnia~~ coryne (Talmar Grande) ca 170.000 K. IV 58]

873 Hetronia coryne var. procera (Palos Blancos) ca 16.000 K. IV. 58.

874 Hetronia glauca (Margroza)

875 Lorrycactus azopeganus (St. Pilato) ca 9.000 K. VI. 58.

876 Lorrycactus pulquinensis (Tipina)

103 b Lorrycactus melanotrichus var.(?) (Caracato)

103 c Lorrycactus melanotrichus var.(?) (Mutit. Jamparaïz)

[76 a Pipanthocer.? forbesii (v. boliviana) mairanensis (Mairana) ca 6.000 K
=76 IV. 58.]

877 Pipanthocereus comarapanus Ctd. (Comarapa) 170 K. V. 58.
cl 11.000 K. III 59.

878 Pipanthocereus sp. nov. (Marada # 12 von 1958)

[879 Rhipsalis ~~hieronymiana~~ lorentziana ~~epiphyllum sp. nov.~~ (St. Acero)]
=M 362.

43 a Pfeiffera ianthothele var. (Entre Rios) 28.000 K. I. 63 –

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

216

880 Pfeiffera ~~varigensis~~ xanthoffela var. varigensis (Valle Concepción) ca 29.000 K. III 58.
12.000 K XII 62 –

881 Pfeiffera ~~gracilis var. floroza~~ (matoralensis var.) (Quiroga) ca 1600 K. VII 58.
(siehe 363)

882 Pfeiffera gracilis (Chiyllas) ca 3000 K. VII. 58. ca 3000 K XII 58.

883 Pfeiffera erecta (Abtieg zum Rio Negro #13) 110 K. VII 58.

[884 Rhipsalis ~~sp.~~ saferi (Yacuiba #1 + Plazuela)]
= 364

[885 Rhipsalis sp. ~~cancrifolis~~ (Entre Rios #2)]
= 365

886 Rhipsalis sp. (Tomarapa #8)

887 Rhipsalis (Xanthorhipsalis) menacantha (Yacuiba) ca 1.800 K. von III. 58.

888 Rhipsalis ~~inscha sinaver~~ [Pte. Acero #6]
(361) wohl samaipatana var

217

(889) Lubulatopuntia sp. ~~[illegible]~~ (verschaffeltii) (Cueva #5) + San Diego)
~~[illegible]~~ zu setzen = 410

[890 Lubulatop. (Abch.) weingartiana (Gitterpeanthal) (Tienequilla) ca 850 K. IV. 58.]
= 60 weingartiana.

[891 Lubulatop. ähnl. weingartiana (Abtieg zum Yamparäez na Pl.)
= 602 weingartiana cf (zweifelhaft, ob wohl eignetrt)
in Liste als spec. nov. oder weing. var. nov.]

892 ~~Lubulatopuntia~~ Cumulopuntia rossiana (Heinr. & Beck) Pl. & R.
~~Lubulatopuntia~~ sp. n. (Tulpina #13) adpressus K. 440 K.
V. 58.
↓
892 a Cumulop. ~~adpressa~~ ~~v. [illegible]~~ rossiana regionale Form oder Varietät. (Tarbe)
↓
893 Platyopuntia ~~sp.~~ discolor (Villamontes #11, Tomarapa #4)

894 Platyopuntia sp. n.? (Ma. Riza #~~11~~ 2 a) ähnlich cordobensis
sehr schmalriebig (fehlt bei v. Fito).

895 Platyop. ~~sp. n.~~ conjungens (Cajas #10) ca 950 K. IV. 58.
~~895 Platyopuntia sp. n. (Tomarapa~~

896 Platyopuntia nana sp. (Plazuela #5)
= 564
↓
897 Platyopuntia nana Tarapayensis (Rio Cajas #10) (Mairana #3)
= 564
892 b Cumulop. ~~adpressa var.~~ ~~rossiana~~ spec. vielleicht Varietät von rossiana, mit sehr kleinen Gliedern von F. Fobersh. La Cueva Prov. Sud-Cinty

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

#

218

(898) Platyopuntia nana sp. n. (Tacuarandi #5)
=897 = 564

[899] Platyop. salniana regionale Form Comarapa, Dep. Cochabamba
~~899 Platyop. Tunicata Lab. (Tarija)~~
↓ 452 : siehe 452

700 (Platyopuntia) sp. nov. (Rio Sta. Rosa #14) Mündung des Flusses
Platyop. cf. Brasiliopuntia Knuth (nicht publizierbar)

901 Platyopuntia sp. (Quiabaya) wohl Form von ficus-indica
↓ = 104
↓ 153 = var

702 Quiabentia verticillata Vpl. (Villamontes)
↓ 609 [siehe 609]

703 Quiabentia perezensis Bckbg. (Oberh. Juntas (am Mizque))

704 Peireskia diaz-romeroana (Abtieg. z. Rio Mizque #17)

705 Lobivia sp. (Paprocdl. Sta. Ana; etw. tiefere Lagen) oder Lincabarinea
(→ 1b) nr. 805 [angeben: „ähnlich 805, viel kleiner, dicker bestachelt"]

[906 ~~Lobivia sp.~~ Hymenorebutia (unterhalb Padcaya #6) (Orozas)
= 1170 Lob. pusilla von Angostura.]

219

#

[907] Pfeiffera sp. n.? (Sta. Rosa unterh. Sta. Ana)
~~363~~ vielleicht Varietät zu Pf. mataralensis.
[für Liste Pf. mat. var oder forma (Sta Rosa bei Sfa. Ana Bolivia)

(908) Tridocerus narvaezensis Card. (Narvaez)
= 866

909 Lobivia sp. (Aufstieg von Caracato nach Sgo. Atyo #13)

910 Haageocer. (Tantocerus) sectoniarum Bckbg. cf. (Tantocerus) sp. Lindl. Tandorchlicht #6 von
XI 58. ca 1400 K

911 Matucana (multicolor v. hybrida) sp. Wsh. unterhalb Galeras. (Klein Lasna)
↓ (142b) [564 M. rubrisa]
J. 46)

912 Parodia suprema R. sp. n. (San Antonio (Tarija)) ca 39.000 K
V 59 – IV 62) ca 45.000 K.

913 Parodia otuyensis R. sp. n. (oberh. Otuyo) 650 K XII 59 + V 59.

914 Parodia cardenasii R. (5 km über Puente Dilcomayo)
ca 29.000 K III 59 – 36.000 K I. 63 –

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

#

915 Parodia scoparia Ritter (unterh. Humahuaca) 60 K I 59 –

916 Parodia ~~aureicentra~~ (Backbg.) v. aureicentra (40 km ~~O Ac~~ (Tardi) ca 2.000 K II 59 –

916 a Parodia ~~aureicentra v.~~ varicolor R. (12 km nördl der Abzweigung nach Doma, nördl Cachi) 460 K II 59 –

916 b Par ~~aureic. a v. varicolor var~~ var. robustispina R. (Berge südl. der km 24 ~~O~~ Ac von Cachi)

916 c Parodia aureicentra v. omniaurea R. (unterhalb Cachi) ca 6.400 K II 59

916 d Parodia aureicentra v. albispurca R. (Berge 12 km südl Cachi) ca 12.000 K II 59 –

917 Parodia rigensis R. (Tr. Marana u. Humbicha) ca 32.000 K II 59 –

918 Parodia microsperma (Trancas) ca 40.000 K II 59

#

919 Parodia ~~Arbrichamata R.~~ (rufidi) nebelmanniana Ritt. (Lumbrera) ca 17.000 K II 59 –

920 Parodia ~~rubrichamata v. panic. Ritter~~ (rufidi) betaniana Ritt. (Betania) ca 21.000 K I 59 –

921 Parodia ~~R. ~~ ~~rubrichamata v.~~ (rufidi) ~~= kilianana Backbg.~~ (chlorocarpa) (Illojotoro) ca 9.000 K I 59 –

922 Parodia ~~[pentrianna]~~ aurispina var. [ ] (Puerta Mojotoro) ca 15.000 K II 59.

923 Parodia ~~glisochlorpa~~ ~~stiptra Backbg.~~ (Alemania) ca 5700 K I 59 –

924 Parodia rubristaminea (13 km westl Alemania) ca 60.000 K I 59 –

925 Parodia sp. (2,8 km über Alemania Samen größer und dunkler als Nr 924) ca 1.700 K I 59 –

926 Parodia ~~sp.~~ = kilianana Backbg. Leteracantha (Cachi # 6) ca 9.300 K II 59

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

222

#

927 Parodia sanagasta (Cafayate) ca 43.000 K I 59.

928 Parodia sanagasta var. minimiseminea (33 km südl. ~~Cafayate~~ Sta. Maria) ca 6.000 K I 59 –

929 Parodia sanagasta var. tenuispina (94 km südl. Sta. Maria) 220 K I 59 –

930 Parodia sanagasta v. grandiflora (Belen) ca 11.000 K I. 59 –

931 Parodia sanguiniflora (10 km östl. Cruz nach Andalgala) ca 46.000 K II 59 –

932 ~~(sanguiniflora var.)~~ Parodia comata (27 km über Tafi) ca 19.000 K II 59

933 Parodia rivosa (Chorrillos) ca 11.000 K II 59.

934 Parodia fenestrata (Hofe P. Tartil nach Sta Antonio bei 3000–3500 m, nicht über P. Tartil) ca 4300 K II 59.

223

#

Leucanthema Ranos var. coccineiflora Ritt.

935. Rebutia melachlora R. n. sp. (35 km nördl. Camargo # 9) 100 K XII 58 –

936 Rebutia ~~[illegible]~~ neocrispata R. (Abstieg Lopez # 8) 100 K XII 58 – 90 K I. 63 –

1116

937. Rebutia ~~[illegible]~~ salpingantha R. (Villazon # 15) 260 K XII 59 –

938. Rebutia ~~(Uebergangsvar.~~ ~~[illegible]~~ tinticensis (35 km nördl. Camargo # 14) 80 K III. 63 –

939. Rebutia ~~[illegible]~~ vulpina R. (Aufstieg von Tarija # 2) 160 K I. 63 –

940. Rebutia ~~[illegible]~~ fusca R. (Aufstieg von Tarija # 3) 420 K I. 63 –

941. Rebutia similis ~~(Hilbert~~ (La Stella nro) 270 K I. 59 –

941a. Rebutia similis var. (Aufstieg nach Lache) 75 K II 59 –

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

#

224

942 Rebutia repina R. (Chorillos) ca 2.400 K II 59 –

89 b Blossfeldia liliputana var formosa R. (Alemania)

943 ~~89 c~~ (=89 c) Blossfeldia ~~liliputana var~~ pilcantata (Rit. n. n.) 90 K I 59. – (38 km nördl. Alemania)

748 a Blossfeldia atroviridis var intermedia (Tucca) ca 5000 K XII 58. –

374 a Sulcorebutia tiraquensis (105 km ONO Cochab.)

752 a Sulcorebutia verticillacantha ~~v. rigispina~~ (Abtrg nach Jarotani) 210 K XII 58 –

944 Sulcorebutia ~~cinnamomea~~ cinnamomea Rauch (mittl. Totora) ca 2.400 K XII 58 –

945 Sulcorebutia mentosa (Aiquile) ca 3.300 K XII 58.

#

225

946 Sulcorebutia sucrensis (38 km westl. Sucre) #4

946 a Sulcorebutia sucrensis (X Lobivia? Hybrid?) 38 km westl. Sucre #3

947 ~~Echinocactus~~ ~~Echinocactus~~ gummifera 280 K IV 59 – (Serra da França)

948 Frailea ~~gracillima~~ gracillima (Lem) Br & R ~~Echinopsis~~ (Porto Alegre)

948 a Fr. ~~gracilis~~ gracillima var (leichte var) (Encruzilhada)

949 Discocactus hartmannii (Jhy-Aty, Paraguay) 700 K X 63 –

950 Discocactus ~~pl. ~~ (Diamantina) XI 64 340 K

950 a " pl. var. ad. sp. nov.

(951) =1334 Melocactus ~~violaceus~~ bahiensis var (Itamarandiba, Minas Gerais) 140 K III 59 –

952 Tarodia sanegasta (?) (24 km ONO Tacl. bei 3000 m)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

953 Weingartia sucrensis R. (Abtrieg zum Pilz Tal col.) (bei 2500 m)
200 K XII 58 –

954 Weingartia gracilispina R.

955 Rhipsalis houlletiana Lem. (Canela, Rio Gr. do Sul)

956 Pilocereus ~~gounellei var. ~~ (Monte Claro #3) ca 26.000 K
(S. 257) IV 59; XI 64 ca 3000 K;

957 Pilocereus densiaculeatus (Monte Claro #4) ca 4.500 K
IV 59; XI 64 ca 23.000 K.

958 Pilocereus azureus R. (Janaúba #5)

959 Pilocereus werderumannianus var. (Diamantina #3) ca 1.000 K
III 59; III 65 ca 850 K;

960 Pilocereus werderumannianus var. (Penha da França) XI 64 ca 9.100 K.

960a Pilocereus werderumannianus (Conceição)
III 65 ca 1.500 K;

~~961~~ Gymnocalycium guahlianum cf (Gran Chaco)

961 Gymnocalycium glaucum (30 km südl. Tinogasta)
ca 500 K II 59 –

962 Gymnocalycium lumbreresense (Lumbreras, Salta)
ca 2.000 K II 59 –

963 Gymnocalycium antherostele (Gral. Moldes) ca 7000 K I 59 –

964 Gymnocalycium antherosacos (13 km südl. Altamira)

965 Echinocactus bulbocalyx Werd. (with Mazán) ca 23.000 K
~~965 Echinocactus platyacanthus Rit. (Mator~~ II 59 –

431a Echinocereus ingens Br & R. (Catamarca südl. Hualfin) 80 K I 59 –

966 Echinocereus Br & R. (14 km oberh. Tafí) ca 54.000 K II 59 –

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

#

966a ~~Lochrensia~~ Echinocactus var. brevispina (Tafí u. unterhalb)

967 Acanthocalycium ~~Echinocactus~~ thionanthum (Grig.) Lack. 100 K. II 59.–

968 ~~Acanthocalycium~~ glaucum Rit. (7 km südl. Cafayate) ca 12.500 K I. 59.–

969 ~~Acanthocalycium~~ catamarcense Rit (33 km südl. Sta. Maria). ca 12.000 K I. 59.

970 ~~Acanthocalycium~~ glaucum Rit. (124 km südl. Sta. Maria) ca 7.700 K II 59.

598a Arequipa hempliana v. subspinosa Rit. (Abstieg von Tacna-Chacabaya bei ca 2600 m) ca 10.700 K V 59.
(598 S. 162)

~~599~~ 971 ~~Lobivia~~ Echinocactus (Echinocactus) (50 km östl. Cochabamba) ~~(Abstieg nach Cochabamba Höhe 3800 m)~~ Echinocereus pendoecinnabarina Lourcrotherii

972 Lobivia lepezensis (Calerato #7 von XI 58.)

#

973 ~~Lobivia~~ Echinocereus cinnabarinus Walterspielii Boed. (Betanzos) – ca 2900 K XII 58.

973 a ~~Lobivia~~ Echinocereus cinnabarinus Walterspielii var. sanguiniflora (südl. Puna) ca 1.500 K XII 58 –

973 b
↓

974 ~~Lobivia~~ horrida R. (20 km südl. El Puente) 960 K XII 58 –
(= 495)

975 ~~Lobivia~~ hystrix R. II 63 – (Aufstieg von Tarija) 3400 K XII. 62 – 28.000 K

[976] ~~Lobivia~~ potosina Werd. (Don Diego) 6800 K XII 58 –
= 98 ~~(bei Quillacollo, Uhlich, Villa Abecia)~~

977 Lobivia ~~#~~ aduncispina R. (Abstieg von Iquacabana #5) 40 K XII 58 –

(82 c) Echinopsis ~~Lobivia cinnabarina~~ cinnamomea cinnamomea f. brevispina (Villa Abecia + Puente La Pedro)
(= 381) ca 18.000 K XII 58 –
= 82 b

82 d ~~Lobivia cinnabarina v. brevispina~~ Echinopsis cinnamomea f. grandiflora (10 km südl. Villa Abecia) 30.000 K II 63

973 b ~~Lob. walterspielii var.~~ Echinocereus cinnabarinus var. boedekerianus Hort. (westl. Cochabamba)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 230

978 Lobivia sp. (chrysochete Werd.?) (Wolkenbeind. Huacalera)

979 Lobivia (N.-G. Lobivia) kirchchiana? sp. Rh. (cf.) (unterh. Humahuaca)

980 Trichocer. ~~Lobivia~~ pampanoides Rit. (50 km südl. Jujuy) ca 55.000 K I 59 –
[=55]

981 Lobivia (N.-G. Hymenolobivia) immatnigra Rit. ~~Lobivia aclenaa~~ (Paßhöhe nach Tres Morros)
350 K II 59 –

982 ~~Lobivia~~ Hymenorebutia drijveriana Bckbg. (ca 40 km östl. Cachi)

983 ~~Lob.~~ Echinopsis sp. ~~Haematanthelopsis~~ (30 km vor Cafayate)

984 Lob. schreiteri Cast. (Höhe über Tafi d. Valle) 390 K II 59 –
~~Hymenorebutia aurea (Bret.) Ritter var. callochrysea Rit.~~
~~nach Rauch aurea? fallax aurea var. callochrysea Rit.~~
~~(nicht Echinocactus Rit.) 15 km über Humahuaca #6+~~

985 ~~Lob.~~ Echinopsis ~~Stafeni (Br. & R.)~~ ~~(Wolkenbeind. Cachi)~~ (Cachi #9.
ca 15.000 K I 59 –

FR 231

986 Echinopsis rubeus (R.) (38 km westl. Tucumán nach Rosario)

987 Echinopsis tulriflora (Pfeiff.) (Trancas) ca 1.500 K II 59 –

988 Echinopsis Stafeni Br. & R. (30 km südl. von Tucumán nach Nord)

989 Trichocer.? bertramianus (Bckbg.) (Var. von tarijensis?) (Comanche.)

990 Trichocereus fotoriniri (Card.) Ritter (Straße Cachi b. Ca. Sta. Cruz, km 107) ca 23.000 K XII 58 –
(siehe S. 22)
(=71c)

991 Trichocereus scopulicola R. (24 km westl. Pelar Blanco (Hicker) #3)
520.000 K I. 63 –

992 ~~Trichocer.~~ sp. n. (Yocalla) ~~(24 km westl. Pelar Blanco #4)~~
40 K III 63 –

993 Trichocer.? terscheckioides (typ.) (Cafayate) ca 170.000 K I 59 –
(17)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR

232

#

994 Trichocer. sp. n. (Strape Acna - Marcia bei 3330 m) Lacnaënsis Ritt.

↓ 155a

995 Trichocer. sp. n. (24 km westl. Pelo Blanco)

996 Trichocer. sp. n. (64 km westl. La Puerta #3; 12 km westl. #2)

997 ~~Trichocer.~~ Lobivia (L. g. Hymenolobivia) purpureominiata Rit. sp. n. (112 km westl. La Puerta #4)

998 Trichocer. sp. n. andalgalensis (Neff Krowa) (112 km westl. La Puerta (kleiner) #3)

~~999 Trichocereus huascha (Chamaecereus 18 cf.)~~

(999 siehe S. 4) Tr. strigo. flaviflorus Tamatina ~~[var. strigosus]~~

= 13 b

~~999a Trichocer. strigosus longispina (94 km nördl. Huillería)~~

~~[var. strigosus]~~

(999 a) = 13 (= 1435)

~~130~~ ~~999b~~ Trichocer. ~~strigosus var.~~ huascha var. (31 km östl. Narán, Mazoy)

(999b) = 13 a in NFK 2428 andalgalensis cf.

233

#

1000 Facheiroa pilosa Rit. sp. n. (Jamacra) 400 K IV 59 - 370 K I 64

(1001 ist Puya raimondi Lomanda)

1002 Cleistocactus atuyensis Rit. (oberh. Atuyo) ca 70.000 K XII 58 —

59a Cleistocactus jujuyensis v. nivosus (Chorrillo)

59b Cleistocactus jujuyensis v. fulvus (Barcina arca) ca 13.000 K I 59 —

1003 Cleistocactus smaragdiflorus (Betania) ca 1.300 K II 59 —

= 147

= 27 „siehe auch 831 und 1146"

↓

1004 Cleistocactus sp. (Strape Caldera - Mojotoro, Lieguda)

1005 Cleistocactus sp. (Bahnbrücke Mojotoro)

1006 Pfiffanthocer. ~~Monthocarpus schum.~~ kleinere ~~Langstachl.~~ Form (Monte Lazero #4) 138.000 K III 59.

↓ 1489

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR # 234

1007 Piptanthocereus (bagaceus Rit.) sp. n. (Bagé, Brasil (Rio Gr. do Sul))
ca 3.000 K IV 59 –

1008 Piptanthocer.? glazziportazus Pfeiff. (Porto Alegre)
ca 13.000 K IV 59 – 92.000 K III.64 + II.65 – ca 51.000 K;

1009 (1424) Piptanthocer.? monoeticticus sp. n. (Florianopolis) ca 11.500 K
IV 59

1010 (S. 263) Piptanthocer.? obtusus (var. lanatus B.) Haw. 1821 / syn. [variabilis? Pfeiff 1837 +]
syn. pernambucensis Lem. 1839) Santos. ca 8.000 K
IV 59.

1011 (S. 275) Piptanthocereus calcirupicolus (S.-D. 1837) (Montes Claros)

1012 Piptanthocereus crassicephalus (Buinet Brd.) Ritter
sp. n. (Serra da França)

1013 [Pilocereus (sp. Lipocereus) pruinensis (Werd.) Backb. (Diamantina)
ca 15.000 K III 59; XI 64 ca 26.000 K] (ähnl. Monvillea)

1014 = 1173 Monvillea [rhodoleucantha (?)] (Corumbá)

1015 Monvillea sp. n. (+ San Bernardino + Capitan Bado, Rio Colorado, Prov. Amambay)
2.500 K X.63 – 153.000 K XI.63 –

FR # 235

1016 Monvillea sp. (K. Lely (non Monv.)) (Montes Laseros)

1017 Eriocereus sp. nov. (Rosario (Salta))

1018 (10) Denmoza rhodacantha var.? sp. nov. (?) (94 km über Hermosa)
ca 650 K I 59 –

1019 Denmoza decispanli (Doerst.) Werd. (37 km über Hermosa)

1020 Lorzyocactus ottuzensis Werd. 1963. (Ottuzo)

1021 → siehe 368 Mediocactus coccineus (S.-D. 1828) (Sierra Amambay)
= 1248 XI 64 ca 1.400 K.
(1248 a u. b S. 279)

1022 Epiphyllum sp. (Prov. Amambay (wolligo treolen))

1023 Hylocereus undatus (Santos, Brasil)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR # 236

1024 Haageocer? decumbens v. brevispinus (Höfen nördl. Ocoña #3) (= ~~Haageocer? Fauntocer? sp. Rauh & Bckbg. vrin. Ocoña, Lunaci?~~)

1025 Haageocer (Fauntocer?) caimanaensis (Rauh & Bckbg) (Abstieg nach Camaná)

megapotamicus var. alacriportanus.

1026 Notocactus ~~[illegible] cf. [illegible]~~ ~~[illegible] brasiliensis~~ (Porto Alegre) #4
140 K IV 59 – 130 K II 64 –
(~~[illegible]~~ ↓ ~~[illegible]~~ ↓ 1080) [1026 a S. 260]

1027 Notocactus arechavaletai (var. alacriportanus) Speg. 1905 (non K. Sch. 1905) (Porto Alegre) #3
↓ 1027 (S. 271) 400 K IV 59 – 680 K II 64 – II 65 ca 1500 K;

1028 Rhipsalis linearis K. Sch. (Canela, schmale, 2-3-kant.)

1029 ~~Lepismium~~ Rhipsalis sp. nov. n. (Sierra de Amambay (etwa wie epiphyllanthoides Bckbg, aber lange Glieder, Rippen allerdings verwischt, aber beipulvinigera genäß Bild Br & R. nicht der Fall ist.)
↓ 1184

1030 Lepismium cruciforme (Vell.) (3-rippig) (Florianopolis)
~~1183~~; cd 4.400 IV 59 – 1.600 ~~III~~ 64 –

1030a Lepism. cruciforme v. caverniorum (Lindb.) (2-rippig) (Lapa)
cd 1.500 IV 59 –

1030b Lepism. cruciforme var. [neu?] (4-6-rippig, Straße Porto Alegre nach Taquara Schotter 83 nach Süd)

FR # 237

1031 Rhipsalis crispata (Haw.) ~~pachyptera Pfeiff~~ (Florianopolis)

1032 Rhipsalis heteroclada (Br & R.) (Santos) ca 4000 K IV 59 –

1033 Peireskia moorei Br & R. (Corumbá) 50 K III 59.

1034 Quiabentia zehntneri (Br & R.) (Januaria)

1035 Platyopuntia rezatilis Rit. (ähnl. Q. ~~extensicaulis Werd.~~ inermis in Bckbg. Kdb. I S. 612) (Montes Claros) 290 K IV 59.

1036 Platyopuntia pituitosa Rit. (Montes Claros) 170 K. IV 59.

1037 Platyop. (vulgaris var) diamantinensis Rit. (Diamantina)

1038 Platyop. ~~bispinosa cf. (Back)~~ roborensis (Lárd.) Rit. comb. nov. ~~1910.~~ (Corumbá)
syn. Opuntia roborensis Cardenas 1940 (Cact. Suc. Journ. America 12, S. 32.)
(In Nomenklatur so einzusetzen, da Lar. bot. ~~nicht~~ erwähnt; unter Plat. intermedia sulphurea var. ist eigene Art.)

1039 Platyop. ~~[illegible]~~ (22 km Off. Lachi, rotbraunstachlig)
(↓ 38) (im Manuskr. genannt als wenigstens var.)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

238

FR
#

1040 Platyopuntia valgaris (Mill) (Porto Alegre) 130K IV 59.

(1041) microdisca reg. f. oder var. Platyop. ~~sp.~~ (Chorrillos)
↓ 423 „siehe 423"

(1041a) microdisca reg. f. oder var. Platyop. ~~sp.~~ (Arequipa nach Cachi, große Schlucht)
↓ 423 „siehe 423"

[1072] = 338 Platyop. ~~sp. n.~~ ~~(cornugatorar?)~~ oruensis (San Antonio, Boliv.)

554d Platyop. sochrensii var. ohne Benennung (Weg Tafi) (etwas nach Platyop. microdisca hin variierend) (39 km östl. Cachi + 27 km)
↓

(1043) Platyop. microdisca (Web 1898) (94 km nördl. Sta. Maria)
↓ 423 „siehe 423"

(1043a) Platyop. microdisca (v. Vrecholada) ohne Benennung von mir (Rekbg) (selbst) (Cachi)
↓ 423 „siehe 423"

↑ 554e Platyop. sochr. quaviolett bot. (v. Villazón) (südl. Tres Cruces)
(S. 239)

(1044) Platyop. microdisca (Web) Ritt. comb. nov. reg. f. oder var. 112 km nördl. La Huerta
↓ 423 syn. Op. microdisca Weber 1898 dict. Hort. Bois S. 896.
(siehe 423"

239

FR
#

652 ~~Tephro~~ Cumulopuntia pentlandii nach Cumulopuntia neocesensis hin variierende regionale Varietät ~~Platyop. dest gibber~~ var. nach ignescens hin (oberh. Vanduchita Boliv. bei 4300 m)

1045 Cumulopuntia galerasensis Ritt. ~~Tephrocactus fulvicomus Rebt & Backbg.~~ (Galeras #4)

1046 Maihueniopsis mandragora Back (= Opuntia Ritt. n. n.) ~~Tephroc. ~~ (Cuesta Castil, klein)

410a Cylindropuntia verschaffeltii (San Antonio (Tarija))

410b Cylindropuntia verschaffeltii v. digitata (über Tafi d. V.)
cd 1.000 K IV 59 —

1047 Cylindrop. sp. n. (?) (50 km östl. Cochabamba)

1048 Cylindrop. = weingartiana (don Diego)
↓ 60

1049 Tephrocactus bruchii (Spg. 1925) (westl. von Mazan)

↑ 554f Platyop. sochrensii var. transiens Ritt. ~~(nach rubra)~~ (Tiraman + Cocoroma + Zapahuira Tipparort)
↓ 554g Platyop. ~~sochrensii var. sp. n.~~ sochrensii var. grandiflora (Tw. Cueva u. Salitre)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR # 240

1050 Maihueniopsis leptoclada (19 km südl. Tres Cruces)

[1051] =66 Maihueniopsis hypogaea sp. {(Grenze Jujuy – Salta, Straße nach St. Antonio de los Cobres.)

1052 Trichocereus chalaënsis Rauh & Backbg. (Chala)

1053 Platyopuntia sp. (Rosario de la Frontera) (Baumne)

1054 = 260

22a Gymnocalycium quanchinense v. tinogastaënse (Tinogasta) 800 K I 59 –

22b Gymnocalycium quanchinense v. robustius (94 km südl. Chilecito) 52.000 K I. 59 –

1056 Chilecrebutia (durispina) sp. n. (Vallenar) ca 16.000 K XII. 59.

267b Dyssocactus occultus v. spinosior (Höhen Talfel Nord) ca. 2.300 K XII 59 –

FR # 241

1055 Dyssocactus zeatus (Morro Moreno) 450 K I 60. IV 65 240 K;

1056 ↓

1057 Copiapoa tocopillana (Colija) 180 K I 60.

1058 [Echinocereus Ritter] Echinocereus sp. (Valle Fondaliza, Höhen) III. 60 ca 1.000 K. [Echinocereus Ritter] Echinocereus hemicola Rauh et Backb.

1059 Haageocereus sp. (Quebrada nach Sayán) III. 60 ca 84.000 K. VI 64 ca 14.400 K. (vulgaris Ritter)

1060 Neoabocereus arduus (El Chagual) IV. 60 ca 56.000 K

1061 Echinopsis ~~pasacensis~~ (mirabilis v. primigena) (El Chagual, Prov. Tarata) IV. 60 ca 350.000 K

[670 Echinopsis mirab.?)

1062 Gymnantlocereus ~~sp. n.~~ ~~chagualensis~~ Trichocacanthus Rit. (El Chagual) IV. 60 ca 1.300 K.

1063 Matucana sp. (~~cinifera var.?~~ purpureoalba) (Arcapampa) IV. 60 – 300 K.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

242

FR.

1064 Mammillaria ~~sp. n.~~ pugionifera Ritt. (Chilete) IV.60 ca 3.000 K.

[1065 Thrixanthocer. ~~gracilis~~ cullmannianus (Ste. Crisnejas)]
(=564a) (Ritt. J. 137.)

1066 Weberbauerocereus ~~winteri~~ winterianus v. australis (Yantán) VI.60 ca 170.000 K
↓ 165

1067 Haageocereus ~~fulvus var.~~ yautanensis (Yantan #7) VI.60 ca 57.000 K.
↓ 584

700a Melocactus ~~longispinus~~ onychacanthus v. conicus (El Chagnal)
IV.60 ca 1.100 K.

700b Melocactus ~~longispinus~~ onychacanthus v. albescens (Ste. Crisnejas)
IV.60 ca 600 K VII.64 ca 10.400 K.

1068. Borzicactus ~~sepium~~ calvilomus (Unterhalb Chavin)
III.60 ca. 21.000 K. ~~VI.60 ca 1~~

569b Thrixanthocer. senilis var (Arica pampa)

243

FR.

1069 Thrixanthocer.? ~~sp. n.~~ longispinus Ritt. (El Chagnal)

1070 ~~Thrixanthocer.?~~ ~~[illegible] sp. n.~~ Borzycactus huincoënsis Ritt. (Huinco)

1071 ~~Borzicactus sp. n.~~ Borzycactus pilizianus Ritt. (Abtieg nach El Pallar)

1072 Matucana ~~sp. n.~~ formosa var. minor (El Chagnal, unten)
(=Ritt. 658)

1073 Matucana ~~sp. n.~~ superciliosa (El Chagnal, oben (Abtieg))

1074 Haageocer.? ~~sp.~~ zangalensis (Zangal #13)

1075 Faustocereus sp. n. erectispinus (Rauhe Bergkuppe) (Valle Churin, 2150 m)
= 147f

1076 Matucana sp. n. pallarensis (El Pallar)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR

1077 Cumulopuntia unguispina var. maior (südl. Chala) (Lomas)
~~Cumulopuntia sp.~~

577a Borzicactus purpureus Ritt. (San Juan, Dept. Illilote)
~~plegiochloid n. n.~~

1078 Borzicactus sp. (zampeneusis var?) (oberhalb Pariacoto)
VI.57 ca 22.000 K (Pariacoto)

1079 Peiresktia sp. nov. (El Chagual) (im Buch aufgeführt)

144+1067 Cryptangeix Haageoc. fulvus VI.60 ca. 3.300 K

1080 ~~Haageocereus~~ Pacecina pendralis (Quebrada Caminia 3400–3900 m)
ca 170 Korn IX 1960.

1081 Weingartia sp. n. (?) (Unterhalb Capajtala #19.)

1082 Weingartia sp. n. (?) (Südl. Lotomayor #6)

1083 Weingartia sp. n. (?) (feinstachlige von Perez)

FR

727a Parodia fulvispina var brevilanata (Tojo)
Nr. 727, als P. fulvispina ca 1.800 K XII 58 (gesamt unter

1084 ~~Echinocereus~~ Echinopsis cintilinis var (?) (Curgne) (nur Samenprobe)
82

1085 Pyrrhocactus scoparius Ritter (Chañaral, Südl. Huyglata, Hötel)
360 K X 62 –

517a. Chileorebutia malleolata var solitaria (Südl. Barquitos) (T. 56 nur Samenprobe nördliche Grundstelle)
(517 S. 153)

~~1085.~~ Cumulopuntia (regionale echinacea Form) Unterhalb Portezuelo Chapiquiña
148 b) bei 3500 m (wenigstachlig, früh blühende Art ähnl. echinacea)
~~mit anderen Pr. n. Samen~~

~~1086~~ Copiapoa ~~pseudocoquimbana var chonchensis~~ ~~sp. copiapoina~~ (30 km nördl. La Serena)
X 61 ca 9.000 K
[= 2475.81]

~~1087~~ Copiapoa ~~coquimbana var.~~ vallenarensis (Vallenar) XII 60. ca 8.000 K –
22.000 K IV 63 –
~~VII. 1000 1024~~

~~1088~~ Neoporteria vallenarensis Ritt. sp. (Maitencillo)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 246

(1089) =643 Echinopsis (herbarii Card.?) (Tarija #3 von 1954)

1090 (38) Platyopuntia sp. (cf. sulphurea (ohne Beschreibung) Chil. sulphurea Chil. #117) (Caja #12.) (im Museum genannt als region. Var.)

1091 Copiapoa sp. n. (?) (ca 18 km westl. Domeyko.) X 61 ca 750 K.

452 b Neoporteria clavata var. parviflora (Cuesta San Antonio) X 61 ca 4.700 K – 100 K 1964 – X 64 110 K;

655 a Neo. sociabilis var. napina (Carrizalillo) X 61 ca 1.000 K. 700 K X 62 –

508 a Copiapoa carrizalensis v. gigantea (Totoral Bajo) X 61 ca 26.000 K.

1092 Chileorebutia sp. n. tenebrica R. (12 km südöstl. Carrizalillo) XI 61 ca 6.400 K. XII 61 250 K.

1093 Maihuenopsis domeykoensis Ritt. sp. n. (westl. Domeyko)

506 b Copiapoa echinata var. borealis f. tenuiflora nulla (ca 16 km östl. Carrizal Bajo)

~~[illegible]~~ 444 a Gymnocalyc. schickendantzii f. cristata (Catamarca) III 62 ca 1.000 K.

444 b Gymnocalyc. schickendantzii var. (Quines) III 62 ca 270.000 K.

1094 [siehe 5] Hymenorebutia ~~echinopsis cylindrica~~ aurea var. catamarcensis R. (Catamarca 1450 m) III 62 ca 4.100 K. [notiert: siehe auch 5, 1095 und 1100]

1095 Acanthocalycium violaceum (Zapallar bei Quines) III 62 ca 5.000 K.

FR 247

46 f III. 62 ca 195.000 K. Parodia ~~ritterana~~ (v. schaferi) var. distortihamata (Mal Paso)

1096 Parodia ~~buiningiana Ritter~~ fechseri Backb. (Chamical) V. 62. 500 K.

1097 Gymnocalyc. sp. nov.? (Grupe G. bruchianum) (Termas Zapallar #4) III. 62. 360 K.

~~ovatus (Pfeiff.) Ritt. [illegible]~~

1098 Tephrocactus ~~ovatus (Pfeiff.)~~ (Challao) V 62 ca 460 K.

1099 Tephrocactus paediophilus (Cast.) (Patquia) V 62 ca 11.000 K.

~~2000–2099 sind Nummern von Nachträgen.~~

1100 [siehe 5] Hymenorebutia ~~Echinopsis sp. n.?~~ aurea var. lariojensis R. (Chamical) (notiert: siehe auch 5, 1094, 1095 und 1094)

1101 Hymenorebutia ~~Echinopsis sp. n.?~~ aquilensis ~~aquilensis~~ (Danzb.) Ritt. (Sierra de Quines oberh. 1000 m) 340 K I. 63;

1102 Weingartia (~~spec nov.~~ mamacarensis) (Mal Paso) 50 K III. 63 –

1103 Gymnocalyc. sp. n. (Sierra Quines #5.)

1104 Gymnocalyc. multiflorum v. parisiense (cf.) Sierra Quines #9)

105 Gymnocalycium spec nov (?) (Chamical #15, Höhe);

106 Rebutia colorata (~~var. chulchulensis~~ (Mamacar?) San Antonio #8 = Abstieg von Copacabana #7) (H. Kutz, Braun, Rote Rubin) 130 K I. 63 –

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

248

FR

1107 Rebutia sp. (pygmaea Fries?) (Abra Pampa u. Kleine von Hurbe)

1108 Rebutia ~~aff. violescens~~ senilis f. color (San Antonio # 11.) 150K I.63 –

1109 Rebutia ~~sp. n.~~ (grumosa diese selben) (San Antonio # 14) 110K I.63 –

[1110 wohl = 341a Rebutia sp. n. (San Antonio # 15.)]

341a ~~wohl~~ Rebutia ~~steinmannii (sp. var.)~~ ~~Geo nov. sp. (mamillosa)~~ mamillosa v. australis (San Antonio # 9) 70K I.63 –

341b u. B.V. 277

1111 Lumulopuntia sp. n. (?) (Fanatina Lamatina nov. sp. Ritt. West, Berge)

1112 Cylindrop. sp. (Marangani, Vilcanotatal)

1113 Rebutia ~~sp.~~ utiliflora R. (wollige Areolen, westl. Mal Paso # 10) 80K I.63

1113 x 1115 Reb. hybr. 130K I.63 –

1114 Rebutia ~~sp.~~ tropacolijiora R. (langareolig, westl. Mal Paso # 11) 130K I.63 –

1115 Rebutia rosalbiflora ~~(aff. steinii)~~ rosalbiflora Ritter, rosablütig, westl. Mal Paso # 12) 140K I.63 –

1116 Rebutia ~~sp.~~ lanosiflora R. var. pancicostata (~~aff. ritteri~~ westl. Mal Paso # 15)

936

1117 Rebutia ~~sp. n.~~ tergrata (kurzstach., oberh. Mal Paso # 4) 100K I.63

1118 Rebutia gracilispina (feinstach., höchster Pass im Mal Paso # 6) 120K I.63 –

249

FR

1119 Rebutia sp. (Cocaflüsse var. amblyostata ~~?~~ (Aberh. Torata)

1120 Rebutia sp. (Höhen über Caña Cruz)

1121 Rebutia ~~sp. n.~~ pancicostata R. (westl. San Antonio, kleinste von 4000 m) 30K I.63 –

1122 Rebutia ~~sp. (orthacan.)~~ pseudopygmaea (San Antonio # 9) 150K I.63 –

1123 Rebutia ritteri (Pass über Sama) 250K I.63 –

1124 Rebutia ~~sp.~~ minutissima (kleinste weißst. Abtrieg nach Tarija)

1125 Parodia ~~sp. nov.~~ obtusa Ritter (große von Cotagaita) 150.000K XI.62 –

(1125a S. 252)

1126 Cleistocactus sp. n. Hildegardae (Caña Cruz) 15.000K XII.62 – 445.000K II.63 –

1127 Lob. sp. (östl. Mal Paso, Abtrieg bei 3900 m)

[Angeblich Manuskr. der zu Ch. villamontesii gehörig]

1128 Cleistocactus sp. n. (10 Km westl. Boyuiba # 13)

1129 Cleistoc.? ~~wendlandii (?)~~ brookei var. nov. flavispinus (westl. Boyuiba) 3500K I.63 –

1130 ~~Septemtocer. sp.~~ Mamillopsis ~~(Bra)~~ luliziana Ritt. nom. nud. (Boyuiba) 15.400K I.63 –

S. 254

1131 ~~Echinopsis sp.~~ Lymnocalycium sp. n. (Paicho-Schlucht) ~~(10 Km westl. Boyuiba, langst.)~~

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 250

1132 Echinopsis sp. (zuhdeneudata Card. sch.) (10 km n. Boyuibe, kurzst.)

1133 Gymnocalycium sp. (brevistylum R.) Audagovar. boliviianum. (Boyuibe) 103.000 K I.63 –

1134 Parodia Zt. n. purpureoaurea R. (Lerezb.) 120.000 K I.63 –

~~1134a~~ 1153 Parodia ~~sp. n. var.~~ (Cañada) 12.300 K I.63 –

1135 Parodia ~~chrysacanthoides sp. n.~~ R. (westl. Boyuibe) 9800 K I.63 –

1136 Lobivia sp. n. (ähnl. ferox) (Chiquana + Edelac)

1137 Lob. pictiflora R. (Lienegillas) 150 K II 63 –

760 a Rebutia sanguinea var. minor (ähnl. pygmaea, südl. Tarija)

1138 Rebutia ~~gracilispina~~ marsoneri var. orientalis. (ähnl. 341 a, S. 248; südl. Tarija) 170 K I.63 –

757 a " ~~sp. n.~~ pentapetala R. (oberh. La Cueva) 190 K II.63 –

1139 " ~~var. von pulvinosa sp. n.?~~ poecilanthe (37 km nördl. Camargo # 15) 40 K III.63 –

1140 " ~~sp. n.~~ tarijensis Rauch. [var. von kuntzeana] (nördl. Tarija # 15 von 1962) 50 K I.63 –

FR 251

1141 Rebutia ~~sanguinea~~ cajasensis (Abtrg. von Caja # 15 von 1963) 800 K II.63 –

1142 Rebutia ~~sp. nov.~~ tamboensis R. (Tamboschlucht, oben # 4 von 1963) 360 K I.63 –

1143 Mormillea sp. chacoanavar. (Taringusti) 2.100 K I.63 –

1144 Mormillea ~~sp.~~ parapetiensis Ritter (Camiri) 840 K I.63 –

~~(S.21) Cleistocactus tupizensis var. (gelbst. Urcella)~~

1145 Cleistocactus ~~sp. n.~~ pseudosmanzii Ritter ähnl. strausii (unterh. Capilla) 4.400 K XII 62 –

1146 Cleistocactus ~~sp. n.~~ Cameraagdiflorus var. und ~~forma~~ viridiflorus R. (Tapécua) 430 K I.63 –
~~(S.31)~~ [siehe 831 und 1003]

1147 Cleistocactus villamontesii Card. (Angostos de Villamontes) 2.800 K I.63 –

~~[476 a]~~ Copiapoa ~~gigantea var. tenebrosa~~ (östl. Tablal, Höhen) 2.100 K
~~=1444~~ ~~III 63 – ca 100 K II 56 (nach MFR 526 u. Hans in sp. tocalensis)~~

1148 Copiapoa ~~sp. n.~~ raposiensis R. (22 km n. Rapos, Höhen) 1.200 K III 63 –
~~10400 K nach MFR 526 II 1956. –~~

1149 Copiapoa sp. n. mormillensis (Schlucht zu Esmeralda n. Lipeuncho)

1150 Copiapoa ~~sp. n.~~ formosa (südöstl. Esmeralda, Höhen)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 252

(783 a) Echinopsis ~~rhodotricha~~ var. spinosior Ritt. (Taringuiti)
= 783 15.000 K I.63;
S. 263.

777 a Echinopsis ~~[illegible]~~ boynibensis Ritter 9300 K II.63; (n. Boynibe + n. Pabs Bol.)

1151 Echinopsis (Subul. gracilifloraeford) (Camiri + Tapecua)

1152 Parodia species occulta (Kleine von Caña Cruz) 100 K III 63 –
(1153 S. 250)

1154 ~~Echinocephalus~~ Echinopsis tarijensis ~~[illegible]~~ (Abtieg nach Tarija) 360 K II.63 –

1155 ~~Echinopsis~~ Trichocereus grandaliciflorus ~~[illegible]~~ R. (Höhen über Caña Cruz, kuglig)
410.000 K II.63 –

1156 Trichocereus quadratiumbonatus (westl. Boynibe) 6200 K I.63 –

1157 Bolivicer.? sp. (Camiri, Petrolumberg)

1158 Trichocer. (Subul.) tarijensis (34 km nördl. Camargo)

(1159) → 519 Pyrrhocactus pygmaeus-farinae spec. (21 km nördl. Charaza # 8 von 1963)

1160 ~~Lobivia~~ Hymenorebutia sp. nov. (oberh. Toratá bei 3200 m, ~~[illegible]~~ var.?)

1161 Lobivia ~~sp. n.~~ variispina (oberh. Caña Cruz, kleinste)

1125a Parodia obtusa v. (25 km von Cotagaita nach Quechisla)

253

FR (signeroeus)
(1162) = 551 Lumidopuntia sp. (unterh. Polón bis 4500 m)

(pentlandii var. größter Blüten)
1163 Lumidopuntia sp. (westl. Lumbre bei La Paz)
[Regionale Hochgebirgsform der Lumidopuntia pentl. v. dasyspifera in über 4000 m Höhe mit klein, stark behaarten Gliedern u. stark behaarten, Früchten Mittel- bis Südbolivien (Bl. sonst kein deutl. Unterschied), zur Manuskript aufgenommen.]

1164 Lumidop. sp. nov. (Ost. Yungas, Kleinste)

1165 Lumidop. ~~sp. n.~~ hystrix Ritt. (Sta. Barbara # 1 u. S^n Pedro # 3)

1166 Platyop. ~~sp. n.~~ pyrrhantha Ritt. (Taringuiti # 1)

1167 Platyop. interjecta Ritt. (Palmar Grande # 5 (1963) = Boynibe West)

1168 Neoporteria sp. (Puente Teniente, feinst Küste, 1 Exemplar)

78f Oreocereus celsianus forma (extra stark- u. rotst. Tiene quillas) 660.000 K
II 63 –

1169 Trichocer. spec. (nördl. Angostura de Tarija, 1 junges Exemplar)

[1170 ~~Lobivia~~ Hymenorebutia sp. n. pusilla R. (Angostura de Tarija) 1.100 K XII.62 (unter F 620)
= 906

46 g Parodia maasii v. ~~[illegible]~~ (recte) (Betanzos)

46 h Parodia maasii v. maasii (Escazachi)

1171 Trichocereus sp. = ~~tacaquirensis~~ vielleicht weder quadrianus noch (Tarija # 15 von 1931) ~~und 1953~~
(Tarija 553 von 1931) [von 1931, später nicht wiedergefunden, parazacanaähnlich, 12–15 rippig, in s. Mitte prosteno!, schwach best.]

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 254

1172 Echinopsis rajaensis Ritter sp. n. (Abul. obrep. de Cajas - Schluchtmuten)

(1173) 1014 Monvillea rhodolencha K. Sch. (Concepción + [~~Cerro Acati~~] 11.000 K. X 63
" siehe 1014)

1174 Monvillea pestonianaa var. pseudo (Puerto Casado + Tres Cerros)

1174a — Cerro Pela der Cerro Acati.

1175 Monvillea ~~sp. nov.~~ ~~(rosenrote Blüten var. nov.)~~ spatnonzerica (Filadelfia, Blanische)

1130a Monvillea spegazzinii (Tres Cerros) I 64 ca 2.300 K.

1176 Gymnocalycium ~~sp.~~ hoplearum Ritt. (Cerro León #2) 2.800 K. IX 63 -

1177 Gymnocalycium spaediophilum Ritt. (Cerro León #1) 10.700 K. IX 63 -

1178 Gymnocalycium ~~sp.~~ eurypleurum Ritt. (Weg nach Cerro León) 16.700 K. IX 63 -

1179 Gymnocalycium damsii (Tres Cerros) 8.300 K. IX 63 -

1180 Gymnocalycium ~~sp.~~ ~~(hemisphaericum~~ andae Rit. (Filadelfia #1) 1.000 K. IX 63 -

1181 E Gymnocalycium sp. mihanovichii v. chlorosticum Ritter (Filadelfia #2) 24.000 K. IX 63 -

1182 ~~Notocactus schumannianus var.~~ Eriocactus FR 1182 (Paraguari) ~~sp. nov.~~ ~~sp. nov.~~ amphicostatus Rit.
250.000 K. XI. 63 -

1182a ~~Notocactus schumannianus~~ Eriocactus grossei v. aureispinus FR 1182 a (Cerro Acati + Independencia)
75.000 K X 63 ~~400.000 K XI 63~~

1182b Eriocactus grossei var. grossei FR 1182 b (Cerro Aca-hay)
400.000 K XI 63 (unter 1182 a).

FR 255

1183 Pilosocereus ~~sp.~~ paraguayensis Ritt. (Cerro Corá, Paraguay) 8.40 K. XI. 63 -

1184 Eriocereus spmartinii (Puerto Casado, dachelblütige) 570 K. IX 63 - 3.200 K. XI 63.

1185 Cleistocactus ~~hahnianus~~ crociflorus var. (Cerro Gavián, Paraguay)

1185a Cleistoc. ~~hahnianus~~ crociflorus var. (Tres Cerros)

1185b Cleistoc. ~~hahnianus~~ paraguariensis var. (Paraguari + Cerro Acati)

~~1186~~ Lepismium spec. nov.? (~~Rhipsalis~~ crucif. Yrypyté)
~~1030~~ 1030.

~~1186a~~ Lepismium ~~sp.~~ (= 1193) (reg var. d. reg. f. von 1186) (vie 1186, 4-kantig, Independencia)
~~1030~~ 1030

1187 ~~Lepismium~~ Rhips. sp. nov. var. (Cerro Memby, Prov. Concepción, 5 = flügelig)
~~1029~~ [var. zu 1029, Cerro Memby, Prov. Concepción]

1188 ~~Lepismium~~ Rhips. sp. nov. (Cerro Chaará, stielrund)

1189 Rhipsalis ~~epiphylla~~ lumbricoides var. (Concepción, 10 = rippig, dch)
= 365

1190 Rhipsalis ~~sp.~~ pilocarpa (Yrypyté n. Col. Independ.) 1.200 K. XI. 63;

(1191) siehe 368 Medrocactus sp. (Cerro Acati)
311

1192 Epiphyllum sp. (Cerro Pelado, unten)

(1193) Lepismium sp. crucif. (Cerro Acati, 2 = - 5 = rippig)
~~1030~~ = 1186a
1030

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR. 256

1194 Piptanthocereus sp. (Denogonus) cf (Filadelfia) 660 K XI.63 –

1195 Piptanthocereus sp. (rechykizus) cf (Tres Cerros)

1196 Piptanthocereus sp. nov. (lanosus Ritt.) (Cerro Pelado)

1197 Piptanthocereus sp. (lamprospermus) cf (Cerro León)

1198 Echinopsis sp. (paraguayensis) (Cerro Pelado)

1199 Eriocereus sp. gielichii (Paraguari)

1200 Quiabentia sp. (Filadelfia)

1201 Platyopuntia sp. (Paraguay) (rehorsa Km 160) (Pe Casado.)
nur schwache regionale Var. von rehorsa

1202 Platyopuntia (cognata Ritt.) (Km 160, # 10)

1203 Platyopuntia sp. (limitada Ritt.) (Puerto Casado # 4)

1204 Platyopuntia sp. (cardiosperma (K. Sch.) Ritt.) (Puerto Casado # 5 + Chaco-i.)

1205 Echinopsis rhodotricha cf (var. brevispina Ritt.) (Chaco-i.) XI 63. 80.000 K.
[siehe auch 783/783 b]

1206 Melocactus zehntneri Br. & R. (Paraguay) 300 K I.64
(1.263)

1207 Melocactus cf (interpositus Ritt.) (Rio Barbosa) 1.800 K I.64
(var. zu 1210)

FR. 257

1208 Melocactus sp. nov. (azizinensis) (Jacobina) 870 K I.64 –

1209 Melocactus macrodiscus Ward. (Rio Barbosa bis Brejinho, krummstachlige)
(1208 a 1278) 200 K I.64 – XII 64 110 K.

1210 Melocactus sp. nov. (lanicipinus) (Flamengo # 13) XII 64 ca 2.000 K.
(1207)

1211 [Echinocephalus] (erythrocephalus) olybovskii (Flamengo) 17.500 K XII.63 –

1212 [Echinocephalus] (Microcephalus rubicus) sp. nov. (Jacobina) 2.500 K I.64 –

1213 Echinocereus polyanthus (Brejinho) 100 K I.64 –

1214 [Echinocephalus] (Microcephalus) sp. (monteverdensis Ritt. sp.) (Monte Azul) XII 64 ca 950 K.

1215 Pilosocereus sp. nov. (Wasserwerk Rondonópolis)

1216 Pilosocereus sp. nov. (santaluzensis) (Serra da Laudade)

1217 Pilosocereus sp. nov. (carolinensis Ritt.) (Carolina bis Picos) 145.000 K XII 63.

1218 Pilosocereus sp. nov. (paturianensis Ritt.) (Paturiano # 5) 33.000 K XII.63.

956 a Pilosocereus glaucescens var. gounellei (Barão Grajaú) 72.000 K XII.63.
XII 64 ca 25.000 K.

1219 Pilosocereus sp. nov. (permambucensis Ritt.) (Araripina)

1217 a Pilosocer.? carolinensis var. robustispina (Barão Grajaú bis Picos)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 258

1220 Pilosocereus pernambucensis gracilis Ritt. sp. nov. (Petrolina # 3) (var. 1224 1225) 220.000 K XII 63;

1221 Pilosocereus gracilis (Gal) (Jagnaré # 2 bis Urandi) 160.000 K XII 63, XII 64 ca 50.000 K.

1222 Pilosocereus (Cephalocereus) catingicola (Jagnararí # 8) 85.000 K XII 63;

1223 Pilosocereus ~~chamaecereus~~ parvicladus Ritt. sp. nov. (Urandi # 9) 10.000 K

1224 Pilosocereus splendidus Ritt. sp. nov. (Urandi # 11 – Caiteté # 4 – Monte Alto # 7) 470 K I 64 –

1225 Pilosocereus ~~cereus var. Ritt.~~ pernambucensis var. monte altoerensis (Palma de Monte Alto # 7) (var. zu 1220)

1226 Pilosocereus óreus Ritt. sp. nov. (Monte Azul # 10)

1227 Stephanocereus leucostele (Jacú – P. de Monte Alto) 2300 K I 64 –

1228 Zehntnerella polyzona Ritt. sp. nov. (Flamengo # 12) 7.300 K XII 63 –

1229 Zehntnerella chaetacanthus Ritt. polyzona Ritt. sp. nov. (Umburanas # 7 – ~~P. de Monte Alto # 8~~) ~~17.000 K I 64 –~~ XII 64 ca 134.000 K (von H. Ina).
(1229 a S. 278)

1230 Spondylocentrocereus brasiliensis (Jagnararí # 10)

1231 Leocereus ~~Leucocereus Ritt.~~ urandiensis Ritt. (Urandi – Monte Azul) 1.400 K I 64 – XI 64 ca 12.500 K.

1232 ~~Arthrocereus~~ Gen. nov. floribunda pauciflora sp. nov. (Monte Azul) XI 64 ca 1.300 K.

FR 259

1233 [Pilosocereus] hitzelbergii (Jacobina) 850 K I 64 –

1234 ~~Cephalocereus~~ Coleocephalocereus ~~parchytele Ritt.~~ ~~leucocephalocereus~~ ~~purpureus~~ weberianus (Urandi – P. de Monte Alto) 60.000 K I 64 – XII 64 ca 49.000 K.

1235 Eriocereus adscendens (Bahia) 89.000 K XII 63 –

1236 Mirabella R. albicaulis ~~sp. nov.~~ minensis (Caturiano) 17.500 K XII 63.

1237 Mirabella R. albicaulis (Flamengo – Petrolina – Urandi)

1238 Mirabella R. minensis Ritter sp. nov. (Mirabela) ~~I 65 450 K~~ III 65 220 K

1239 Brasilicereus phaeacanthus (Caiteté – Urandi – Monte Azul) 51.000 K I 64 – XII 64 ca 900 K.

(1240) Brasilicereus sp. (Rui Barbosa)
= 1239

1241 Arrojadoa rhodantha (Araripina ~~Urandi~~ – P. de Monte Alto) 106.000 K I 64 – XI 64 ca 31.000 K.
(S. 262) (1241 a) 1336

1242 Arrojadoa penicillata (Jagnararí) 17.000 K XII 63 – XII 64 12.000

1242 a Arrojadoa penicillata v. decumbens (Jacú) 7.000 K I 64 –

1243 Arrojadoa multiflora Ritter ~~sp. nov.~~ (Brejinho) 500 K I 64 – III 65 ca 600 K

1244 Arrojadoa oreophila R. ~~sp. nov.~~ (Urandi, Höhen) XI 64 ca 700 K.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 260

(1245) = 1 cf Rhipsalis sp. (ohne Mutter) (Rui Barbosa, ~~Felsenberg~~ Sanden)

1246 ~~Lepismium~~ Rhipsalis sp. n. Rui Barbosa, Felsenberg)

1247 ~~Lepismium~~ Rhipsalis ~~sp.~~ (Monte Azul) XI 64 230 K.

(1248) siehe 268 [für Liste 1248, 1248 a, 1248 b]
~~268~~ = 1621
(1248 a und b S. 279)

Melocactus coccineus (Montes Claros)

(siehe S. 279)

1026 a Notocactus linkii ~~v. brasiliensis cf~~ (Berlin) 560 K III 64 – VI 64 100

1026 b Notocactus linkii v. (buenekeri) var. nov. cf (Garibaldi)

1026 c (1276)

1264 (var. von 1026 a/b) Notocactus linkii v. gnaibensis R. ~~sp. nov.~~ (Hapoã #7) V 64 240 K.

1265 (1384 + 1266 a, b und c S. 275 Fn. 1488) Notocactus ~~ottonis v. tenuispinus~~ (Arroio dos Ratos + Loreto) III 65 ca 3.300

1266 (S. 275) Notocactus ~~ottonis cf~~ leptacanthus (Tagnarichim #2) V 64 100 K.
III 65 140 K;

1267 Notocactus ~~gracilicaulis v. cf~~ (Sanga de Areia #3)

~~1267 a~~ Notocactus ~~gracilicaulis v. cf~~ var. (Tagnarichim #4)

1268 Notocactus purpureus Ritter sp. nov. (Sta. Maria)

1269 (S. 273) Notocactus horstii sp. nov. (Agudo) 6.000 K Ende 63 –

FR 261

1270 Eriocactus ~~Echinocactus~~ magnificus (Torpí) III 65 ca 44.000 K;

1271 Echinopsis ~~brasiliensis v. cf~~ oxygona (Loreto + Torpí) 14.000 K III 64 –
III 65 ca. 21.000 K

1272 Malacocarpus ~~Echinocactus~~ Virginia leprosorum (~~glaucescens~~) (Hapoã) 21.000 K III 64 – II 65 ca 48.000

1273 Malacocarpus ~~Echinocactus~~ Virginia polyacantha (Arroio dos Ratos) 25.000 K III 64.
II 65 ca 40.000 K;

1274 ~~Echinocactus~~ Eriocactus leninghausii (Lorvo) 26.000 K Ende 63 –
III 65 ca 3.400 K;
(S. 275)

1275 Brasilicactus haselbergii (~~Sabiá~~ Filho) 12.500 K Ende 63 –
1275 a " " " ~~Malacocarpus~~ v. n. ~~Sta. Cruz~~ Tarcoi.

~~1276~~ " " " ~~v.~~ (Jaguirana)

1276 Brasilicactus graessneri (~~Sabiá Francisco da Paula~~) 11.000 K
1276 a – – – – – – – var. stellatus (n. Vacaria)

1277 (1277 a) Parodia ~~brevihamata~~ ~~N 43~~ (~~Sabiá Francisco da Paula~~) (Jaguirana)
2.300 K Ende 63 falsche Bestimmg., var. buenekeri conjungens]

1278 Parodia buenekeri (Aparados da Serra) 200 K Ende 63);

1279 Epiphyllocereus jamacaru (~~Graripina~~ Balia, Januaria)
50.000 K I 64 – IX 64 ca 62.000 K;

1280 Pereskia ~~x~~ bahiensis (Flamengo)

1281 Pereskia ~~x~~ stenantha Ritt. (Urandi)

1282 Platyopuntia ~~sanguinea~~ inamoena (Barão Grajaú – Serro Azul)

1276 b Brasilicactus graessneri v. albiseta Lillia (Sta. Cambará)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR. 262

1258 a Platyopuntia ~~estingrisiana~~ inamoena f. spinigera Ritt. (langstell. Wandi, Höhen)

1253 Platyopuntia palmadora (Marizina bis Wandi)

1254 Platyopuntia setingirola f. (Jacú # 12)

1255 Brasiliopuntia sp. (Rui Barbosa)

1256 Tacinga funalis (Bahia)

1257 Frailea galliana (Nova Italia) 280 K II 64 –

1258. Arthrocereus campos-portoi (Belo Horizonte)

1259 Piptanthocereus obtusus (Arraial do Cabo) 1600 K. II 64
XI 64 ca 2700 K;

1260 Pilosocereus aurabidae (Arraial do Cabo # 3, grüne)
39.000 K. = II 64 – XI 64 ca 41000 K;

1261 Pilosocereus ~~sp.~~ pleii (W. Lch) (Arraial do Cabo # 4, blaugrüne)
81.000 K II 64 – XI 64 ca 14000 K;

1262 Pilosocereus fluminensis (Arraial do Cabo)
75.000 K II 64 – XI 64 ca 2700 K;

1263 Rhipsalis sp. (Arraial do Cabo)
(1264 etc. 2 Seiten zurück)

1241a Arrojadoa rhodantha (Forma oder var. ~~sp. n.~~) (Wandi – Monte Azul)
102.000 K. I 64 – XII 64 ca 3000 K.;

1279 Brasiliopuntia (Arraial do Cabo)

FR. 263

1280 ~~Rhipsalis~~ Rhipsalis ~~Lepismium~~ grandiflora (Guaraja-mirim) 670 K. II 64 –

1206 a Melocactus zehntneri var. viridis R. (Gaturiano – Marizina)
1.600 K XII 63 –

(1281) Melocactus ~~zehntneri~~ bahiensis var.
= 1334 sub var. (Jagnaraty) 130 K XII 63 –

1282 Piptanthocereus sp. roriazensis Ritt. (Carolina + Barão Grajaú) 5.500 K XII 63.

[1010 a Piptanthocereus obtusus Han. (Arraial do Cabo)]
= 1259.

1283 Echinocactus clavicaps Ritter (Julio de Castilho) 7.600 K Aug. 63;

1284 Brasilparodia buonaheri var. intermedia 3 km. v. Alt. Lombará.
(1284 a S. 276) ~~Parodia [atacamportana] (ritterii tarijas)~~ XII 42

1285 Lepismium flocculosum Ritt. (Berlin # 4)

1286 ~~[Rhipsalis]~~ Rhipsalis ~~cribrata~~ albareolata Ritt. (Berlin # 5, ~~8/9~~ hängend.)
[= 1288]

1287 Rhipsalis warmingiana (Serra Agudo, 2-4-kantig.)

[1288 ~~Rhipsalis Hyades n. sp.~~ (Guaíba) [Jugendform von 1286]
= 1286 880 K III 64]

1289 Monvillea sp. n. (Sn Joaquim, Dragnay)
↓1015

783 b Echinopsis rhodotricha (Puerto Lesado) IX 63. 20.500 K.

[1295 Pilosocereus sp. (Sn. Monte Azul u. Januária)]
= 1223 pachycladus

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 264

1291 Peireskia sp. n.² Ponta Porá 42.

1292 Peireskia aculeata (Estrêla)

1293 Rhipsalis pachyptera (cf.) Pfeiff. (Blumenau (la Bünker))

1294 ~~Cephalocereus~~ Browningia columnaris R. (Valle Rio Pampas) IX 64: 11.400

1295 Calymmanthium fertile (östlich Balsas) VIII 64 ca 53.000

1296 Cleistocactus villaazulensis (Villa Azul) V 64 ca 9.800

1297 Cleistocactus ~~sp. nov.~~ brevispinus Ritt. (Valle Pachachaca)

(1298 = 1547) Lerrocactus capurimacensis Ritter (oberh. Chalhuanca) IX 64 ca 470

1299 Erdisia gracilis Ritter (Valle Rio Pampas) IX 64 ca 430

1300 ~~Erdisia maximatsch~~ Lerrocactus uniflorus (Vel.) Ritt. Hutch (Mejorada bis ~~oberh. Hyatcho~~)

1301 ~~Erdisia sp.~~ Lerrocactus odoratus (Tal Pampas u. Colcabamba)

1302 ~~Erdisia sp.~~ Lerrocactus peruvianus Ritt. (Villa Azul)

1303 Lasiocereus fulvus Ritter (östl. Balsas) VIII 64 ca 31.000
V 65 ca 166.000 K

1304 Matucana weberbaueri (östl. Balsas 1700-x m)
VIII 64 ca 2.200 K. V 65 ca 2.300 K

1305 Matucana myriacantha (östl. Balsas 2500-x m)
VIII 64 120

1306 Matucana hastifera (Felsen über Talca) VIII 64 ca 1.400 K

1307 Matucana fruticosa (oberh. San Juan) VII 64 ca 7.100
VI 65 ca 2.900 K

FR 265

596 a Matucana aurantiaca var. densispina (Baños del Inca)
VIII 64 ca 3.200 K

1308 Matucana callianthe sp. n. (östl. Balsas 1700-x m, krummstachl.)

1308 a Matucana callianthe var. proliferа (Balsas, Kindel machend)

1309 Moravetzia sericata Ritter (Villa Azul) IX 64 ca 3.800

1310 ~~Gen. nov. sp. nov.~~ (Matucana) Incaia auriflora Ritter (Baños del Inca) VIII 64 100 K

1311 ~~Gen. nov. sp. nov.~~ Comatucana oreodoxa Ritter (Berge über Talca) VIII 64 50 K

1312. ~~Echinopsis peruviana~~ ~~Neolobivia hildegardiae~~ Lobivia wijsterijana (Villa Azul) 15. X 66 ca 1400 K.

1313 ~~Lobivia~~ ~~Neolobivia~~ Wrightia na Back. (Höhen über Mantacra)
[siehe auch 632]

1314 ~~Gen. nov.~~ ~~Oreocereus~~ calva (Epiphiten-Cereen östl. Balsas)

1315 ~~Gen. nov.~~ Hybrid 306 Trichocereus pasacanus × 658 Lepismium fermo (kleine rotblütige Cereen, Balsas)

1316 Copiapoa ~~sp. nov.~~ caldereana var. spinosior (25 km südl. Chañaral)
= 122 (507 = Cop. caldereana)

1317 Rhipsalis ~~sp. nov.~~ uncinatha var. fermo (oberhalb Cascas, Peru)
310 (mit dickeren Trieben)

1318 Arrhiatocereus ~~sp. n.~~ spinosissimus Ritt. (44 km westl. San Miguel)

1319 Browningia ~~sp. nov.~~ alticeps (Abstieg nach Chepen 1500-x m)

1320 Lobivia ~~sp.~~ intermedia (Ramal) (oberh. Chalhuanca)

1321 ~~Echinopsis sp.~~ Chilenopuntia (25 km südl. Chañaral)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 266

1322 Platyop. ~~sp.~~ inaequilateralis var. angustior (östl. Villa Yoni, östl. Mantaro bei Tschen, ca 2000 m, schmalstiedig)
(1322a) S. 277

1323 Platyopuntia ~~sp.~~ aurimacensis Ritt. (Valle Pachachaca bei Aurimac, schmale)

1324 Lumbropuntia ~~sp. nov.~~ tumida Ritt. (nördl. Ilala Viejo)

1325 ~~Pilocereus argilensis R. (zwischen Felicio #3) XI 64 ca 5300 K.~~
~~Epiphyllum sp. nov. (östl. Valas, ca 1800 m)~~

1326 Pilocereus coerulescens (Lem.) R. (Alto Palacio) XI 64 ca. 250000 K.

1327 Lipocereus pleurocarpus R. (Alto Palacio) XI 64 ca 43000 K.

1328 Micranthocereus ~~macrogibbosus~~ haematocarpus R. (Huaçú)
XII 64 ca 6.500 K; III 65 940 K;

1329 Micranthocer. purpureus (Serra Sincorá) XIII 64 ca 36.000 K

1330 Melocactus ~~sp. nov.~~ rubrozonus Ritt. (Garça, Remida) XII 64 ca 1.700 K.

1331 Melocactus ~~sp. nov.~~ ~~vermicularis Ritt.~~ inconcinnus
XII 64 ca 5.500 K. (Ourives #13 + Huaçú bei Brejinho)

(1332) Melocactus ~~sp. nov.~~ ~~nigelianus Ritt. var.~~ bahiensis
~~1334 var.~~ XII 64 ca 4.500 K. (Ourives #19 + nördl. Huaçú #5)

1333 Melocactus ~~sp. nov.~~ canescens Ritter (Ourives #10) XII 64 ca 2.100 K.

1334 Melocactus ~~sp. nov.~~ ~~nigelianus Ritt.~~ bahiensis var.
(1338) XII 64 ca 2.800 K. (Anaçé + Itaobim #8)
951

FR 267

1335 Arrojadoa ~~melocactoides~~ penicillata leichte Var. Ritter (Itaobim) I.65 ca 8000 K
(1242)

1336 Arrojadoa ~~sp. nov.~~ ~~Rhodantha~~ var. (Ourives #17. [Triebe wesentlich dünner]
1241 (ohne Namen)

1337 Brasilicereus ~~brasiliensis~~ brasiliensis Ritter (Itaobim)
I.65 ca 4.300 K;

1338 ~~Pseudo~~ Acanthocereus ~~sp.~~ brasilis var. (Itaobim) I.65 150 K.

1339 Coleocephalocereus flavisetus Ritter (südl. Eng. Caldas)
I.65 ca 1.400 K.

1340 Coleocephalocereus decumbens Ritter (Padre Paraiso)
I.65 ca 15.500 K.

1341 Coleocephalocereus aureus Ritter (Itaobim)
I.65 ca 195.000 K.

1342 Pilosocereus quatricostatus Ritter (Padre Paraiso)
I.65 ca 900 K;

1343 Pilosocereus ~~sp. nov.~~ superbus var. ~~regius Ritt.~~ Ritter (Ourives #2) XII 64 ca 16.000 K
(S. 278)

1344 Pilosocereus robustus Ritter (Ourives #16) XII 64 ca 17.000 K

1345 Pilosocereus ~~sp. nov.~~ magnificus (Buin. et Bred.) Ritt. Ritter (Itaobim #5)
I.65 ca 540.000 K.

1346 Pilosocereus multicostatus Ritter (Itaobim #12)
I.65 ca 60.000 K.

1347 Pilosocereus superbus (Anaçé #4) XII 64 ca 2100 K.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 268

1348 Pilosocereus spec. (Anacé #9)

1349 Pilosocereus ~~spec.~~ atroflavispinus Ritt. (Anacé #8)

1350 Hatiora ~~spec.~~ salicornioides (Corcovado) I65 ca 830 K.

1351 Brasiliopuntia spec. (Corcovado)

1352 Coleocephalocereus paulensis R. (Ilhabela) II65 ca 2.800 K; IV65 ca 2.800;

1353 (1392) Frailea horstii R. (Rincão de Agredo = L.H.13) II65 ca 800 K.

1354 Arthrocereus ~~spec.~~ odorus Rett. (Veraneio Hotel) III65 180 K.

1355 Arthrocereus ~~spec.~~ sondermannianus Backeb. & Voll ~~Rauh & Ritter~~ (Joaquim Felicio) III65 260 K;

1356 Melocactus ~~sp.~~ ~~guachipilensis~~ diersianus Ritt. (Montes Claros)

(1357) 1331 Melocactus ~~sp.~~ reg. Sorocaba ~~Serra do Mar, Mun. Itapetininga~~ inconcinnus (westl. Licinio Almeida)

1358 ↓ ~~(1357?)~~ Melocactus ~~sp.~~ montanus Ritt. (westl. Eng.º Ouro)

1359 Pilosocereus ~~sp. 100 K.~~ bradeianus Backeb. & Voll (Joaquim Felicio #4)

1360 Pilosocereus brasiliensis (östl. Niteroi + Corcovado)

FR 269

1361 Notocactus tenuicylindricus Ritter ~~Frailea spec.~~ (ca 52 km ost. Harmonia #2, S.4696)

1362 Frailea pfaeudisca (ca 52 km ost. Harmonia #3, S.4696)

1363 Frailea asterioides var. harmoniana ~~sp. ca Harmonia~~ (7 km ost. Harmonia #4)

1363a Frailea asterioides var. backebergii ~~Cataract.~~ (Chiraí)

1364 Frailea pumila (7 km ost. Harmonia #3)

1364a (1365+1367+1364b S.276) Frailea pumila ~~sp. Ost.~~ (12 km nördl. Livramento)

1365 Frailea ~~sp.~~ pumila ~~(Varr. 1364)~~ (12 km w. Alegrete)

1367 Frailea ~~sp.~~ pumila ~~(var. v. 1364)~~ (Cº Branco, westl. Santiago)

1366 (1369+1370+1385+1385a+1385b+1371) Frailea pygmaea v. planiceps (14 km nördl. der Abzweig. der Straße Cacº Branco – Santiago bei km 36.)

1369 Frailea pygmaea v. longispina ~~(var. v. 1366)~~ (12 km südl. Quevedos) III65 ca 100 K. IV65 ca 210 K;

1370 ↓ 1370a (S.276) Frailea ~~sp.~~ pygmaea v. maior ~~(var. von 1366)~~ (Caçapava ~~+ Itaí~~ L.H.12) II65 130 K;

1385 ↓ Frailea ~~sp.~~ ~~(var. v. 1366)~~ ombilicata Ritter (50 km südl. Passo da Guarda)

1385a (1385b) Frailea ~~sp. var.~~ albicolumnaris (ca 12 km nordöstl. Livramº Tibaldeiro an Nebenstraße)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 270

1385b Frailea ~~sp. n.~~ uruguaeg. v. lilakunula (ca 15 km östl. Livramento)

1385c Frailea perumbilicata v. minor (75 km südl. Passo da Guarda)

1368 Frailea ~~sp. n.~~ curvispina. (n. San Pedro, Abzweig. nach Hagoja)

1371 Frailea uruguaeg. v. curvispina (Var. zu 1353) (westl. Santana Grande, km 137½)

1372 Gymnocalycium v. backebergii domudatum (Typ) (Ilhá de Boa Vista – 287)

1373 Gymnocalycium ~~sp.~~ domudatum (Typ) (Ilhá de Boa Vista – 287) III 65 100 K;

1374 Gymnocalycium (artigas) uruguayense (Quarai + Livramento)

1375 (1377a) Notocactus ~~sp. nov.~~ scopulibiscutatus v. minutispinus Ritter (südöstl. Santiago S. 468)

1377a Notocactus ~~sp.~~ scopulibiscutatus Ritter (var. von 1375) (14 km südl. Quevedo #2b) III 65 100 K;

1376 Notocactus ~~sp. nov.~~ glaucinus. (westl. Santiago #5)

1376a Notocactus ~~sp.~~ glaucinus v. depressus (var. von 1376) (12 km südl. Quevedo #1)

1378 (1376) Notocactus ~~sp.~~ glaucinus var. gracilis (var. von 1376) (San Franc. de Assis #5) III 65 480 K;

1377 (1377a) Notocactus ~~sp. nov.~~ acutus (12 km südl. Quevedo #2a)

1379 Notocactus ~~sp.~~ fuscus (San Franc. de Assis #6 bis 15 km westl.)

FR ~~270a~~ 271

1379a Notocactus ~~fuscus var. longispinus~~ (18 km v. San Franc.) III 65 ca 15.000 K;

1379b Notocactus ~~sp. nov.~~ (similarbis) ~~fuscus var.~~ (75 km südl. Passo da Guarda) (+ Rivera)

1379c S. 281

1380 (1026) Notocactus megapotam. v. horstii (Soledade, Lokerige)

1380a Notocactus megapot. v. vulgatus (14 km südl. Quevedo, kleiner) (= 1380c S. 276)

1380b Notocactus megapot. v. crucicentr. (21 km nw. Abzweig. der Straße San Franc. – Santiago bei km 36.) ~~(1380c S. 276)~~ (1380d – S. 279)

1381 Notocactus ~~sp. nov.~~ (muricatus v. flavifuscus) (Cerro Branco #5)

1382 Notocactus mamulosus (Cerro Branco – Livramento)

1027 ~~= 1027~~ Notocact. ~~sp.~~ arechavaletai var. balacriptenus (Montenegro)

1027b Notocact. ~~sp.~~ (arechavaletai) var. buenekeri (Serrinha)

1027c Notocactus ~~sp.~~ (arechav.) var. horstii (Tres Pontes)

1027d Notocactus ~~sp.~~ arechavaletai var. tuberculosus (Rio Varela nördl. Tarazinho)

1383 Echinopsis ~~sp.~~ (~~brasiliensis var.~~ oligogona f. brevispina) (Cerro Branco #6 – Rincon Lopez #7) III 65 ca 7.700 K; [siehe auch 1271]

1384 (1384a S. 276) ~~Notocactus~~ Wigginsia sellowii (Quarai + Larma) III 65 ca 5.600 K.

1385 (S. 269/270)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 272

1386 Frailea ~~pulvisipina~~ (30 km n. Quaraí)

1387 Notocactus herteri (Livramento) II 65 ca 750 K;

1388 Notocactus ~~sp.~~ globularis (Livramento #9, dichtaestelig)

[1389] (v. = 1265) Notocactus ~~sp. var.~~ [arechav. v. nanus] (var. von Altonis) (Livramento #10, flach, niedrigrippig)

1390 Notocactus ~~sp.~~ uruguaiensis (18 km östl. Livramento #4; 1 Exemplar)

1391 Frailea ~~pulvisipina~~ (gellidiana) v. (Livramento #11; 1 Exemplar)

1392 (#353) Frailea ~~sp. (var. von 1353) var.~~ albiflora Ritter (Livramento Seite Uruguay)

1393 Notocactus scopa var. (Rincón de Legredo) II 65 ca 1450 K

1393a Notocactus scopa (Pedras Altas)

1393b Not. oc. scopa var. (Rincon de Inferno)

1394 Notocactus ~~sp. nov.~~ crassigibbus (Lavras, dickhöckerig)

1395 (1395a) Notocactus ~~sp. nov.~~ ~~(cylindrilibus v. gracilis)~~ arachnites (Rincon de Legredo, dickhöckerig)

1396 (#14+14) Notocactus ~~sp. nov.~~ [arechav. v. aureus] (westl. Santana do Livramento, km 137½)

1395a Noto. arachnites var. minus (Vila Lamagná)

FR 273

1397 Notocactus ~~sp. nov.~~ buenekeri (Mina Lamagná, gelbstachl.)

1398 Notocactus ~~sp.~~ campestrensis Ritt. (nov.) (Campestre)

1399 Notocactus ~~sp. nov.~~ ~~Ritt.~~ mazizensis (südl. São Gabriel, gelbstachl.) II 65 ca 210 K;

1269a (#260) Notocactus ~~sp. nov.~~ Berdii v. purpureiflorus (Botucaraí = L. H. 20b)

1400 ~~Notocactus sp. n.~~ Eriocactus warasii (Ähnl. loringianus, wenigrippig)

1401 (#343) ~~[Parodia]~~ Brasiliparodia ~~sp. n.~~ (Straße Bom Jesus nach Rio Pelotas, rechts)

1401a (#440) ~~[Parodia]~~ Brasiliparodia catarinensis ~~sp. n. Arr.~~ (~~vorläufig~~ Jardim da Serra, Sta. Catarina)

1402 ~~Malacocarpus sp. nov.~~ Wigginsia horstii v. juvenaliformis (Quaritá) II 65 ca 440 K;

1402a ~~Malacocarpus sp. nov. var.~~ Wigginsia horstii (Mina Lamagná) II 65 ca 800 K

1403 ~~Malacocarpus sp. nov.~~ Wigginsia prolifera (Rincón de Legredo)

1403a ~~Malacocarpus sp. nov. var.~~ Wigginsia ~~prolifera~~ longispina (Lavras, vielstachlige) II 65 ca 20.500 K

1404 Echinopsis ~~sp.~~ weyriesii (30 km nördl. Quaraí #3)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

F.R. 274

1405 Rhipsalis sp. (Ilhabela #5)

1406 Melocactus melocactoides (Sacarema)

1407 Platyopuntia rubrogemmia Ritt. (Quarita #1)

1408 Platyopuntia brunneogemmia Ritt. (Quarita #2)

1409 Monvillea piedadensis Ritt. (nördl. Piedade, São Paulo)

1410 Piptanthocereus cruciferus Ritt. (Tres Rios #1)

1411 Piptanthocereus cipoensis Ritt. (Veraneio Hotel)

1412 Piptanthocereus cabralensis Ritt. (Joaquim Felicio)

1413 Peireskia aureiflora Ritt. (Itacubim)

1414 (1396) Notocactus sp. n. v. (8) (16 km südw. Harmonia)

1415 ✱1376 Notocactus sp. n. arechavaletai v. limitiseda (Livramento #3 ähnl. arechavaletai)

1415a ✱1376. Notoc. sp. n. var. (18 km östl. Livramento #2)

1416 Micranthocereus sp. n. (Licinio Almeida)

F.R. 275

1417 Platyopuntia viridirubra Ritt. (30 km nördl. Quaraí, schmale)

1418 = 701a Cylindrop. sp. (Valle Fortaleza 3500 m; Lauliaco 3600 m) "Austrocyl. lauliacoana forma cf."

1419 (Acanthorhipsalis) Rhipsalis sp. (östl. Balzas, 1800 m)

1420 Piptanthocereus (Hildmannianus) sp. cf. (Tres Rios #2)

1011a Piptanthocer. sp. var. calcirupicola var. pluricostata Ritt. (Cyrnja's Reunides)

1421 (1609) Piptanthocer. sp. neoweriticus var. interior Ritter (Piedade u. Sorocaba);

1422 Platyopuntia spec (Quaraí) (Keine Bestimmungsangaben) (Nicht bestimmt)

1266a = 1265 Notocactus ottonis [var.] (westl. Santana Gr. km 138½)

1266b = 1265 III 65 250 K; Notocactus ottonis [var.] (Berg Itaguajá w. São Pedro)

1266c Notoc. ottonis var. (acutangularis) (Cuiabá, Serra Branca, São Francisco, Kanela)

1274a Eriocactus leninghausii var. minor (Montenegro)

1274b Eriocactus leninghausii var. (nördl. Canela)

1423 Rebutia singularis Ritt. (oberh. Padcaya 2000 m; #14);

1424 = 1113 x 1115. Rebutia sp. n. (oberh. Mal Paso #6 [Rep. 69 S. 477])

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 276

1425 Chileorebutia sp. n. (Carrizal Bajo)

1026c Notoc.? linkii var. multiflorus (Livramento)

↓

1026d Notoc. linkii ~~forma~~ (westgrenzig) (N. J. de la Fr. u. NW. Sitina)

↓

~~1026e Notoc. linkii var. (östl. Jagüeay)~~ (ist = 1026a)

[1380c Notoc. ~~sp. n.~~ megapot.? v. vulgatus (Punta Tiros)]
= 1380a

~~1380d Notoc. sp. var. (westl. J. de la Ritha)~~

384a Lobivia tilcaliana var. dinelplatensis (Fundplatz = Rebutia da)
Sphaerorebutia

1284a ~~Echinocereus~~ Parodia (Brasilien) brunekeyi? conjungens (2,300 m. Indien 63 als brunekeyi) (km Stricke Fortaleza) (~~Pl. 186~~ und ~~Pl. 351~~ → 4 km von Cambará nach Fortaleza, nere-Straße)

[1426 Myocactus sp. (Abzweig Straße zu Fram-Santiago bei 36 km, 12 km nordwestl. 1 Exemplar)
= 1378cf]

348b Lob. rossii ~~diffusa var.~~ (25 km westl. Jocalla)

348c Lob. rossii var. sayariensis (Sayari)

1364b Frailea ~~pygmaea var.~~ pumila v. minor (Livramento)

1370a Frailea pygmaea v. altigibba (Ybaré)

1427 Wigginsia ~~sp.~~ corvaxillis (São Gabriel)

1384a Wigg. ~~sp.~~ sellowii v. macracantha (Quaraí) ~~1618 + 1622 (68)~~

FR 277

1428 Rebutia ~~sp.~~ potosina (10 km w. Cochinguito ~~#9~~ 36 km nw. Potosi #10)

341b Reb. ~~graciliflora var. vestedtii~~ mamillosa (östl. Mal Paso)

↓

341c Reb. ~~graciliflora var. boccasana~~ ~~sulcimillosa~~ camargensis Rauch (nördl. Camargo)
(341a S. 248)

1429 Rebutia minuta (w. Mal Paso #16 u. Mal Paso unten #5)

1430 Rebutia sp. (östl. buiningiana) (8 km nördl. Caldera)

806a Echinopsis sp. hystrichoides var. (von 806) ~~oder eigentlich?~~ (Culpina #12)
~~1413b~~

1431 Trichoc.? (112 km nw. La Puerta #4a)

1432 Pyrrocactus tramiens (Fundpl. Lop. lembckei)
= 213b (Morro de Caldera)

1433 Lobivia ferox var. camargensis Ritt. ~~Unterpunktata~~ (37 km nördl. Camargo #8 (H. 585. 383))
↓
98 ferox

1434 Rebutia irritans (w. Mal Paso #13)

~~1285a~~ Par. roseoalba ~~var. australis (östl. Punta Gordo)~~ (Vidigaita) (+37 km n. Camargo)

(1435) Trichocer. sp. (13-37 km südw. Alemania)
= 13

[1322a Platyopuntia ~~sp. var.~~ (inaequilateralis) (östl. Mendoztal, östl. Villa Uruch, ca. 2500 m)
= 157]

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 278

[1436] Pyrfoc. sp. (N. Tallal Wadrand, obere Ende)
= 212 a P. rachitakensis cf. flaviflorus.

1443 ~~522 b~~ Lop.ª olivana ~~var.~~ (grangrün, südlicher als FR 522 und tiefer) Bergflanken bei Calera Oliva.

1229 a Echinocerella chacracanensis v. montealtensis Ritt. (Palmas de Monte Alto)
12.030 K. I. 64 (unter No. FR 1229).

1343 a Pilosocer. superbus var. gacapensis (Serra Gacapa, Riacho de Altura)

1343 b Pilosocer superbus var. lanosior (15 km östl. Caitité)

1437 Melocactus ~~spinosus~~ var. montealtensis (Palma de Monte Alto)

1209 a Melocactus macrodiscus var. minor (Ani Barbosa #3)

1209 b " macrodiscus var. oligospec. nov. (Ouriveis #20)

1438 Piptanthocer. uruguayanus Ritt. ~~pecten-aureus~~ (Montes Claros)

1439 Pyrrhoc. poliguayensis ~~prochilanthus~~ cf. (Poliguay)

1440 Echinocephal. brevicylindricus.

1441 Echinocactus (N. G. Hymenolobivia) tuberculosa (oberh. La Cuesta)

1442 Notocactus leninghii

~~1443 Lopsapoa olivana (nördl. der Lop. montana, Gipfel der Calera)~~

FR. 279

1444 Lopiapoa tenebrosa (östl. Talca, Chile) 2.140 Kom. III. 63.
(~~476 a~~)

1445 Lobivia ~~sp.~~ tegelariana (oberh. Mantacra, groß)

1446 Echinocer. huascha (?) (Chanical #18)

1447 Lopiapoa ~~sp. n.~~ variispinata Ritt. (50 km nördl. Papozo)

1380 d. Notocr. megapotamicus (Plaza Binder)

1448 Pyrrhocactus ~~sp. n.~~ (Grancatinetanus) (Unterhalb Termas del Flaco) 750 m u. darüber

1449 Cylindropuntia sp. (Lanliaco ~3800-x m)

1450 Pyrrhocactus ~~spechrarie~~ (Art von Franc. Kraus)

1451 Thelocephala fankhauseri (W. Domeyko) Art von Fankhauser

1452 Lopiapoa ~~sp.~~ marisina (3 km südl. Papozo)

1248 a Mediocactus coccineus cf. var.? (nördl. Caratinga)
(~~1360~~) (siehe 368)

1248 b Mediocactus coccineus cf. var.? (Montes Claros)
(~~1360~~) (siehe 368)

1453 Pyrrhocactus fonsis (3-4 km südl. Papozo)

1454 Erdisia sp. (Grafe Convento - Corsacora 2500 m)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR 280

1455 (permutatus Neonotocactus ahnl.) Notocactus concinnus sp. (Spl. Brücker bei Gabriel),

1456 Eriosyce algarrobensis (Mina Algarrobo)

1457 Copiapoa gemmeldana. (südl. Esmeralda, 700 m)

1458 ~~Lobivia sp.~~ Echinolobivia incarca (Pisac, ca 3000–3400 m)

1459 ~~Lobivia sp.~~ Echinolobivia prolifera (Pisac, ca 3400 m)

1460 Lobivia sp. glaucescens. (Cuajones)

1461 Copiapoa coquimbana var. armata (Choroztal, weit östlich) „siehe auch 1718" 1718

1462 Islaya minuscula Ritt. (nördl. Atico)

1463 ~~Notocactus~~ Brasiliparodia Rechenberg (Baiu. Ritt.) (Lagoa do Triunfo Rech)

1464 Notocactus HU 94 (Rio Grande)

1465 Notocactus HU 140a (Tonta Grossa)

1466 Echinopsis aucistrophora (Speg.) ~~Back.~~ (Spl. von L. Horst)

1467 Trichocer.? tarataensis. (Cuajones)

1468 Trichocer.? machacensis (Machac) nom. dub. Ritt.

1469 Loxanthocereus trujillensis (Berg nr. Trujillo)

1470 Cereus sp. n. (Brandt + Monte Alto) Yanacaca

FR 281

1471 Bolivicereus gracens (Ita Wzerapon Hilde mündl. gelb A.)

1472 Uebelmannia pectinifera HU 106.

1473 Uebelmannia meninensis HU 108

1474 Uebelmannia buiningii HU 141

1474a Uebelmannia buiningii H. HU 283 (rotbraune Form)

1475 Uebelmannia albipectinifera (gespreizte St., 13–20 Ri.)

1476 Uebelmannia flavispina ~~brevicaule~~ (gespreizte St., 19–26 Ri.)

1277a Brasiliparodia brevihamata var. mollispina (Cambará, Abzweig. nach Jaguirana). = HU 43 a.

1477 Brasiliparodia alacriportana (westl. Jaguirana, westl. Flug) HU? (Schl. Lammprode)

1277b Brasiliparodia brevihamata ~~var.~~ conjungens (nord. westl. Cambará, ~~nahe Strße nach Cruz da Fonte~~ nahe Cambará, ~~bei der Straße~~, (immer vereinzelt, verbindet nach?) HU 71.

1379c Notocactus rauschii (Riveras, Grenze)

1478 Notocactus (Neonotoc.?) ~~sp. n.~~ (cristatus Ritt.) (Cabaré u. São Gabriel) (Cerro do Ouro);

1479 ~~1155a~~ Noto. (Neonotoc.) ~~var. 1455~~ (turrispinus Ritt.) (Spl. Horst)

1480 Morwillea ebenacantha Ritt. (16 km nordwestl. Boyuibe)

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR
1481 Echinocactus sp. (pyrophyllacanthus Ritt. 282) (oberh. Agarucha)

1482 Micranthocereus sp. (aureispinus Ritt.) bei Morro Azul

1483 Discocactus sp. HU 360 kleiner von Grão Mogol

1484 Notocactus sp. (leucotocephalus) rubropedatus Ritt. Cerro do Ouro bei São Gabriel

1485 Nebelmannia pectinifera v. elegans (Gouvêa)

1486 Notocactus sp. dalvae (Dalva Brunk; Camaquã u. Rinc. d. Inferno)

1487 Rhipsalis clavellina Ritt. (Felsen am Botucaraí)

1488 Notocactus sp. ottonis v. paraguayensis (Eusebio Ayala)

1489 Pilosocereus sp. (gounellocarpus) (Encarnación)
für Manuskr. „P. oe. v. gounellocarpus Frieb. auch 1006"

1490 Rhipsalis hohenauensis Ritt.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

Friedrich Ritter Tagebuch 86

Beilage

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

Nr. FR Seite 1

Brasilianische Kakteen.

1 Rhipsalis cassytha Rio de Jan.
2 Epiphyllopsis paradoxa Santos.
39 Rhipsalis loefgrenii Jansen.
311 Epiphyllum phyllanthus Monte Claros
947 Melocactus pruniferus Ponta da Fr.
948 Frailea gracillima Porto Alegre
948 a " " var. Encruzilhada.
950 = 1281 Discocactus bicornis Diamantina
951 = 1334 Melocactus zehntneri {Jamarandiba / Grão Mogol}
955 Rhipsalis boulletiana Canela
956 Pilbrocereus zehntneri Montes Claros
957 " dumarcolatus " "
958 " azureus Januaria
959 " sexatilis v. diamantin. Diamant.
960 " " v. densilanatus Ponta da Fr.
960 a " sexatilis Conceição
1006 Facheiroa pilosa Januaria
1007 Cereus bageanus Bagé
1008 " alacriportanus Porto Alegre
1009 " neonesiotiqcus Florianopolis
1010 (Friedr. 1259) " vilnus v. lanetus R. Santos
1011 " calcirupicola Montes Claros
1011 a " " v. pluricostata Grama Rem.
1012 " pernambucensis Ponta da Grauna
1013 Cereus minensis Diamantina
1023 Hylocereus undatus Santos
1026 Echinocactus megapot. v. alacrip. P. Alegre
1026 a=e " linkii v. linkii Jaguaty + Berlin.
1026 b " " v. buenekeri Garibaldi
1026 c " " v. multiflorus Livramento.
1026 d " " f. (rotnerka) (Nr. Sta. Ana.)
1027 " arechabaletai v. alacrip. P. Alegre
+ 1027 a " " " " Montenegro
1027 b " " v. buenekeri Serrinha
1027 c " " v. horstii Tres Pontes
1027 d " " v. rubescens Rio Varela
1396 " " v. aureus Pant. Gr. Km 137,5
1415 " " v. limiticola Livramento
1028 Rhipsalis linearis (2-3-kant.) Canela
1030 = 1933 Lepismium cruciforme (3-kant.) Florianop.
1030 a " " v. cavernosum (2-kant.) Santos
1030 b " " v. P. Al. nach Lüz, Parada 83.
1031 Rhipsalis crispata Florianopolis
1032 " heterodada Santos
1033 Peireskia moorei Cozumba
1034 Quiabentia zehntneri Januaria
1035 Blatgon. sexatilis Mont. Claros
1037 " vulgaris v. diamantin. Diamant.
1040 " vulgaris Porto Alegre
~~1041~~ 1021 Mediocactus coccineus Montes Claros
= 1248) 1248 a " " v. var. gracilis
1248 b " " v. var. Mont. Claros

7 951 = 1281 = 1334 (Jamarandiba bis Itamarandiba))
1206 Melocactus zehntneri v. viridis Petrolina
1207 " longispinus v. eburn. p. Rui Barbosa
1208 " rectispinus Rio Jacobina
1209 " macrodiscus Rui Barb. bis Brejinho.
1209 a " " v. minor Rui Barbosa
1209 b " " v. ol. sp. var. Durives #20.
1210 " longispinus Flamengo
1211 [Gerocephalus] dybowskii Flamengo.
1212 Mirabilocer. sp. n. Jacolina
1213 " polyanthus Brejinho.
1214 " rhodocephalus M. de Azul.
1215 Pilosocereus sp. n. Wasserwerk Rondonopolis
1216 " saudadensis Serra de Saudade
1217 " carolinensis R. Carolina
1217 a " " v. robustispinus Barão Grajaú
1218 " faturianensis Faturiano #5
956 a " gounellei Barão Grajaú.
1219 " pernambucensis R. Drarijina
1220 " " v. cacius R. Petrolina #3
1221 " pentaedrophorus Jaguari bis Urandi
1222 " catingicola Jaguarari #8
1223 " pachycladus R. Urandi #9
1224 " spleridi dus R. Urandi + Lait. + M. Az.
1225 " pernambuc. v. montealtensis Pol. d. M.
1226 " oreus R. Monte Azul #10
1227 Stephanocer. leucostele Jaçu - P. d. M.
1228 Zehntnerella polygona R. Flamengo
1229 " chaetacanthe R. Guanambi #7
1230 Pseudoacanthocer. brasil. Jaguarari
1231 Leocereus sp. n. Urandi - Monte Azul
1232 Floribunda pusilliflora M. de Azul
1233 Pilosocer. lützelburgii Jacolina
1234 Coleocephalocer. goebelianus Urandi - P. M. A.
1235 Eriocer. adscendens Bahia
1236 Mirabella albicaulis v. piauiens. Gatur.
1237 " " Flamengo - Petrol. Uru.
1238 " minensis Mirabela
1239 Brasilicer. phaeacanthus Laitite etc.
= 1240)
1241 = 1336 Espejadoa rhodantha Drarijina - P. M. A.
1242 " penicillata Jaguarari
1242 a " " v. decumbens Jaçu
1243 " multiflora Brejinho
1244 " precopilla R. Urandi, Hofen
1244 a " rhodantha v. minensis " " M. Azul
1335 " penicillata (leichte Var.) " Jacobina.
1246 Lepismium sp. n. Rui Barbosa (Berg)
1247 " " Mendes
1264 Echinoc. linkii v. gnaibensis Itapua #7
1265 " ottonis Porto + Doros dos Rios = 1266 a + b
1389 " var. Lavramento (Flade K. nach)
1266 " leptirirons Jaguarichim #2
1266 c " minus v. acutangularis São Franc. etc.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

M.FR Seite 2

1267 Notocactus muricatus Sanga de Arreia
1267a " " var. Taquarichim.
1268 " paraguayensis R. Sta. Maria
1269 " Roestii C. Agudo
1269a " " v. purpureiflorus C. Botucaraí
1270 Eriocactus magnificus R. Toropi
1271 Echinopsis oxygona Loreto + Toropi
1383 " " f. brevispina C. Branco
1404 " eyriesii 30 km n. Quarai
1272 Weggiaria leprosorum R. Itapoã
1273 " polyacantha Arr. do Rato
1274 Eriocactus leninghausii Corvo
1274a " " v. minor Montenegro
1274b " " v. M. Lopes
1275 Brasilicactus hazelbergii Altro Melo
1276 " graessneri Jaguirana
1277 Brasiliparodia brevihamata "
1278 " buenekeri Aperados da Serra
1279 Cereus jamacaru Aratipina Jamaica
Flamengo.
1250 Peireskia sp. Uruguai
1251 " sp. "
1252 Platyopuntia inamoena Baz. Graj. C. Arcos
1252a " " v. (longst.) Uruguai, Flores.
1253 " paludadora Aratipuca b. Uruguai
1254 " calingicola Icó # 12
1255 Brasiliopuntia sp. Rio Barbosa
1256 Tacinga flinalis Bahia
1258 Arthrocer. cylindros-portoi Belo Horizonte
1259 = 1010a Cereus obtusus Arraial d. Cabo
1260 Pilosocer. arrabidae " " "
1261 " vilei " " "
1262 Coleocephalocer. fluminensis " " "
1263 Rhipsalis ~~[illegible]~~ cf. " " + Itabela
1279 Brasiliopuntia sp. " " —
1280 Lepismium grandiflorum Guarujá (Ilhas)
olim Na. " chrysanthum Vila Velha.
1282 Cereus goiasensis Carolina + Barão Grajaú.
1283 Eriocactus claviceps Julio de Castilho.
1284 Brasiliparodia alacriportana Ilh. Tainhas.
1285 Lepismium sp. n. Berlin # 4
1286 Rhipsalis cribrata Berlin # 5 + 8/9 (Bahia, Ilha Itaparica)
1287 " warmingiana C. Agudo (2-4 = klein)
1291 Peireskia sp. n.? Ponta Porã # 2
1292 " aculeata Estrela
1293 Rhipsalis pachyptera cf. (Blumenau, Brinker)
1325 Pilosocereus aurilanatus Joaq. Felicio # 3.
1326 " coerulescens Alto Palacio
1327 Lipocereus pleurocarpus " "
1328 Micranthocer. multangul. Itacuí
1329 " purpureus Serra Sinzorá
1330 Melocactus rubrispinus Graj. Reunidas
1331 = 1357 " permutabilis R. Ourives # 13 etc.
forma [illegible] Reunidas

1332 Meloc. neglectus var. Ourives # 19 + n. Itacuí
1333 " canescens R. " # 10
1337 Brasilicer. brevifloris R. Itaobim.
1338 Pseudoacanth. brasil. var. "
1339 Coleocephalocer. flavisetus R. (s. Eng. Caldão)
1340 " decumbens R. (Padre Paraiso)
1341 " aureus R. Itaobim.
1342 Pilosocer. quadricostatus R. Padre Paraiso
1343 " superbus v. regius R. Ourives # 2
1343a " " v. pacapamsis R. Riacho Ana
1343b " " v. laxior (15 km s. Caitité)
1347 " superbus R. Anaçé # 4
1344 " robustus R. Ourives # 16.
1345 " supremus Itaobim # 5
1346 " multicostatus " # 12
1348 " sp. Anaçé # 9.
1349 " atroflavispinus Itacuí # 8
1350 Hatiora salicornioides Corcovado
1351 Brasilicp. sp. "
1352 Coleocephalocer. paulensis Itabela.
1353 Frailea horstii Rincon de Segredo
1354 Arthrocer. odorus R. Veraneio Hotel
1355 " rondonianus Joaq. Felicio.
1356 Melocactus arachnites Monte Claros
1358 " montanus s. Eng. Cmar.
1359 Pilosocer. bradei Joaq. Felicio # 4
1360 " brasiliensis Corcovado.
1361 Notocactus leucocylindricus R. 52 km s. Harmonia
1362 Frailea phaeodisca 52 km s. Harmonia
1363 " asterioides v. parvimamma 7 km s. "
1363a " " v. backebergii Quarai
1364 " pumila Itacuí s. Harmonia
1364a " " 12 km n. Livramento + 25 Negrete + C. Branco
1364b = 1365 = 1367 " " var. maior Livramento
1366 " pygm. v. planicosta Franc. C. - Sant. 7 km 36
1369 " " v. longispina 12 km s. Quevedos
1370 " " v. maior Caçapava = HH 12
1385b " " v. lilaliuula 15 km s. Livramento
1371 " " v. cupreispina s. Sant. Gr. km 137,5
1370a " " v. albigibbera Ibaré
1385 " perumbilicata 50 km s. Passo da Guarda
1385a " albicolumnaris 12 km n. Livram. Rio Branco
1385c " perumbil. v. spinosior 75 km s. Passo da Guarda
1368 " asperispina s. São Pedro, Alegrete
1386 " aureispina 30 km n. Quarai
1391 " " v. pallidior Livram. # 11
1392 " albiflora Livram. Leite Uruguay
1372 Gymnocalyc. m. v. [illegible] Ilha Itaipu, Rio Uruguai
1373 " denudatum Ibaré = HH 8
1374 " uruguayense Quarai + Livram.
1275a Brasilicactus v. dellatus n. Vacaria
1275b " hazelb. m. v. Tarecí

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

Nr. FR Brasilianische Kakteen

Seite 3

1375 Notocactus securitubercul.ᵒ v. miniatispᵒ s. Santiago
1377a " " — 14 km s. Quevedo #1b
1376 (=1475a) glaucinus v. Santiago #5, s. Santa Maria
1376a " " v. depressus 12 km s. Quevedo #1
1377 " acutus " " " " #2a
1378 (=1426) " glaucinus v. gracilis São Francs d. Assis.
1379 " fuscus " " " " #6
1379a " " f. 18 km w. S. Francᵒ
1379b " " f. 75 km s. Passo d. Guar.
1380 " megapotam.ᵒ v. horstii Soledade
1380a (=c) " v. vulgatus 14 km s. Quevᵒ
1380b " " v. crucicentr. Frans-Sant. km 36
1381 " muricatus v. flavifuscus Cᵒ Branco #5
1382 " mamulosus Cᵒ Branco-Livramᵒ
1384 Wiggins. sellowii Quarai + Lavras.
1387 Notocᵒ herteri Livramento
1388 " globularis " #9 (dichtarealig)
1390 " crassiceps 18 km s. Livramᵒ
1393 " scopa v. Rincón de Segredo
1393a " scopa — Pedras Altas
1394 " crassigibbus Lavras
1395 " arachnites Rincon de Segrᵒ
1395a " " v. minor s. Camaquã
1397 " Mina Camaquã (gelbl.)
1398 " campestrensis Lafayette
1399 " succinus s. São Gabriel
1400 Eriocactus (Stuhl Bruinch, wenig Stiff)
1401 Brasiliparod.ᵒ (ohne Bl. Foto) (Bom Jesᵒ → Rio Pelotas
1401a " (Foto) vor Bom Jes. da Serra)
1402 Wiggins. horstii v. juvenalis.ᵒ Quarita
1402a " horstii Mina Camaquã.
1403 " prolifera Rincón d. Segrᵒ
1403a " longispina Lavras
1405 Rhipsalis sp. Itaqueba #5
1406 Melocact. bahiensis Jacarema
1407 Platyopᵒ sp. (Foto) Quarita #1
1408 " sp. (Foto) " #2
1409 Monvillea sp. v. Piedade
1410 Cereus sericifer Tres Rios #1
1411 " cipoëlensis R. Veraneio Hotel
1412 " calbralensis Joaqu. Felicio
1413 Deiveskia sp. n. Itacobiza.
1414 Notocᵒ sp. n. 16 km sw. Harmonia
1416 Micranthocer. sp. n. Licinio Almeida
1417 Platyop. sp. 30 km n. Quarai (schwärzl.)
1420 Cereus hildmannianus Tres Rios #2
1421 " neonesioticus v. inferior Piedade + Sorocaba
1422 Platyop. sp. Quarai
1284a Brasiliparodia sp. (Foto) 12 km Richtg. Fortaleza
1427 Wiggins. coordinii São Gabriel
1384a " v. macracantha Quarai
1229a Echinocereus spectabilis v. montesaltoi P. d. Mello
1440 Coleocephalocer. brevicylindr.ᵒ
1442 Notocᵒ buiningii
1380d " megapotamicus (Afl. Bünecker)
1463 " rechenbergii

1464 Notocᵒ HU 94 Rio Grande
1465 " HU 140a Ponta Grossa
1470 Leucocaulus bahiensis Itacaçu.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

FR1393 HU.1 Notocactus var. scopa aus ~~Linka~~ Segredo, Cacapava, 400 m H, suedl. PKM.
" 1384 = 2 ~~Malacoc.~~ aus ~~Linka~~ Seival, noerdl. ~~Man.~~ Lavras 15 km.
" 1394 = 3 Notoc. Neuheit " " " " "
" 1403 = 4 ~~Malac.~~ aus ~~Linka~~ Segredo. suedl. v. Cacapava 9 km
1394 = HU 3 = 5 Notoc. Neuheit aus ~~Linka~~ Seival, noerdl. Lavras 20 km
1403a = 6 ~~Malac.~~ aus Naehe Lavras u. Umgebung, 300m H.
1372 = 7 Gymnoc. denudatum, Naehe Lavras u. Cacapava
1380a = 8 Notoc. var. linkii, noerdl. Lavras
1395 9 " Neuheit aus ~~Linka~~ Segredo, suedl. Cacapava, 9 km
1396 10 " " westl. 10 km von Pantano Grande, 60 m H.
1265 11 " " noerdl. 10 km von Cacapaca
1370 12 Frailea Neuheit " 10 km " "
1353 13 " aus Linka Segredo suedl. 9 km von Cacapava
1397 14 Notoc. Neuheit aus Minas de Camanguam, sued.oestl. Cacapava 40km
1402a 15 ~~Malac~~ aus " " " " "
1283 16 ~~Notoc. v. schumannianus~~ 14 km noerdl. Nova Palma, 60 m H.
1269 17 Neuheit 6 km westl. v. Agudo, 600 m H.
1270 18 " oberen Rio Toropi KM v. Quevedos, 400 m H.
1267 19 ~~var.~~ muricatus 15 km noerdl. Jaguary, 250 m H.
1387 20 " herteri aus Livramonto, Stadtrand, 210 m H.
1268 20a " " noerdl. 4 km Santa Maria, 300 m H.
1269a 20b " " westl. 10 km Candelaria, hoechster Berg.
1268 = HU20a = 20c " " noerdl. 20 km Santa Maria, 400 m H.
1402 21 ~~Malac.~~ Neuheit sued.oestl. 30 km Cacapava, Sr. de C., 450 m H.
1026b 22 Notoc. ~~v.~~ linkii Naehe Garibaldi, 640 m H.
1398 23 " v. nova, aus Campestre Mon Sao Salvador, 600 m H.
1382 24 " mammulosus, Livramento, Guarai u.s.w.
1265, 1266b; 1266a 25 " ottonis
1399 26 " Neuheit Sao Gabriel, 60 km suedl. Linka Ibaré, 150 m H
1027a 27 " ~~ottonis~~, 30 km sued.oestl. Estrela Mon Triumpfo, 180 m H
~~1373~~ 28 Gymnoc. Neuheiten, 60 km, Sao Gabriel nach Ibaré, 150 m H.
1379a 29 Notoc. Neuheit, 18 km westl. Sao Francisco de Assis, 125 m H.
1026a 30 " ~~v.~~ linkii, 7 km v. Arroioda Seca, suedl. 500 m H.
1380 31 " " " , 10 km v. Soledade, 700 m H.
1266b 32 " ottonis f. (rote Stacheln) 10 km westl. Sao Pedro d.S. 150m H
1272 33 ~~Malac.~~ , 50 km suedl. Porto Alegre, 50-100 m H.
1361 34 ~~Frailea~~ Neuheit, 30 km vor Quarai u. bei Cati 50 km vor Livramento, 300 m H., auch bei Porto Alegre,
HU27 = 1027 = 35 Notoc. arechavaletai bei Lemi, 30 suedl. suedl. Porto Al, 50 m H
1026a = HU30 = 36 " ~~v.~~ linkii, aus Pedra Altos, 30 km suedl. Pinkeox Madado, 300 m H
37 " ottonis 20 km westl. v. General Vargas, 300 m H.
38)
1275a 39 haselb. v. stellatus, 30 km noerdl. Vacaria, 950 m H.
1401a 40 ~~Par.~~ Neuheit 8 km vor Bon Jardin da Serra am Rio Pelotas, Santa Catarina, 1000 m H.
1275 41 " buenekeri, 3 km oberhalb Linka Rocinho, Aparados da Serra, 1300 m H.
1284 42 " Neuheit, 3 km hinter Cambarà, 500 m H.
1277 43 " brevihamata 10 km oestl. Jaguerana nach Cambarà, 900 m H.
1284a = HU42 = 44 " ~~Neuheit 15 km vor Rio Pelotas nach Capao da Portas in Bom Jassio, 800 m H.~~
45 Neuheit, 20 km noerdl. Sao Francisco de Paula, 900 m H.
1401 ~~1284a~~ 45 " 15 km vor Rio Pelotas nach Capao de Portos in Bom Jassio, 800 m H.
1284a 46 = 44 " 12 km nach Einfahrt nach Fortaleza vor Cambara rechts, 900-1000 m H.
HU41 = ~~1276~~ 47 " " in Naehe von Linka Silveira nach Rocinho, 1000 m H.
1276 48 Notoc. graessneri, 10 km oestl. Jaguarana nach Cambara, 900 m H.
1274a 49 " leninghausii, lange St. 4 km noerdl. Montenegro, 50 m H.
1275 50 " haselbergii, bei uns in Arroio da Seca, 600 m H.
1275b 51 " haselbergii, PKM oestl. Trombudo, Santa Cruz, 400 m H.
1393a 52 " scopa, Pedras Altas, Pinkeiro Machado, 360 m H.
1274 53 " leningh., bei uns in Arroio da Seca, 500-700 m H.
54 " graessneri oder stellatus aus Fortaleza vor Cambarà, 1000
1268 55 Frailea (kleinste v. allen) 10 km westl Sao Pedro d.Sul, 100 m H
1363a 56 " kunkle Farbe, kurze St., 10 km noerdl u 10 km oestl von Quarai, 100 m H.
(1377 und) 1377a 57 Notoc. dunkle St., etwa 15 km suedl. Quevedos, 600 m H.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

Anlage zu Brief 3.VIII 66 von Bain. Beantwortet 12.VIII 66, bueneker f. coniungens.

69 Parodia var. Befindet sich etwa 7 km nach Einfahrt der Strasse Sao Francisco de Paula-Cambará nach Jaquirana, rechts in einer Vertiefung, auf flachenen Felsgruppen in etwa 900 m

68 ? Parodia var. fand ich oberhalb also nordlich von Cambará-Cuevlendo, rechts in die Aparados da Serra an trockenen Felsgruppen, bei etwa 1000m

70 ? Parodia var. in der Naehe von Nr. 68 nur hellere Stacheln

71 Parodia var. in der Naehe von Cambará, Nord-Westlich auf eine groessere Strecke verbreitet, aber immer vereinzelnt, etwa 800-900 m.

72 Parodia var. 4 km oestlich von Bom Jardin da Serra in Santa Catarina auf flachen Felsen, in 1200 m.

73 Parodia mit den laengsten Stacheln in der Naehe von 72 an trockene Steingruppen stehend.

74 Parodia var. 4 km noerdlich von Bom Jardin da Serra, 800 m links am Wege auf flache Felsen in etwa 1000-1200 Hoehe, etwas roetliche Stacheln.

75 Frailea, ganz kurze Stacheln, fand sie zuerst in der Naehe von Herval, dann auch bei Pedros Altos und in Quarita, Minas de Camonguan (schlecht zu lesen), in Cacapava do Sul, waechst mehr in Grass wie auf Felsen, bei Trockenheit verschwindet sie fast von der Oberfleache ist im ganzen schwer zu finden, zwischen 120-400 m Hoehe, blueht je nach der Trockenzeit. (ich hatte diese Fundgebiete noch nicht gelesen, aber hier ist der Antwort auf Ihre Frage; der Bestimmung Frailea phaeodisca stammt den wahrscheinlich von Uebelmann)

76 Frailea, aehnlich der Nr. 12, Standort noerdlich von Bogé wo auch Malacocarpus zu finden auf trockene Grasshuegeln, 230 m.

77 Notoc. var. koennte Notoc. concinnus sein (dasz stimmt) suedlich von Pedras Voltas nach Herval, fand auch einem einziger bei Livramento,

78 Notoc. weinrote Bluete bei Quarita in der Serra de Cacapava do Sul, zusammenwachsend mit gelbbluehende derselben Art, dazu Echinopsis und Malacocarpus und Opuntias sowie C.peruvianus, ich glaube es ist diese eine der schoenst bluehenden Notocacteen, man kann sie nur dei der Bluetezeit auseinander kennen, in 400 m, ich fand sie in Sept. 1965.

79 Gymnoc. auch aus derselbe Gegend der Nr. 78 in Gruppen stehend, blueht etwas rosa bestreift, Bluete etwa 10 cm grosz. (Ist interessante Pflanze aus denudatagruppe ? mit scharfe Rippen und viel schwerere Stacheln, man konnte sie acutus nennen)

80 Notoc. var. scopa, aus Minos de Camanguá, Cacapava do Sul in der Gegend der Nrs. 14-15-21 ist nicht sehr haeufig.

81 Notoc. gelbe Bluete zusammenstehend mit Nr. 78, blueht auch sehr schoen. Pflanze ganz aehnlich wie 78.

82 Notoc. Neuheit aus Candelaria, ungefaehr 20 km entfernt von Berg des Botucaray wo Notoc. herteri b waechst; diese Neuheit waechst an ganz fast senkrechte Felswaende, Pflanze aehnlich des Notoc. horstii. Blueten groesser und mehr rot im etwa 400 m Hoehe nach der Sammenseite (???) schoene Pflanzen sind kaum zu holen, da schwer heranzukommen ist.

Nach 82 faengt die Nummerierung wieder an bei 101.

101-2 Bei Goveia vor Diamontia, sehr felsiges Gelaende, blaue Fruechte, zwischen Felsbloecke stehend in ueber 1000 m.

103-4 In der Naehe von Diamantina bei aelteren Pflanzen etwas weisswollig an der Spitze, Blueten aussen roetlich innen weisz, zwischen Felsbloecke stehend ueber 1000 m

105 Discocactus in der Naehe von Diamantina, in reinem Quarzit wachsend, schade durch Feuer werden vielegerstoert. (wahrscheinlich Discocactus tricornis ?).

106 spec. nova noerdlich von Diamantina, sie sehen aus nach Astroph ytum, ueber 1000 m Hoehe.

107 Piloc. gelbliche Stacheln weisswollig bedeckt vor Feliciano dos Santos, Bluete weisslich, zwischen Felsbloecke stehend.

108 Parodia gummifera, aus der Serra do Ambrosia, bei Pedra Menina in fast reinweissen Quarzit-Sand stehend in der prallen Sonne, ohne Schutz, in etwa 1500 m, konnte am Platz kein Samen finden.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

Seite 3

FR 960 Dibr. HU denzilanatus R. 109 Piloc. Tipo lanata aus der Naehe von Par. gummifera auf Felsen wachsend, konnte keine Bluete noch Frucht finden.

? 110 Piloc. blauer, Bluete aussen blass, innen rosa, Standort in der Gegend der Serra do Cipo, es konnte nach Dr. Werdermann's Buch, P. aurisetus sein.

? 111 Piloc. gelbe Bestachlung aus der Gegend des Nr. 110, dicht zusammen stehend, Bluete aussen roetlich, innen gelblich.

FR1210 112 Melocactus, bei Itoabim, Nadelkissen erst ganz hell, spaeter rosa, sehr lange Stacheln, auf Granit wenig Erde und Feuchtigk.

? 113 Ceph. cer. sehr duenn schlank aufrecht stehend bei Nr. 112, schoene rosa Blueten, ganz rote Fruchte.

FR1252 inamoena 114 Opuntia Art ohne Stacheln auch bei Nr. 112, waren als wir zurueckkamen fast alle schon eingetrocknet.

? 115. Piloc. gewoehnliche Art gruenweissliche Bluete.

1341 Coleocephalocereus decorus Ritter. 116 Ceph. cer. Standort oberhalb von Itaobim, Bluete aussen gruenlich innen weisz, Frucht rot, Samen schwarz, breiter weisses Cephalium, wenn groszer, legen sich dan um, gibt dann viel Austriebe. Schickte einige groessere leider beschaedigte Exemplare mit, vielleicht zum beobachten sind sie gut.

FR1345 supremus Ritter 117 Piloc. gelbe Stacheln bei Nr. 116 stehend, beide auf harten Granitstein bei ganz wenig vorhandenen Steingeroell in ueber 1000 m Hoehe.

118 Piloc. tipo gounellii an der Grenze Minas Gerais-Bahia.

wohl FR1323 pachycladus 119 Cereus, blau an den Spitzen ganz weisswollig, sehr grosz werdend

120 Piloc. leucostele von Cemguista nach Brumado-Caetete, immer einzeln stehend so wie Dr. Wereermann ihn auch fand, oft unten verbrandt durch Feuer.

FR1221 Pilosocereus glaucochrophorus 121 Cereus blaue Frucht aussen und innen rot, Stacheln weiss in der Gegend von Brumado.

122 Melocactus bei Ibihita vor Caetete, schoene exemplare auf flachen Felsen. Dabei 2 Arten: 1209 macrodiscus und 1331

123 Ceph. cer. polyanthus bei Caetete an Berg..... auf reinweissen Quarzit wachsend, Samen konnte ich keinen finden. Pflanzen mit 10-15 Austriebe, leider viel verbranndt.

die beiden Arten wie 122 124 Melocactus, rotweissliche Nadelkissen, bei Caetete in Quarzit.

125 Piloc. tipo ~~gummilii~~ rodanthus zwischen Tagne ?? novo und Botugran ??? (schlecht zu lesen)

126 Piloc. tipo gounellii, Frucht ... und aussen rot, Samen schwarz, lange Stacheln, bei Tagne novo und Botuporon.

? 127 Piloc. bei Macanbas, weiche Bestachlung.

? 128 Melocactus bei Macanbas, langere ?? ... wachsend, auch sehr grosse Exemplare vorhanden.

? 129 Vierkantig mit Zweige, lange dunkle Bestachlung bei Ibihiara 5 Pflanzen bei der Sendung ohne Nummer.

? 130 Cereus, duennere 5-kantige Saeulen, braune Stacheln, dunkle Areolen, vor Scabra.

? 131 Cephal. duenn hoch aehnlich mit Nr. 113, stark bestacheln auf verlassene Ameisen-Neste stehend auch bei Scabra.

? 132 Melocactus, ganz flachrund bei alten Pflanzen, auf Grenitfelsen bei Olho de Agua Secco, rote Samen-Kapsel.

? 133 Ceph. bei Scabra und Olho de Agua Secco, langharigen braeunlich Cephalium, weisswollig bestachelt.

134 Piloc. tipo pennicilatus in derselben Gegend.

wohl FR 1253 jalmadoras 135 Opuntiaart, lange weisse Stacheln, schmale laengliche Glieder bei Scabra.

136 Piloc. luetzelburgii

? 137 Melocactus lange rechte Stacheln auf Granitfelsen bei der Grenze von Bahia u. Minas.

? 138 Cactus stark verzweigt.

? 139 Piloc. 4 bis 6-kantig, blau, ziemlich hoch werdend zwischen Milagre u. Feira de Sontana in Bahia.

FR1334 140 Melocactus oberhalb von Itaobim, wo Nr. 116 steht, rosaartige Stacheln.

Notizen in Serra da Loca: 43 a Brasilipar.ª brevihamata v. mollispina, Landorá, Abzweig. nach Jaguirana, 186 " etwa buenekeri, glänzend graugrün, 17-25 Ri. St. derb, etwa gleiche Länge u. Zahl. Mst. gelb bis braun; Rst. blaßgelb glänzend, der unterste Rst. kahig bis gerade. 30-40 km von Rochedo auf Fazenda

Brasilipar. alacriportana fehlt anscheinend bei Rorst.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

	Ht. U Nr.	
FR 1266	58	Notoc. Neuheit oestl. vor Taguarictim 10 km, 300-400 m H. leptirirens
1389	59	" ~~var. uruguayensis~~, 15 km oestl. Livramento, 250 m H. ottonis var. (Stachelkut scharf)
1374	60	Gymnoc. Neuheit aus Umgebung von Quarai, 100 m H. uruguayense
1376 ~~1377~~	61	Notoc. Neuheit, aehnlich Nr. 57 v. Quevedos aus Santiago, 500 m H.
(und 1376?) 1378	62	" ~~ottonis~~, sehr lange St., aus Sao Francisco de Assis concinnus gl. v. grace
1379	63	" aehnlich Nr. 29, 10 km noerdl. Sao Francisco de Assis 200 m H. fuscus
?	64	Frailea aus der Gegend vor Alegrete Angaben zu unbestimmt.
?	65	" von Quarai nach Livramento " " "
?	66	" " " " " "
?	67	" ruebenartig
?	68	Parodia Sambaia - Ours Verde, rechts in die "Aperados da Serra", gelblich lange St.
	69	"
	70	"
	71	"
	72	"
	73	"
	74	"
FR 1362	75	Frailea phaeodisca
	76	" spec.
	77	Notoc. concinnus nein. permutatus Ritt. Pfl. Brinker Ls. Gabriel.
	78	" uebelmannianus
	79	Gymnocal. spec. rote Bluete
	80	Notoc. spec. scopa event. 52
	81	Notoc. spec. aus der Gruppe der 78 jedoch gelbe Bluete
	82	" aus der Gruppe herteri.

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

1907 Copiapoa

© Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.